HOMOCLAVE	Peso al nacimiento	porcentaje de natalidad	ganancia de peso	edad de destete	peso a los 12 meses	edad de Inicio de consumo de alimento solido	porcentaje de mortalidad en lactantes	edad de descorne	metodo de suministro de calostro	protocolo de identificacion animal	estado de salud	diseño y seguridad de las areas de manejo	partos	disponibilidad de sombra natural o artificial	disponibilidad de limpieza	manejo de bajo estrés
RM_M_031	30	87	1	7	350	15	4	17	natural	sano	adecuado	eutocicos	eutocicos	insuficiente	libre acceso	parcial

Enfermedad	Carbunco Sintomático (Pierna Negra)
descripcion	Infección endógena por esporas bacterianas que germinan en tejido muscular tras traumatismos o anoxia local, provocando miositis gangrenosa y toxemia.
Diagnostico	Frotis por impronta de músculo afectado teñido con inmunofluorescencia directa o PCR de tejido afectado.
Tratamiendo	Altas dosis de antibióticos en fases extremadamente tempranas, aunque el pronóstico suele ser reservado.
Medicamento	Penicilina G Sódica/Procaínica (40,000 UI/kg I.M. o I.V.) + Antiinflamatorios (Meloxicam).

