HOMOCLAVE	Peso al nacimiento	porcentaje de natalidad	ganancia de peso	edad de destete	peso a los 12 meses	edad de inicio de consumo de alimento solido	porcentaje de mortalidad en lactantes	edad de descorne	metodo de suministro de calostro	protocolo de identificacion animal	estado de salud	diseño y seguridad de las areas de manejo	partos	disponibilidad de sombra natural o artificial	disponibilidad de limpieza	manejo de bajo estrés
RL_B_183	30	86	1	8	350	16	4	20	natural	sano	adecuado	eutocicos	eutocicos	suficiente	libre acceso	parcial

Enfermedad	Neumonía por Mannheimiosis(: Mannheimia haemolytica)
descripcion	BACTERIA oportunista que coloniza el aparato respiratorio inferior bajo estrés o infección viral previa, provocando neumonía fibrinosa severa.
Diagnostico	Auscultación pulmonar, ultrasonografía torácica, hisopado nasofaríngeo o necropsia (pérdida de parénquima pulmonar y consolidación)
Tratamiendo	Antibióticoterapia de amplio espectro, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y aislamiento en zona ventilada.
Medicamento	Florfenicol (20 mg/kg I.M. cada 48 h) o Tulatromicina (2.5 mg/kg S.C. dosis única) + Flunixin Meglumine (2.2 mg/kg I.V.).

