

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	方程的解与一元一次方程			课型	概念形成课
章（单元）总课时	11	本课题课时	3	本节课是第	2 课时
教学目标	说出并解释方程的解，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成方程的解，并说明关键依据。 判断并订正与“判断一个方程是否为一元一次方程”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。				
教学重点	方程的解；一元一次方程				
教学难点	判断一个方程是否为一元一次方程				
教学方法	问题引导；比较归纳；正反例辨析				
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡				
板书设计	方程的解与一元一次方程 1. 核心：使方程左右两边相等的未知数值叫方程的解；只含一个未知数且未知数次数为 1 的整式方程是一元一次方程。 2. 方法：代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数。 3. 例题：检验 $x = 2$ 是否为 $3x - 1 = 5$ 的解。答：左边 $3 \times 2 - 1 = 5$，等于右边，所以是。 4. 易错：错解：含有字母的等式都是一元一次方程。纠正：错误；还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。				

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	情境引入 问题：把 $x = 3$ 代入 $2x + 1 = 7$，等式是否成立？这说明什么？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：左边为 7，等式成立，所以 3 是方程的解。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：左边为 7，等式成立，所以 3 是方程的解。	5 分钟
	比较与抽象 问题：方程的解和一元一次方程怎样定义？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：使方程左右两边相等的未知数值叫方程的解；只含一个未知数且未知数次数为 1 的整式方程是一元一次方程。 例题：基础例题：检验 $x = 2$ 是否为 $3x - 1 = 5$ 的解。规范解答：左边 $3 \times 2 - 1 = 5$，等于右边，所以是。 对应练习：即时练习：检验 $x = -1$ 是否满足 $4x + 5 = 1$。答案：满足。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数”说明。 归纳：代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：使方程左右两边相等的未知数值叫方程的解；只含一个未知数且未知数次数为 1 的整式方程是一元一次方程。	7 分钟
	正例示范 问题：解答“判断 $2x + 3 = 7$、$x^2 = 4$、$\frac{1}{x} = 2$ 哪个是一元一次方程。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：只有 $2x + 3 = 7$。 例题：变式例题：判断 $2x + 3 = 7$、$x^2 = 4$、$\frac{1}{x} = 2$ 哪个是一元一次方程。解答：只有 $2x + 3 = 7$。 对应练习：对应练习：判断 $5 = 2x - 3$ 是否是一元一次方程。答案：是。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到只有 $2x + 3 = 7$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	表示与应用 问题：某数代入方程 $5x - 2 = 13$ 后成立，求这个数。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：$5x = 15$, $x = 3$。 例题：应用例题：某数代入方程 $5x - 2 = 13$ 后成立，求这个数。解答：$5x = 15$, $x = 3$。 对应练习：即时变式：方程 $0x = 0$ 是否是一元一次方程？答案：不是，未知数系数不能为 0。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$5x = 15$, $x = 3$。	6 分钟
	易错辨析 问题：错解：含有字母的等式都是一元一次方程。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。 例题：易错辨析：错解：含有字母的等式都是一元一次方程。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数”重做。参考：错误；还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。	5 分钟
	归纳迁移 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：检验 $x = -1$ 是否满足 $4x + 5 = 1$。判断 $5 = 2x - 3$ 是否是一元一次方程。方程 $0x = 0$ 是否是一元一次方程？完成后按答案自查。 说明：答案：满足。是。不是，未知数系数不能为 0。 对应练习：机动题：检验 $x = 2$ 是否为 $3x - 1 = 5$ 的解。学有余力者换一种方法说明；答案要点：左边 $3 \times 2 - 1 = 5$，等于右边，所以是。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，方程的解和一元一次方程怎样定义？2 分，判断 $5 = 2x - 3$ 是否是一元一次方程。2 分，错解：含有字母的等式都是一元一次方程。4 分，某数代入方程 $5x - 2 = 13$ 后成立，求这个数。 说明：参考答案：使方程左右两边相等的未知数值叫方程的解；只含一个未知数且未知数次数为 1 的整式方程是一元一次方程。是。错误：还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。 $5x = 15$, $x = 3$。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：检验 $x = -1$ 是否满足 $4x + 5 = 1$。判断 $5 = 2x - 3$ 是否是一元一次方程。方程 $0x = 0$ 是否是一元一次方程？错解：含有字母的等式都是一元一次方程。；答案：满足。是。不是，未知数系数不能为 0。错误：还要只含一个未知数、未知数次数为 1 且系数不为 0。。B 组：判断 $2x + 3 = 7$、$x^2 = 4$、$\frac{1}{x} = 2$ 哪个是一元一次方程。某数代入方程 $5x - 2 = 13$ 后成立，求这个数。；答案要点：只有 $2x + 3 = 7$。 $5x = 15$, $x = 3$。。C 组选做：围绕“方程的解与一元一次方程”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“代入比较左右值；识别方程时逐项检查未知数个数、次数和系数”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			