

Probability Graph 03 D-Separation

Chen Gong

25 November 2019

上一小节中，我们已经大致介绍了概率图之间的三种基本拓扑结构。下面我们来介绍一下，这三种拓扑结构的运用，以及如何扩展到我们的贝叶斯模型中。

1 D-separation

假设我们有三个集合， X_A, X_B, X_C ，这三个集合都是可观测的，并且满足 $X_A \perp X_C | X_B$ 。那我们想想，如果有一些节点连成的拓扑关系图，如果一个节点 $a \in X_A, c \in X_C$ ，那么如果 a 和 c 之间相互独立的话，他们之间连接的节点需要有怎样的条件？我们通过一个图来进行描述。




图 1: 节点之间的拓扑联系图

根据上一小节我们的讲解，我们可以想想，假如从 a 到 c 中间通过一个节点 b ，那么路径什么时候是连通的？什么时候又是阻塞的呢？我们可以分两种情况来讨论，为什么是两种？上一节我们就已经讲解过，Tail to Tail 结构和 Head to Tail 结构其实是一样的，但是 Head to Head 结构是反常的。所以我们就分开进行讨论。

1. 如果是 Tail to Tail 结构和 Head to Tail 结构，那么中间节点 b_1, b_2 必然要位于可观测集合 X_B 中，那么 a 和 c 才是相互独立的。

2. 如果是 Head to Head 结构，那就不一样了，在一般情况下 $a \perp c$ ，那就是 $b \notin X_B$ ，包括他的子节点都不可以被观测到，不然就连通了。

如果，符合上述两条规则，那么我们就可以称 a 和 c 之间是 D-Separation 的，实际上还有一个名字，叫做全局马尔科夫性质 (Global Markov Property)。D-Separation 非常的关键，我们可以直接用这个性质来检测两个集合关于另外一个集合被观测的条件是不是条件独立。

2 Markov Blanket

我们首先定义 x_{-i} 为 $\{x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_N\}$ ，这个序列中唯独不包括 x_i 。那么，我们假设除了 x_i 节点，其他节点都是可观测的，那么我们需要计算概率：

$$p(x_i|x_{-i}) = \frac{p(x_i, x_{-i})}{p(x_{-i})} = \frac{p(x)}{\int_{x_i} p(x) dx_i} = \frac{\prod_{j=1}^N p(x_j|x_{pa(j)})}{\int_{x_i} \prod_{j=1}^N p(x_j|x_{pa(j)}) dx_i} \quad (1)$$

我们分析一下上述等式，我们可以分成两部分，将和 x_i 相关的部分记为 $\bar{\Delta}$ ，和 x_i 不相关的部分记为 Δ 。那么公式 (1) 可以被我们改写为：

$$p(x_i|x_{-i}) = \frac{\Delta \cdot \bar{\Delta}}{\int_{x_i} \Delta \cdot \bar{\Delta} dx_i} = \frac{\Delta \cdot \bar{\Delta}}{\Delta \cdot \int_{x_i} \bar{\Delta} dx_i} = \frac{\bar{\Delta}}{\int_{x_i} \bar{\Delta} dx_i} \quad (2)$$

我们可以将 $p(x_i|x_{-i})$ 表示为一个函数 $f(\bar{\Delta})$ 。那么 x_i 和其他所有点的关系可以被化简为只和 x_i 相关的点的关系。那么，我们将这个关系大致抽象出来，通过图来进行分析，找一找哪些节点是和 x_i 相关的，直观性也是概率图模型的一大优点。假设 x_i 是可以被观测到的




图 2: 节点之间的抽象拓扑联系图

$P(x_i|x_{-i})$ 首先包括一部分为 $p(x_i|x_{pa(i)})$ ，第二部分为 $p(x_{child(i)}|x_i, x_{pa(child(x_i))})$ 。为什么第二部分可以这样写呢？首先 x_i 作为两个父亲节点，得到两个孩子节点，毫无疑问对吧，那么我们可以写成 $p(x_{child(i)}|x_i)$ 。但是和 $p(x_{child(i)})$ 相关的变量除了 x_i 肯定还有其他的，也就是 $x_{pa(child(x_i))}$ ，所以我们就得到 $p(x_{child(i)}|x_i, x_{pa(child(x_i))})$ 。实际上，这些 x_i 周围的节点，也就是我用阴影部分画出的那些，可以被称为 Markov Blanket。从图上看就是留下和父亲，孩子，孩子的另一个双亲，其他的节点可以忽略，也就是和周围的关系的连接。

总结：D-Separation 是在概率图中，帮助我们快速的判断条件独立性。