







FEBRILE CONVULSION

ภาวะชักจากไข้สูง

ชักใน 24 ชั่วโมงที่เริ่มมีไข้
พบในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี



สาเหตุ

ภาวะนี้เกิดจากการที่สมองของเด็กเล็กยังเจริญไม่เต็มที่ ทำให้มีโอกาสชักได้ เมื่อถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น ใช้สูง สาเหตุที่แท้จริงของการชักในเด็กที่มีไข้สูงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เพราะมักมีประวัติโรคไข้ชักตอนเป็นเด็กของคนในครอบครัวร่วมด้วย และสาเหตุของไข้ มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจส่วนบน คือ โปรงจมูกและลำคอ (เช่น ไข้หวัดใหญ่) นอกจากนี้อาจเกิดจากโรคหัดกุหลาบ(Roseola) และจากหูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อ

อาการ

เด็กจะเริ่มไม่สบาย โดยอาจมีอาการน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อาเจียน ถ่ายอุจจาระบ่อย ซึมลง มีไข้สูงและชัก
ลักษณะของการชัก คือตัวจะแข็งเกร็ง มือเท้ากระตุก
ตาเหลือก กัดฟันแน่น น้ำลายฟูมปาก ไม่รู้สึกรู้สีกตัว อาจมี
อาเจียน หรือถ่ายปัสสาวะ อุจจาระขณะที่กำลังชัก อาการ
ชักมักจะนานไม่เกิน 15 นาที ในรายที่ชักอยู่นาน ใบหน้า
ริมฝีปาก และมือเท้าจะเขียวจากการขาดออกซิเจนได้

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเด็กที่มีอาการชัก

- จับให้เด็กนอนตะแคง ไม่หมุนหมุน หันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันการสำลัก
- คลายเสื้อผ้าให้หลวม
- ห้ามใช้ช้อนหรือวัตถุอื่นใด หรือนิ้วมือจัดปาก และห้ามป้อนยาหรือน้ำทางปาก ในขณะที่เด็กไม่รู้สึกรู้สีกตัว
- เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ไม่ควรเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น หรือแอลกอฮอล์
- นำเด็กส่งโรงพยาบาล หรือพบแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าสาเหตุของการชักเกิดจากไข้สูง หรือสาเหตุอื่น เช่น การติดเชื้อในสมอง ซึ่งต้องรักษาที่ต้นเหตุด้วย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน เด็กที่มีไข้สูง


- รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล
- ให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆ
- เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นและขณะเช็ดตัว ควรปิดพัดลม หรือปิดเครื่องปรับอากาศ

- สำหรับ**วิธีการเช็ดตัว** ควรถอดเสื้อผ้าออกให้หมด ใช้ผ้าขนหนูขนาดเล็กชุบน้ำให้ชุ่มพอควร แล้วเช็ดชโลมให้ทั่วตั้งแต่ใบหน้า ลำคอ ลำตัว ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลัง แขนและขา เช็ดย้อนรูขุมขน ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ขณะที่เช็ดตัวให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำที่บริเวณ หน้าผาก รักแร้ และขาหนีบไว้ด้วย

- ถ้าปลายมือ ปลายเท้าเย็น ควรใช้น้ำอุ่นประคบ กรณีไข้ไม่ลดลง ควรไปพบแพทย์

สิ่งที่ไม่ควร
ทำขณะเด็ก
มีอาการชัก

- ใช้วัสดุ ช้อน นิ้วมือจัดปาก
- ป้อนยาขณะมีอาการชัก
- ใช้น้ำเย็นเช็ดตัว หรือน้ำ
แข็งประคบ
- ไล่เลือดฝ่านานๆ



EPILEPSY

โรคลมชัก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน เด็กที่มีไข้สูง

- รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล
- ให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆ
- เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นและขณะเช็ดตัว ควรปิดพัดลม หรือปิดเครื่องปรับอากาศ

- สำหรับ**วิธีการเช็ดตัว** ควรถอดเสื้อผ้าออกให้หมด ใช้ผ้าขนหนูขนาดเล็กชุบน้ำให้ชุ่มพอควร แล้วเช็ดชโลมให้ทั่วตั้งแต่ใบหน้า ลำคอ ลำตัว ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลัง แขนและขา เช็ดย้อนรูขุมขน ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ขณะที่เช็ดตัวให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำที่บริเวณ หน้าผาก รักแร้ และขาหนีบไว้ด้วย

- ถ้าปลายมือ ปลายเท้าเย็น ควรใช้น้ำอุ่นประคบ กรณีไข้ไม่ลดลง ควรไปพบแพทย์