






(a) $K = K^S + K^L$ against $\Gamma_{\mathrm{ref}}$
relative error
splitting parameter $\xi$
case A
case B
uniform
perturbed lattice
clustered
pair level
$|k|$ rounded (old)


(b) real-space cutoff, $\xi = 0.7$
$\|\Delta\Gamma\|_2 / \|\Gamma_{\mathrm{ref}}\|_2$
fit floor
$\xi r_c$


(c) Fourier cutoff, $\xi = 0.7$
$\|\Delta\Gamma\|_2 / \|\Gamma_{\mathrm{ref}}\|_2$
uniform
perturbed lattice
clustered
case A
case B
$e^{-x^2}$
fit floor
$k_c/(2\xi)$


(d) mesh error, uniform $N$=128, seed 1
$\|\Gamma_L^{\mathrm{mesh}} - \Gamma_L^{k_c}\|_2 / \|\Gamma_{\mathrm{ref}}\|_2$
$p = 3$
$p = 4$
$p = 5$
$p = 6$
$p = 7$
$p = 8$
$\xi h$


(e) fitted slopes in $h$ (open: $s = 5.5$)
fitted slope of RMS error in $h$
case A
case B
uniform
perturbed lattice
clustered
slope = $p$
B-spline order $p$


(f) grid-shift spread
max / RMS over grid shifts
$\eta = k_c h/\pi$