



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

TABELA 01

CARACTERÍSTICAS DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DAS
FLORESTAS OMBRÓFILAS E ESTACIONAIS -
BIOMA MATA ATLÂNTICA

FONTE:
Res. Conj. SMA/IBAMA Nº 01/94 e Resolução CONAMA Nº 10/93

	Estágio pioneiro	Estágio inicial	Estágio médio	Estágio avançado
Fisionomia	Geralmente campestre	Savânica a florestal baixa podendo ocorrer estrato herbáceo e pequenas árvores	Florestal apresentando árvores de vários tamanhos	Florestal fechada, tendendo a ocorrer distribuição contígua de copas, podendo o dossel apresentar ou não árvores emergentes
Estratos	Predomínio de estratos herbáceos, podendo haver estratos arbustivos e ocorrer predomínio de um ou outro. Estrato arbustivo pode ser aberto ou fechado	Lenhosos variando de abertos a fechados com altura variáveis	Camadas de diferentes alturas, sendo que cada camada apresenta-se com cobertura variando de aberta a fechada, podendo a superfície da camada superior ser uniforme e aparecer árvores emergentes	Grande número de estratos, com árvores, arbustos, ervas terrícolas, trepadeiras, epífitas, etc., cuja abundância e número de espécies variam em função do clima e local. As copas superiores geralmente são horizontalmente amplas.
Altura e DAP	Tendência a apresentar altura dos indivíduos das espécies dominantes uniforme, geralmente até 2 m. Os arbustos apresentam ao redor de 3 cm como diâmetro do caule ao nível do solo e não geram produto lenhoso	Entre 1,5 m e 8 m de altura e DAP médio de até 10 cm, apresenta pouco material lenhoso e pequena amplitude de distribuição diamétrica das formas lenhosas	Dependendo da localização da vegetação a altura das árvores pode variar de 4 a 12 m e o DAP médio pode atingir até 20 cm. A distribuição diamétrica das árvores apresenta amplitude moderada, com predomínio de pequenos diâmetros podendo gerar razoável produto lenhoso	Máximas ultrapassam 10 m, sendo que o DAP médio dos troncos é sempre superior a 20cm. A distribuição diamétrica tem grande amplitude, fornecendo bom produto lenhoso
Epífitas	Ausente	Quando presentes, são pouco abundantes, representadas por musgos, líquens, polipodiáceas, e tilândias pequenas	Maior número de indivíduos e espécies (líquens, musgos, hepáticas, orquídeas, bromélias, cactáceas, piperáceas, etc.), sendo mais abundantes e apresentando maior número de espécies no domínio da Floresta Ombrófila	Presentes em grande número de espécies e com grande abundância, principalmente na Floresta Ombrófila
Trepadeiras	Podem ou não estar presentes e, se presentes, são geralmente herbáceas.	Se presentes podem ser herbáceas ou lenhosas	Quando presentes, são geralmente lenhosas	Geralmente lenhosas (leguminosas, bignoniáceas, compostas, malpigiáceas e sapocindáceas, principalmente), sendo mais abundantes e mais ricas em espécies na Floresta Estacional
Serapilheira	Se presente, é descontínua e/ou incipiente	Quando presente, pode ser contínua ou não, formando uma camada fina pouco decomposta	Pode apresentar variações de espessura de acordo com a estação do ano e de um lugar a outro	Está presente, variando em função do tempo e da localização, apresentando intensa decomposição
Sub-bosque	Ausente	Podem ocorrer plantas jovens de espécies arbóreas dos estágios mais maduros	(sinúrias arbustivas) é comum a ocorrência de arbustos ombrófilos principalmente de espécies de rubiáceas, mirtáceas, melastomatáceas e meliáceas.	Estratos arbustivos e herbáceos aparecem com maior ou menor frequência, sendo os arbustivos predominantemente aqueles já citados para o estágio anterior (arbustos ombrófilos) e o herbáceo formado predominantemente por bromeliáceas, aráceas, marantáceas e heliconiáceas, notadamente nas áreas mais úmidas
Diversidade Biológica	Baixa, com poucas espécies dominantes	Baixa (podendo ocorrer ao redor de dez espécies arbóreas ou arbustivas dominantes)	Significativa, podendo haver em alguns casos a dominância de poucas espécies, geralmente de rápido crescimento. Além destas, podem estar surgindo o palmito (<i>Euterpe edulis</i>), outras palmáceas e samambaias	Muito grande devido à complexidade estrutural e número de espécies
Espécies vegetais mais abundantes	Tipicamente heliófilas, incluindo forrageiras, espécies exóticas e invasoras de culturas, sendo comum ocorrência de: vassoura ou alecrim (<i>Baccharis spp.</i>), assa-peixe (<i>Vernonia spp.</i>), camará (<i>Gochnatolipolymorpha</i>), leiteiro (<i>Peschieriafuchsiaefolia</i>), maria-mole (<i>Guapira spp.</i>), mamona (<i>Ricinuscommunis</i>), arranha-gato (<i>Acacia spp.</i>), samambaias (<i>Gleichenia spp.</i> , <i>Pteridium sp.</i> , etc.), lobeira e joá (<i>Solanum spp.</i>)	Além das citadas no estágio pioneiro: camará ou candeia (<i>Gochnatolipolymorpha</i>), leiteiro (<i>Peschieriafuchsiaefolia</i>), maria-mole (<i>Guapira spp.</i>), mamona (<i>Ricinuscommunis</i>), arranha-gato (<i>Acacia spp.</i>), falso ipê (<i>Stenolobiumstans</i>), crindíuva (<i>Trema micrantha</i>), fumo-bravo (<i>Solanum granuloso-lebrosus</i>), goiabeira (<i>Psidium guaiava</i>), sangra d'água (<i>Crotonurucurana</i>), lixinha (<i>Aloysiavirgata</i>), amendoim-bravo (<i>Pterogynenitens</i>), embaúbas (<i>Cecropia spp.</i>), pimenta-de-macaco (<i>Xylopiaaromatica</i>), murici (<i>Byrsonima spp.</i>), mutambo (<i>Guazumaulmifolia</i>), manacá ou jacatirão (<i>Tibouchina spp.</i> e <i>Miconia spp.</i>), capororoca (<i>Rapanea spp.</i>), tapiás (<i>Alchornea spp.</i>), pimenteira brava (<i>Schinusterebinthifolius</i>), guacatonga (<i>Casearia sylvestris</i>), sapuva (<i>Machaeriumstipitatum</i>), caquera (<i>cassia sp.</i>)	Além das citadas nos estágios anteriores: jacarandás (<i>Machaerium spp.</i>), jacarandá-do-campo (<i>Platypodiumelegans</i>), louro-pardo (<i>Cordiatrichotoma</i>), farinha-seca (<i>Pithecellobiumedvalli</i>), aroeira (<i>Myracrodunurundeuva</i>), guapuruvu (<i>Schizolobiumparahiba</i>), burana (<i>Amburana cearensis</i>), pau-de-espeto (<i>Casearia gossypiosperma</i>), cedro (<i>Cedrela spp.</i>), canjarana (<i>Cabralea canjerana</i>), açoita-cavalo (<i>Luehea spp.</i>), óleo-de-copaíba (<i>Copaiferalangsdorffii</i>), canafistula (<i>Peltophorumdubium</i>), embiras-de-sapo (<i>Lonchocarpus spp.</i>), faveiro (<i>Pterodonpubescens</i>), canelas (<i>Ocotea spp.</i> , <i>Nectandra spp.</i> , <i>Cryptocaria spp.</i>), vinhático (<i>Plathymenia spp.</i>), araribá (<i>Centrolobiummentosum</i>), ipês (<i>Tabebuia spp.</i>), angelim (<i>Andira spp.</i>), marinhoiro (<i>Guarea spp.</i>), monjoleiro (<i>Acaciapolyphylla</i>), mamica-de-porca (<i>Zanthoxylum spp.</i>), tamboril (<i>Enterolobiumcontorsiliquum</i>), mandiocão (<i>Didimopanax spp.</i>), araucária (<i>Araucariaangustifolia</i>), pinheiro-bravo (<i>Podocarpus spp.</i>), amarelinho (<i>Terminalia spp.</i>), peito-de-pomba (<i>Tapiriraguianensis</i>), cuvata (<i>Matayba spp.</i>), caixeta (<i>Tabebuia cassinoides</i>), cambui (<i>Myrcia spp.</i>), taiúva (<i>Machluratinctoria</i>), pau-jacaré (<i>Piptadeniagonoacantha</i>), guaiuvira (<i>Patagonula americana</i>), angicos (<i>Anadenanthera spp.</i>) e outras	Além das espécies já citadas para os estágios anteriores e de espécies da mata madura, é comum a ocorrência de: jequitibás (<i>Cariniana spp.</i>), jatobás (<i>Hymenaea spp.</i>), pau-marfim (<i>Balfourodendronriedelianum</i>), caviúna (<i>Machaerium spp.</i>), paineira (<i>Chorisiaespeciosa</i>), guarantã (<i>Esenbeckialeiocarpa</i>), imbúia (<i>Ocotea porosa</i>), figueira (<i>Ficus spp.</i>), maçaranduba (<i>Manilkara spp.</i> e <i>Persea spp.</i>), suinã ou mulungú (<i>Erythrina spp.</i>), guanandi (<i>Calophyllum brasiliensis</i>), pixiricas (<i>Miconia spp.</i>), pau-d'alho (<i>Gallesiaintegriolia</i>), perobas e guatambus (<i>Aspidosperma spp.</i>), jacarandás (<i>Dalbergia spp.</i>), entre outras