

# Übungsblatt 9

## Lösungen

### Lösung 1.

$$(a) \int 3x^2 - 4x + 7 \, dx = x^3 - 2x^2 + 7x + C$$

$$(b) \int x^3 + x^{\frac{8}{7}} \, dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{\frac{15}{7}}x^{\frac{15}{7}} + C = \frac{1}{4}x^4 + \frac{7}{15}x^{\frac{15}{7}} + C$$

$$(c) \int x^2 - \frac{1}{8}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{4}{5}x^{-\frac{2}{5}} \, dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{8} \cdot 2 \cdot x^{\frac{1}{2}} - \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3}x^{\frac{3}{5}} + C = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}} - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{5}} + C$$

$$(d) \int 9x^2 + 12x + 4 \, dx = 3x^3 + 6x^2 + 4x + C$$

$$(e) \int 25x^{-2} \, dx = 25 \cdot \frac{1}{-1} \cdot x^{-1} + C = -25x^{-1} + C$$

$$(f) \int \frac{(x+1) \cdot (x-1)}{x+1} \, dx = \int x - 1 \, dx = \frac{1}{2}x^2 - x + C$$

(g)

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 6x + 9}{x^{\frac{1}{2}}} \, dx &= \int x^{\frac{3}{2}} + 6x^{\frac{1}{2}} + 9x^{-\frac{1}{2}} \, dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + 6 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + 9 \cdot 2 \cdot x^{\frac{1}{2}} + C \\ &= \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + 4x^{\frac{3}{2}} + 18x^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

### Lösung 2.

(a) Es ist  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$ . Nun müssen wir noch die Konstante  $C$  bestimmen, indem wir die Gleichung  $f(2) = 9$  nach  $C$  auflösen: Es ist  $f(2) = \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + C = 9$  und somit gilt  $C = 13$ . Deshalb ist  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 13$ .

(b) Es ist  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x + C$ . Lösen wir die Gleichung  $f(0) = 8$  nach  $C$  auf, bekommen wir  $C = 8$  und damit die Lösung  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x + 8$ .

- (c) Es ist  $f(x) = \int -1 \cdot x^{-2} + x^1 dx = -1 \cdot \frac{1}{-2+1} \cdot x^{-2+1} + \frac{1}{1+1} \cdot x^{1+1} + C = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} + C$ . Die Konstante  $C = -\frac{1}{2}$  ergibt sich aus der Gleichung  $f(1) = \frac{1}{1} + \frac{1^2}{2} + C = 1 + \frac{1}{2} + C = \frac{3}{2} + C = 1$ . Somit ist  $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$ .

### Lösung 3.

(a)  $\int ax dx = a \cdot \frac{1}{2} \cdot x^2 + C = \frac{a}{2} x^2 + C$

Kontrolle:  $(\frac{a}{2} x^2 + C)' = \frac{a}{2} \cdot 2 \cdot x^1 = ax$

(b)  $\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{\frac{1}{2}+1} \cdot x^{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + C$

Kontrolle:  $(\frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} + C)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$

(c)  $\int \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}} dx = \frac{1}{3} \cdot \int x^{-\frac{2}{3}} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{-\frac{2}{3}+1} \cdot x^{-\frac{2}{3}+1} + C = x^{\frac{1}{3}} + C = \sqrt[3]{x} + C$

Kontrolle:  $(\sqrt[3]{x} + C)' = (x^{\frac{1}{3}} + C)' = \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{x^2}}$

(d)  $\int x^{a+3b} dx = \frac{1}{a+3b+1} \cdot x^{a+3b+1} + C$

Kontrolle:  $(\frac{1}{a+3b+1} \cdot x^{a+3b+1} + C)' = \frac{1}{a+3b+1} \cdot (a+3b+1) \cdot x^{a+3b+1-1} + C = x^{a+3b}$

(e)  $\int \frac{x^2}{a^2} - \frac{a}{x^2} dx = \int \frac{1}{a^2} \cdot x^2 - a \cdot x^{-2} dx = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{2+1} \cdot x^{2+1} - a \cdot \frac{1}{-2+1} \cdot x^{-2+1} + C = \frac{x^3}{3a^2} + \frac{a}{x} + C$

Kontrolle:  $(\frac{x^3}{3a^2} + \frac{a}{x} + C)' = (\frac{1}{3a^2} \cdot x^3 + a \cdot x^{-1} + C)' = \frac{1}{3a^2} \cdot 3 \cdot x^2 + a \cdot (-1) \cdot x^{-2} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{a}{x^2}$

(f)

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{a^2} - \frac{a}{x^2} da &= \int x^2 \cdot a^{-2} - \frac{1}{x^2} a^1 da = x^2 \cdot \frac{1}{-2+1} \cdot a^{-2+1} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+1} \cdot a^{1+1} + C \\ &= -\frac{x^2}{a} - \frac{a^2}{2x^2} + C \end{aligned}$$

Kontrolle:

$$(-\frac{x^2}{a} - \frac{a^2}{2x^2} + C)' = (-x^2 \cdot a^{-1} - \frac{1}{2x^2} \cdot a^2 + C)' = -x^2 \cdot (-1) \cdot a^{-2} - \frac{1}{2x^2} \cdot 2 \cdot a^1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{a}{x^2}$$

### Lösung 4.

Es ist  $u(x) = x^{\frac{1}{2}}$  und somit haben wir

$$\int 2x \sqrt{1+x^2} dx = \int \underbrace{\frac{2x}{v'(x)}}_{v'(x)} \cdot \left( \underbrace{1+x^2}_{v(x)} \right)^{\frac{1}{2}} dx = \underbrace{\frac{1}{\frac{1}{2}+1} \cdot (1+x^2)^{\frac{1}{2}+1}}_{U(v(x))} + C = \frac{2}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C$$

Kontrolle:  $(\frac{2}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} + C)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x + 0 = 2x \cdot \sqrt{1+x^2}$

**Lösung 5.**

(a) Es ist

$$\begin{aligned} D(t) &= \int 1975 - 1190t + 597t^2 - 71.3t^3 \, dt = 1975t - 1190 \cdot \frac{1}{2} \cdot t^2 + 597 \cdot \frac{1}{3} \cdot t^3 - 71.3 \cdot \frac{1}{4} t^4 + C \\ &= 1975t - 595t^2 + 199t^3 - 17.825t^4 + C. \end{aligned}$$

Wegen  $D(0) = C = 17.198$  gilt

$$D(t) = 1975t - 595t^2 + 199t^3 - 17.825t^4 + 17.198.$$

(b)  $D(6) = 10\,329.998$

**Lösung 6.**

Aus der Mechanik kennt man:

$$s'(t) = v(t)$$

$$v'(t) = a(t)$$

Also ist die Geschwindigkeit gegeben durch

$$v(t) = \int a(t) \, dt = \int -9.81 \, dt = -9.81t + C.$$

Mit  $v(0) = C = v_0$  folgt somit  $v(t) = -9.81t + v_0$ . Die Höhe berechnet sich durch

$$s(t) = \int v(t) \, dt = \int -9.81t + v_0 \, dt = -4.905t^2 + v_0t + C,$$

und speziell für  $s(0) = C = s_0$  gilt

$$s(t) = -4.905t^2 + v_0t + s_0.$$

**Lösung 7.**

$$(a) \int \sqrt{x-5} \, dx = \int (x-5)^{\frac{1}{2}} \, dx = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} \cdot (x-5)^{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{3} \cdot (x-5)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$(b) \int \frac{1}{(2x-5)^2} \, dx = \int (2x-5)^{-2} \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-2+1} \cdot (2x-5)^{-2+1} + C = \frac{1}{10-4x} + C$$