Dataanmodning til måling af frafald fra behandling

Hvad det er til, og hvad klinikken får

Med samme definition på alle klinikker måler vi **frafald pr. cyklus**: hver ægudtagning åbner en cyklus, der ender med et barn, fortsætter (en ny ægudtagning eller ægdonation) eller ender i frafald, når der går 12 måneder uden ægudtagning, oplægning eller ægdonation.

Til gengæld får klinikken **sin egen rapport** (HTML og PDF): „ud af hver 100 ægudtagninger: hvor mange ender med et barn, hvor mange fortsætter, og hvor mange ender i frafald", hvornår patienterne falder fra, hvordan det varierer med alderen, og hvor god dens data er, med en redigerbar beregner af indtægter i risiko. Har klinikken flere afdelinger, sammenligner rapporten dem med hinanden; den sammenlignes aldrig med en anden organisation. Appen laver den på klinikkens computer.

Hvilke udtræk der skal bestilles: som systemet leverer dem

Der skal ikke bearbejdes noget: ingen beregninger, grupperinger eller omkodning. Eksportér hvert udtræk **komplet, som det kommer** (Excel eller CSV, med de kolonnenavne, det nu har). Periode: alle ægudtagninger, siden registreringen blev pålidelig (helst 3 år eller mere), og alt, hvad der skete bagefter.

Udtræk	Niveau	Hvad det skal indeholde
Ægudtagninger	Påkrævet	Patient (samme nummer i alle udtræk), dato og type ægudtagning (egne æg, donor, nedfrysning af æg, aflyst), alder ved ægudtagningen (eller fødselsdato) og, hvis klinikken har mere end én afdeling, klinikken. Hvis det findes: læge, betaler, tidligere behandlinger.
Oplægninger	Påkrævet	Patient, dato, klinik (hvis der er mere end én) og udfaldet (negativ, graviditetstab, levendefødsel, igangværende graviditet), ikke kun β-hCG; her eller i sit eget udtræk. Hvis det findes: dato for graviditetstab, embryoets oprindelse (egne æg eller donor), hvilken ægudtagning embryonerne kom fra (ægudtagningens nummer eller dato), oplægningsnummer.
Skæringsdato	Påkrævet	Den dato, registreringerne er komplette til og med. Det kan være eksportdatoen. Desuden: fra hvilken dato hver klinik har komplette registreringer (det skal bruges til at afgøre, om en ægudtagning er den første eller ej).
Ægdonation	Påkrævet, hvis der er et ægdonationsprogram	Patient og dato for cyklussen. Uden dette udtræk står en patient, der går over til ægdonation, som frafald, og raten bliver højere, end den reelt er.

Embryologi pr. ægudtagning	Stærkt anbefalet	Patient og dato (eller nummer) for ægudtagningen; pr. embryo: stadie, PGT-A-resultat og anvendelse (eller optællingerne pr. ægudtagning). Har I ikke PGT-A-resultatet, så i det mindste om embryoet blev biopteret. Det er den eneste oplysning, der skelner frafald uden levedygtige embryoner (G1) fra dem, der havde embryoner og ikke fik oplægning (G2a).
Nedfrysning	Anbefalet	Patient og nedfrysningsdato; hvis muligt også dato og type for udtag. Har I kun den aktuelle beholdning, kan den også bruges til frafaldene: efter det sidste indgreb var der ingen bevægelser.
Graviditetsudfald	Kun hvis nødvendigt	Kun hvis udfaldet ikke står i Oplægninger: patient, udfald og dato (eller oplægningsnummer).
Pris for en ægudtagning og en oplægning	Valgfri	Klinikkens honorar, uden medicin. Det bruges i rapportens indtægtsberegner; sender I det ikke, kommer beregneren med tomme felter, som I selv kan udfylde.

Minimum for at tallet er pålideligt

- **Samme patientnummer** i alle udtræk og på alle klinikker; nummererer hver klinik forskelligt, så koblingstabellen. Skiftede I system eller nummerering i perioden, så hvornår.
- **Udfaldet** af hver oplægning, ikke kun β-hCG.
- **Typen af hver ægudtagning**: egne æg, donor, nedfrysning af æg eller aflyst (eller eksportér kun dem med egne æg, og skriv det til os).
- **Alderen** ved hver ægudtagning, i år. Uden alder er der ingen rapport efter alder (under 35, 35 til 40, over 40).
- **Klinikken** i alle udtræk, hvis der er mere end én.
- **Datoen for indgrebet**, ikke datoen for registreringen i systemet.

Med embryologi og nedfrysning skelner rapporten mellem frafald med og uden embryoner på frys; uden de udtræk nævnes det som en begrænsning.

Appen tager udtrækkene, som de kommer

- **Én fil med flere udtræk** (en Excel-projektmappe med flere ark eller et systemudtræk med al aktivitet).
- **Ét udtræk i flere filer** (pr. klinik eller fra før og efter et systemskifte): de lægges sammen.

Hvis I mangler en oplysning

- Send udtrækket alligevel, uden den kolonne, og giv os besked. Udfyld den ikke i hånden: en manglende oplysning vises som manglende; en opdigtet forvrænger resultatet. Mangler oplysningen kun i nogle rækker, så lad cellen stå tom; skriv ikke 0.
- Ligger den i et andet system (f.eks. laboratoriets), så eksportér også det udtræk,

- **Én række pr. cyklus eller pr. patient**: appen deler den op i ægudtagninger og oplægninger og beder dig bekræfte.
- **Journalnummeret som patientnummer**: det erstattes af en intern kode, når filen læses.
- Bruger laboratoriet **et andet patientnummer**, så send også koblingstabellen mellem de to.

som det kommer.

- Kan et udtræk ikke eksporteres, så giv os besked, så finder vi sammen ud af, hvordan det kan trækkes ud: det skal ikke skrives af i hånden i en Excel-fil.

Privatliv: data forlader aldrig computeren

- Alt beregnes på denne computer: intet sendes til internettet.
- Navne, CPR-numre, mails og telefonnumre kasseres, når filen læses; hvis journalnummeret er den eneste nøgle, erstattes det af en intern kode.
- Excel-filen, der kommer ud, indeholder kun antal og procenter, ingen datoer eller patientkoder; ingen celle viser antal mellem 1 og 10.

Sådan afleveres det

Åbn LUUMA-appen på klinikkens computer, træk udtrækkene ind, gennemgå det, appen spørger om, og send os den **Excel-fil til LUUMA**, den laver (kun antal og procenter). Klinikken beholder sin rapport.

Ordliste

Frafald pr. cyklus
Cyklussen endte ikke med et barn, og der gik 12 måneder uden ægudtagning, oplægning eller donoræg-cyklus på klinikken efter den sidste procedure. Konsultationer og undersøgelser tæller ikke som procedurer. Det er rapportens primære mål.

Typer af frafald
G1: ægudtagningen gav ingen levedygtige embryoner (ingen oocytter, ingen blastocyster eller alle aneuploide). G2a: der var embryoner tilbage, og der var ingen oplægning i cyklussen. G2b: efter oplægninger uden succes er der embryoner tilbage. G3: efter oplægninger uden succes er der ingen tilbage.

Ægudtagning
Follikelaspiration for at hente patientens egne æg. Hver ægudtagning starter en behandlingscyklus.

Type ægudtagning
Egen: patientens egne æg til hendes egen behandling (den eneste type, der åbner en cyklus). Donor: ægudtagning fra en ægdonor i donationsprogrammet. Nedfrysning: æg vitrificeret til senere brug. Aflyst: der blev ikke udført aspiration.

Cyklus
En ægudtagning og alt, hvad der følger: oplægninger af dens embryoner, indtil succes, en ny ægudtagning eller ægdonation, eller frafald.

Oplægning
Embryotransfer: et eller flere embryoner lægges op i livmoderen, friske eller nedfrosne.

Embryologi pr. ægudtagning
Laboratoriets udtræk for hver ægudtagning: oocytter, MII, embryoner, blastocyster og, pr. embryo, PGT-A-resultat og hvad der skete med det. Både én række pr. ægudtagning og én pr. embryo virker.

MII
Moden oocyt (metafase II): den eneste type, der kan befrugtes.

Blastocyst
Embryo på dag 5 til 7 i udviklingen. Det stadie, hvor der tages biopsi til PGT-A, og hvor de fleste embryoner lægges op eller vitrificeres.

PGT-A
Præimplantationsgenetisk test for aneuploidi: der tages biopsi af blastocysten for at se, om den har det normale antal kromosomer.

Euploid, aneuploid, mosaik
PGT-A-resultater. Euploid: normalt antal kromosomer. Aneuploid: unormalt antal; lægges ikke op. Mosaik: en blanding af normale og unormale celler; tæller indtil videre som levedygtig. Intet resultat: biopsien gav ingen diagnose; tæller som ikke testet.

Levedygtigt embryo
En blastocyst, der ikke er aneuploid (euploid eller ikke testet). Ægudtagningen gav ingen, hvis der ikke var oocytter eller blastocyster, eller hvis alle var aneuploide. Appen udregner det ud fra embryologi-udtrækket.

Nedfrysning
Embryoner vitrificeret (nedfrosset) i klinikkens bank. Udtrækket viser, hvornår hvert embryo kom ind, og hvornår det kom ud (optøet, kasseret eller flyttet); ud fra det tæller appen, hvor mange der er tilbage efter hver oplægning.

Resterende embryoner
Patientens nedfrosne embryoner efter en oplægning: dem, der var frosset ned til og med den dag og ikke er optøet, kasseret eller flyttet. Embryoner optøet til den oplægning tæller som brugt. Det adskiller frafald med og uden nedfrosne embryoner.

Ægdonation
Behandling med donoræg eller donorembryoner. I denne måling tæller skift til ægdonation som fortsat behandling.

Graviditetsudfald
Hvordan det endte: negativ (inkl. biokemisk og ekstrauterin), graviditetstab, levendefødsel, igangværende graviditet på skæringsdatoen eller ikke registreret. En positiv β-hCG uden udfald tæller som ikke registreret.

Proceduredato
Den dag, ægudtagningen eller oplægningen blev udført, ikke den dag, den blev registreret i systemet.

Skæringsdato
Den sidste dag, hvor registreringerne er komplette. Den viser, hvilke cyklusser der har haft 12 måneders opfølgning. Det er ikke datoen for sidste kontakt med hver patient.

Tidligere behandlinger
Behandlinger med assisteret reproduktion, som patienten fik før sin første ægudtagning i perioden, på denne eller en anden klinik. Valgfrit.

Patientnummer eller journalnummer
Det id, klinikken bruger, og det samme i alle udtræk (også laboratoriets og embryobankens). Bruger laboratoriet et andet nummer, kan en koblingstabel mellem de to bruges. Journalnummeret erstattes af en intern kode, når filen læses, og forlader aldrig computeren.

Klinik
Hver klinik eller hvert center i organisationen, hvor proceduren blev udført. Indgår i alle udtræk, hvis der er mere end én.

Celler under 11
Af hensyn til privatlivet viser ingen række eller celle i Excel-filen antal mellem 1 og 10: de står tomme, så ingen kan identificeres.