



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA – T – 4

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Roca caja, hematita, magnetita	95	Masivo	En toda la roca
Antigorita	5	Masiva	Como fibras direccionadas

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Antigorita	5	Débil	Alterando gran parte de la roca

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Peridotita

Alteraciones: Serpentinización

Condiciones Fisicoquímicas (ph, T, P, otros):

T = 350 – 500°C

Ph = 8 – 12

Tipo de Yacimiento: Magmático



Código de Muestra

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Roca caja, hematita, magnetita	90	Masiva	En toda la roca
Antigorita	10	Masivo	Se encuentra de manera irregular, alterando la roca

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Antigorita	10	Moderado	Restos de protolito

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Peridotita

Alteraciones: Serpentinización

Condiciones Fisicoquímicas (ph, T, P, otros):

T = 350 – 500°C

Ph = 8 – 12

Tipo de Yacimiento: Magmático

Apellidos y Nombres

YACIMIENTOS MINERALES GE – 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

MA – T – 18



Código de Muestra

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Roca máfica, magnetita, hematita	93	Masiva	En toda la roca
Piroxenos	5	Masivo – inclusión	Como relictos
Óxidos	2	Diseminado	Disperso en la roca
Antigorita	<1	En toda la roca	Tiene ligero direccionamiento

2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Óxidos	2	Débil	En varias zonas
Antigorita	<1	Incipiente	No hay mucha alteración

4.- Secuencia paragenética



	STAGE I	STAGE II	STAGE III
Roca caja	=====		
Piroxenos	=====		
Antigorita		-----	
Óxidos			-----

5. Interpretación

Protolito: Peridotita

Alteraciones: Oxidación (supergeno)

Condiciones Fisicoquímicas (ph, T, P, otros):

T = variable

Ph = variable

Tipo de Yacimiento: Magmático

Apellidos y Nombres



Código de Muestra

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Roca caja, magnetita, hematita	80	Masiva	Distribuido por toda la roca
Antigorita	20	Masiva	Alterando ciertas zonas
Óxidos	<1	Inclusión	Dispersado


2.- Esquema



3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Antigorita	20	Moderado	Quedan alguno relictos

4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Peridotita

Alteraciones: Serpentinización y ¿argilización?

Condiciones Fisicoquímicas (ph, T, P, otros):

T = 350 – 500°C

Ph = 8 – 12

Tipo de Yacimiento: Magmático



YACIMIENTOS MINERALES GE – 701
Formato de Descripción de Muestras Minerales

Código de Muestra

MA – T - 36

1. Mineralogía y Texturas (Menas y Gangas)

Minerales	%	Texturas	Observaciones (distribución, etc)
Roca caja, magnetita, hematita	98	Masiva	En casi toda la roca
Óxidos	2	Diseminado	Dispersado en las antigorita
Antigorita	<1	Masivo	Dispersado en la roca

2.- Esquema




3.- Ensamblajes de Minerales de Alteración Hidrotermal / Supérgeno

Minerales	%	Intensidad de Alteración (incipiente, débil, moderada, intensa, pervasiva)	Observaciones (distribución, etc)
Óxidos	2	Incipiente	Se en pocas tonalidad en muchos lugares
Antigorita	<1	Incipiente	Posee direccionamiento



4.- Secuencia paragenética



5. Interpretación

Protolito: Peridotita

Alteraciones: Serpentinización y oxidación

Condiciones Fisicoquímicas (ph, T, P, otros):

T = 350 – 500°C (magmático)

Ph = 8 – 12

Tipo de Yacimiento: Magmático