

## Eksamensopgave 2

### C: Numerisk løsning af differentialligninger: Modificeret Euler

#### Eulers metode:

Vi skal nu se på numeriske løsninger af sædvanlige differentiale ligninger. Disse er skrevet på formen:

$$y'(x) = f(x, y) = f(x, y(x))$$

Med begyndelsesbetingelsen:

$$y(x_0) = y_0$$


Hvis vores funktion  $f$  er en glat funktion (dvs. at den kan differentieres bare én gang) i intervallet  $I$  da har vores  $y'(x)$  med tilhørende begyndelsesbetingelse en entydig løsning for ethvert  $x_0 \in I$  og  $y_0 \in \mathbb{R}$ .

Denne løsning findes ikke eksplicit, men kan tilnærmes med numerisk beregning ved brug af Eulers metode.

Man går ud fra at man kender et punkt  $(x_0, y_0)$  hvori tangenthældningen bliver:

$$\begin{aligned} y'(x_0) &= f(x_0, y(x_0)) \\ &= f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Ser vi det på en graf får vi:



Vi kan altså opskrive følgende:

$$y(x_1) \approx y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)(x_1 - x_0)$$


Altså en approksimation til vores graf  $y(x)$ . Sætter vi  $h = (x_1 - x_0)$  får vi:

$$\text{Eulers første skridt} \rightarrow y(x_1) = y(x_0 + h) \approx y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)h$$

$$\text{Eulers andet skridt} \rightarrow y(x_2) = y(x_1 + h) \approx y_2 = y_1 + f(x_1, y_1)h$$

$$\text{Eulers n'te skridt} \rightarrow y(x_{k+1}) \approx y_{k+1} = y_k + f(x_k, y_k)h$$

Efter nogle skridt får man:



Som man kan se er der tale om to typer fejl:

1. Lokal fejl i stedet for at følge kurven i det k'te skridt så følger vi en 1. ordens Taylor.
2. Vi starter i et "forkert" punkt i det k'te skridt.

Ved denne metode skal der huskes på at der bliver brugt Taylor, skal der også tages højde for et restled:

$$y(x_1) = y_0 + f(x_0, y_0)h + R_1(x_1)$$

Hvor

$$|R_1(x_1)| \leq \frac{h^2}{2} y''(\xi)$$

Den lokale fejl er dermed

$$|y(x_1) - y_1| \leq |R_1(x_1)| \leq \frac{h^2}{2} M$$

Som viser at Eulers metode er af anden orden.

Den globale fejl er derefter N gange lokale fejl

$$E = NMh^2 = M(b-a)h$$

da

$$Nh = b - a$$

Den globale fejl for Eulers metode er derfor af første orden.

Lokale fejl:  $E_N = h^2 M = \left(\frac{b-a}{N}\right)^2 M$

$$\frac{E_N}{E_{2N}} = \frac{\left(\frac{b-a}{N}\right)^2 M}{\left(\frac{b-a}{2N}\right)^2 M} = 4$$

Fejlen bliver altså en faktor 1/4 mindre ved en fordobling af N.

## Modificeret Euler

Generelt:

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[k_1 + k_2]$$

Hvor  $k_1 = f(x_n, y_n)$ ,  $k_2 = f(x_{n+1}, y_n + h \cdot k_1)$ .

