事件 A 有 4 个样本点，从而点数之和等于 5 的概率为

$$P(A)=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}.$$

（2）将所得点数相等这个事件用 B 表示. 类似地，有

$$B=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\},$$

因此

$$P(B)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}.$$

（3）将所得点数都是偶数这个事件用 C 表示，类似地，有

$$C=\{(2,2),(2,4),(2,6),(4,2),(4,4),$$
$$(4,6),(6,2),(6,4),(6,6)\},$$

因此

$$P(C)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}.$$

（4）将所得点数相差 2 这个事件用 D 表示，类似地，有

$$D=\{(1,3),(3,1),(2,4),(4,2),(3,5),(5,3),(4,6),(6,4)\},$$

因此

$$P(D)=\frac{8}{36}=\frac{2}{9}.$$

练习 12.2(1)

1. 同时掷 2 颗骰子，求：

（1）所得点数和为 6 的概率；

（2）所得点数和不大于 6 的概率.

2. 抛掷 3 枚硬币，求下列事件的概率：

（1）恰有 2 枚正面朝上；

（2）最多 1 枚正面朝上.

2 等可能性(续)

在上一节说过，随机现象的样本空间的选取依赖于观察的角度，但其中事件的概率与观察角度这一主观因素无关，是确定唯一的. 在古典概率模型中，随着观察角度的不同，并非所有的样本空间都有等可能性. 例如，抛掷两枚硬币，样本空间{正正，正反，反正，反反}中的样本点是等可能的，但样本空间{两正，一正一反，两反}却不是等可能的. 虽然取什么样本空间