数“=RANDBETWEEN(1,100)”所产生的 1～100 之间的随机整数.




图 13-3-2

注意，利用计算机或计算器产生的随机数实际上是伪随机数，因为它们是由确定的过程所产生的，尽管这个过程可能很复杂.

利用计算器也可以帮助我们生成随机数. 一般计算器内部都有一个随机函数“RAND”，它可以产生 0～1 的随机数.

练习 13.3(1)

1. 下列抽取样本的方法是简单随机抽样吗？判断并简要说明理由.

(1) 某在线商城在网站首页发布问卷调查，调查登录该网站的客户对于该商城的满意度，访问该网站者可以自愿点击填写；

(2) 检验员抽检一箱零件，每次检验时抽取 1 个零件，检验后放回箱子里，再进行第二次检验，一共检验了 10 次.

2. 写出 10 首歌曲的名称，用抽签法抽取其中 3 首.

3. 现从编号为 1～500 的 500 支水笔中抽取 10 支水笔进行书写长度检测. 试用随机数法抽出这 10 支水笔对应的编号.

2 分层随机抽样

某高中为了解高一年级新生的身高情况，计划抽取 50 名学生测量身高. 由于不同性别的学生身高差异较大，人数也可能不一样，因此不适合用前面介绍的简单随机抽样. 我们希望抽取的样本中男女生的比例与全部高一年级新生的男女比例大致相同，这样得到的样本才具有代表性. 这就要求在抽样的过程中，不仅要使得总体中每个个体被抽到的可能性相同，而且应注意总体中个体的某些分类属性，使得所抽取的样本能更明确地反映出总体的特征.