表 13-3　A 校 66 名高一年级学生身高的频率分布表

身高分组区间	频数	频率	累积频数
[151.5,154.5)	3	0.05	3
[154.5,157.5)	6	0.09	9
[157.5,160.5)	6	0.09	15
[160.5,163.5)	4	0.06	19
[163.5,166.5)	12	0.18	31
[166.5,169.5)	8	0.12	39
[169.5,172.5)	8	0.12	47
[172.5,175.5)	7	0.11	54
[175.5,178.5)	8	0.12	62
[178.5,181.5)	2	0.03	64
[181.5,184.5]	2	0.03	66

表 13-3 中由样本值低的组向高的组逐组累计频数称为向上累积频数，而由样本值高的组向低的组逐组累计频数则称为向下累积频数.

统计频数时可以直接写数，也可以画“正”字.

与先前看起来毫无规律的数据相比，表 13-3 清晰地给出了每组数据是如何分布的. 我们可以一目了然地看出在每个身高范围内有多少名学生：身高在 163.5 cm 到 166.5 cm 之间的学生人数最多，在 166.5 cm 到 169.5 cm 之间、169.5 cm 到 172.5 cm 之间的学生人数次之，而在 178.5 cm 到 181.5 cm、181.5 cm 到 184.5 cm 之间的学生人数最少.

依据上述频率分布表，我们就可以来制作**频率分布直方图**(frequency distribution histogram). 为此，我们在直角坐标系中把横轴分成若干段，每一段对应一个组距，然后以组距形成的线段为底作一矩形，矩形的高为小组的$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$，就得到如图 13-4-1 所示的频率分布直方图.




图 13-4-1　A 校 66 名高一年级学生身高的频率分布直方图