


图 13-5-2

女大学生的样本，由于这个样本极有可能会包含和上一个样本不同的学生，因此每个区间内的样本数的频率会有所不同，即样本具有变异性. 但当样本量较大时，样本中每个区间内的样本数的频率会稳定于总体在相应区间内取值的概率，不会有太大的变动. 当然，样本容量越大，采集这些样本所需要耗费的人力、物力和财力就会越多，所以应根据实际情况选择适当容量的样本.

练习 13.5(1)

1. 某学生第二天要参加 100 m 短跑比赛，他记录了比赛前一日集训中 20 次 100 m 短跑的成绩(单位：s)：

13.4　13.6　14.3　15.3　12.8　13.1　14.5　13.8　14.2　15.0

13.4　13.7　13.5　12.5　12.9　14.9　12.9　14.6　14.3　15.5

(1) 制作频率分布表；

(2) 试估计该学生在 100 m 短跑比赛中用时低于 14 s 的可能性.

2. 某展览馆随机抽取了 2018 年中 5 周的客流量(单位：人次)，如下表所示. 试估计该展览馆 2018 年有多少天的客流量超过了 200.

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
第 1 周	170	148	85	132	180	395	342
第 2 周	140	138	193	108	163	360	441
第 3 周	127	179	215	184	116	454	405
第 4 周	174	252	240	155	293	493	386
第 5 周	241	132	156	203	189	357	430