



จดหมายข่าว

HPVC Safety News



ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร. 0 2590 7261, 0 2590 7288 โทรสาร 0 2591 8457 <http://thaihpvc.fda.moph.go.th>, e-mail : adr@fda.moph.go.th

ฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2568 วันที่ 5 กันยายน 2568

อาการ NAION เป็นผลข้างเคียงที่พบได้ “น้อยมาก” จากการใช้ยา semaglutide

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งว่าหน่วยงาน European Medicines agency (EMA) โดยคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงจากการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee: PRAC) ได้ทบทวนข้อมูลการทดลอง ข้อมูลความปลอดภัยด้านยาหลังออกสู่ตลาด และข้อมูลวิชาการของยา semaglutide ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม GLP-1 receptor agonist ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน แล้วจึงมีคำแนะนำให้เพิ่ม non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) ซึ่งเป็นอาการทางตาที่ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็น เป็นผลข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก (very rare) ในข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (product information) ของยา semaglutide ทั้งนี้หากผู้ใช้ยาเกิดการสูญเสียการมองเห็นฉับพลันหรือสายตาสว่างอย่างรวดเร็วระหว่างใช้ยาควรพบแพทย์ทันที และหากได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าเป็น NAION แล้ว แพทย์ควรพิจารณาหยุดใช้ยา semaglutide ทันที

คำแนะนำของ PRAC จะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการใช้ของมนุษย์ (Committee for Medicinal Products for Human Use: CHMP) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาที่ใช้ในมนุษย์พิจารณาต่อไป โดยความเห็นของ CHMP นี้จะเป็นความเห็นอย่างเป็นทางการของ EMA

ข้อมูลในประเทศไทย

1) จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนจากฐานข้อมูลของสำนักงานฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568) พบการขึ้นทะเบียนของยา semaglutide ในประเทศไทย จำนวน 12 ทะเบียน ในรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังและรับประทาน และจากการสุ่มตรวจสอบเอกสารกำกับยาไม่พบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ NAION โดยตรง แต่มีการระบุถึงการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy complications) ทั้งนี้ในเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชนมีการระบุถึงการมองเห็นผิดปกติ ตาพร่ามัว การมองเห็นลดลง จัดเป็นอาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

2) จากฐานข้อมูล Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568) พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา semaglutide ทั้งสิ้น 105 ฉบับ แต่ไม่พบอาการ NAION หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับตาหรือการมองเห็น

อนึ่งหากท่านพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องจากการใช้ยา semaglutide ขอได้โปรดแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ AE online reporting ที่เว็บไซต์ <https://hpvc.thai.fda.moph.go.th/> หรือลงข้อมูลในแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือส่งถึงอีเมล adr@fda.moph.go.th

เอกสารอ้างอิง

1. European Medicines Agency. PRAC concludes eye condition NAION is a very rare side effect of semaglutide medicines Ozempic, Rybelsus and Wegovy [Internet]. Amsterdam: EMA; 2025 Jun 6 [revised 2025 Jun 13; cited 2025 Aug 18]. Available from: <https://www.ema.europa.eu/en/news/prac-concludes-eye-condition-naion-very-rare-side-effect-semaglutide-medicines-ozempic-rybelsus-wegovy>

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ระบบสืบค้นข้อมูลยาจากทะเบียนตำรับยา [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; [เข้าถึงเมื่อ 18 ส.ค. 2568]. เข้าถึงได้จาก: https://pertento.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx