


แนวทางการรักษาภาวะจอตาเสื่อมแบบมีเส้นเลือดงอกใหม่
(Preferred practice pattern for neovascular age-related macular degeneration: nAMD
และ Polypoidal choroidal vasculopathy: PCV)




* ข้อควรระวังในการใช้ยากลุ่ม anti-VEGF ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีประวัติ stroke, severe cardiovascular diseases, myocardial infarction

** การใช้เลเซอร์เย็น (Photodynamic therapy) จะพิจารณารักษาต่อเมื่อผู้ป่วยมีผลตรวจการฉีดสี Fluorescence angiography หรือ Fluorescence angiography ร่วมกับ Indocyanine green angiography ที่จอตา

หมายเหตุ: ข้อบ่งชี้ใดที่มียาให้เลือกรักษามากกว่า 1 ชนิดและมียาในบัญชียาหลักในกลุ่มยาเหล่านั้น แนะนำให้เลือกใช้ยาในบัญชียาหลักก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนการเปลี่ยนยาให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

แนวทางการรักษาภาวะจุดภาพชัดบวมน้ำจากเบาหวาน (Preferred practice pattern for diabetic macular edema)



* ในกรณีที่มีพังผืดดึงรั้งที่ผิวจอตา ให้พิจารณาการผ่าตัดจอตาาร่วมด้วย

** ข้อควรระวังในการใช้ยากลุ่ม anti-VEGF ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีประวัติ stroke, severe cardiovascular diseases, myocardial infarction

หมายเหตุ: ข้อบ่งชี้ใดที่มียาให้เลือกรักษามากกว่า 1 ชนิดและมียาในบัญชียาหลักในกลุ่มยาเหล่านั้น แนะนำให้เลือกใช้ยาในบัญชียาหลักก่อนเป็นลำดับแรก ส่วนการเปลี่ยนยาให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์