





กรณีที่ยังไม่มีปัญหา การตรวจคัดกรองจะประเมินจากขนาดยา ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ โรคประจำตัวที่มี ตลอดจนยาที่ผู้ป่วยใช้ โดยในผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มนี้ และวิธีในการคัดกรองปัจจุบันจะเน้นที่การตรวจลานสายตา และ spectral domain OCT

เอกสารอ้างอิง

1. Marmor MF, Kellner U, Lai TYY, Melles RB and Mieler WF. for American Academy of Ophthalmology . Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision). Ophthalmology 2016;123(6):1386-94.



Vol. 30 No. 2 July-December 2016



ที่ได้รับ HCQ 8 mg/kg 8 ปี และต่อมาลดลงเหลือ 4 mg/kg
... (FBC) ...

o. 2 July-December 2016

บทความพิเศษ

ผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine quine (HCQ)

ลานสายตาชนิด 10-2 และ spectral domain OCT พบว่า
มีถึงร้อยละ 7.5 ในเวลา 5 ปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิด