

Задача 1

Определим $f(x)$ как подынтегральную функцию, и $h(x)$ как ее знаменатель:

$$I(a) = \int_0^{\infty} \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \equiv \int_0^{\infty} f(x) dx \equiv \int_0^{\infty} \frac{1}{h(x)} dx, \quad h(x) = xa^2 + (1-x^2)^2.$$

I. $a \gg 1$

При очень малых x , т.е. $xa^2 \ll 1$, следует

$$x \ll \frac{1}{a^2} \ll 1 \Rightarrow (1-x^2)^2 \approx 1 \Rightarrow h(x) \sim 1 \Rightarrow f(x) \sim 1.$$

При $xa \sim 1$:

$$xa^2 \sim a \gg 1, \quad x \sim \frac{1}{a} \ll 1 \Rightarrow (1-x^2)^2 \approx 1 \Rightarrow h(x) \sim a \gg 1 \Rightarrow f(x) \ll 1,$$

следовательно, интеграл набирается в некой окрестности нуля $x \leq x' \sim \frac{1}{a} \ll 1$, а значит в $h(x)$ можно отбросить члены высших порядков малости и интегрировать от 0 до x' :

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \approx \int_0^{x'} \frac{1}{xa^2 + 1} dx = \frac{1}{a^2} \int_0^{x'} \frac{1}{xa^2 + 1} d(xa^2 + 1) = \\ &= \frac{1}{a^2} \frac{-1}{(xa^2 + 1)^2} \Big|_0^{x'} = \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{1}{(x'a^2 + 1)^2} \right), \quad x' \sim \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{(x'a^2 + 1)^2} \sim \frac{1}{a^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

ответ:

$$I(a) \approx \frac{1}{a^2}$$

II. $a \ll 1$

При $x \ll 1$ выполняется

$$xa^2 \ll 1, (1-x^2)^2 \sim 1 \Rightarrow h(x) \sim 1 \Rightarrow f(x) \sim 1,$$

при $x \gg 1$:

$$(1-x^2)^2 \gg 1 \Rightarrow h(x) \gg 1 \Rightarrow f(x) \ll 1.$$

При $x = 1 + \varepsilon$, $\varepsilon \ll 1$:

$$h(x) = (1+\varepsilon)a^2 + (2\varepsilon + \varepsilon^2)^2 \ll 1 \Rightarrow f(x) \gg 1,$$

следовательно, интеграл набирается в некой окрестности $1 - \varepsilon' \leq x \leq 1 + \varepsilon'$, $\varepsilon' \ll 1$, а значит в $h(x)$ интегрировать по ε от $-\varepsilon'$ до ε' , отбросив члены высших порядков малости:

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^{\infty} \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \approx \int_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} \frac{1}{(1+\varepsilon)a^2 + (2\varepsilon + \varepsilon^2)^2} d\varepsilon \approx \\ &\approx \frac{1}{2} \int_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} \frac{1}{a^2 + (2\varepsilon)^2} d(2\varepsilon) = \frac{1}{2a} \arctan \frac{2\varepsilon}{a} \Big|_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} = \frac{1}{a} \arctan \frac{2\varepsilon'}{a}. \end{aligned}$$

При $\hat{\varepsilon} \sim \sqrt{a} \hookrightarrow \hat{\varepsilon} \ll 1 \wedge \frac{2\hat{\varepsilon}}{a} \sim \frac{1}{\sqrt{a}} \gg 1$, следовательно, приближения выше будут справедливы при $\varepsilon' \geq \hat{\varepsilon}$ и

$$\frac{1}{a} \arctan \frac{2\varepsilon'}{a} \approx \frac{\pi}{2a},$$

ответ:

$$\boxed{I(a) \approx \frac{\pi}{2a}}$$