

Упражнение 1

I. I_1

Воспользуемся предложенной подстановкой:

$$I_1 = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\infty} dt \int_0^{\infty} \operatorname{Im} (e^{-tx+ix}) dx,$$

$$J(t) = \int_0^{\infty} \operatorname{Im} (e^{-tx+ix}) dx = -\operatorname{Im} \left(\frac{1}{i-t} \right) = \frac{1}{t^2+1},$$

$$I_1 = \int_0^{\infty} J(t) dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+1} dt = \arctan x|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2},$$

ответ:

$$I_1 = \frac{\pi}{2}$$

II. I_2

Для удобства положим $\lambda \geq 0$. Продифференцируем интеграл как функцию от λ по λ :

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} I_2 = \frac{\partial}{\partial \lambda} \int_0^{\infty} \frac{\sin^2 \lambda x}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{2 \sin \lambda x \cos \lambda x}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin 2\lambda x}{x} dx = \frac{\pi}{2},$$

откуда получаем

$$I_2(\lambda) = \frac{\pi \lambda}{2} + C.$$

Из того, что при $\lambda = 0$ подынтегральная функция тождественно равна нулю, и $I_2(0) = C$, следует $C = 0$. Так как подынтегральная функция четна относительно λ , ответ для произвольного λ :

$$I_2 = \frac{\pi |\lambda|}{2}$$