

## Упражнение 4

Пусть  $f(x)$  — степень при экспоненте,  $g(x)$  — подынтегральная функция:

$$f(x) = \lambda (\sin x - x), \quad g(x) = e^{f(x)}.$$

Представим  $f(x)$  в виде

$$f(x) = \lambda \tilde{f}(x), \quad \tilde{f}(x) = \sin x - x$$

. Так как  $\forall x > 0 \hookrightarrow \sin x < x$ , в точке  $\hat{x} = 0$   $\tilde{f}(x)$ , а следовательно, и  $g(x)$ , имеет максимум на участке  $[0, +\infty]$ . Разложим  $f(x)$  по формуле Тейлора:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \lambda \left( -\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \right) = \xi_3(x) + \xi_5(x) + \dots + \xi_{2n-1}(x) + o(x^{2n}).$$

Проверим условия, при которых на участке  $\Delta x$ , на котором набирается данный интеграл, можно пренебречь членами высших порядков:

$$\lambda \rightarrow +\infty, \quad \xi_3(\Delta x) = \frac{1}{6} \lambda (\Delta x)^3 \sim 1, \quad \Delta x \sim \frac{1}{\sqrt[3]{\lambda}} \ll 1 \implies$$

$$\forall k \geq 3 \hookrightarrow \xi_{2k-1}(\Delta x) = \frac{1}{(2k-1)!} \lambda (\Delta x)^{2k-1} \sim \frac{\lambda}{\lambda^{(2k-1)/3}} = \frac{1}{\lambda^{(2k-4)/3}} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{\lambda^2}} \ll \xi_3(\Delta x) \sim 1,$$

а следовательно,

$$I(\lambda) = \int_0^1 e^{\lambda(\sin x - x)} dx \approx \int_0^1 e^{-\frac{1}{6}\lambda x^3} dx.$$

Так как  $\Delta x \ll 1$ ,

$$\begin{aligned} I(\lambda) &= \int_0^1 e^{-\frac{1}{6}\lambda x^3} dx \approx \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{6}\lambda x^3} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\lambda x^2} e^{-\frac{1}{6}\lambda x^3} d\left(\frac{1}{6}\lambda x^3\right) = \\ &= \frac{2}{\sqrt[3]{36\lambda}} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{6}\lambda x^3\right)^{-2/3} e^{-\frac{1}{6}\lambda x^3} d\left(\frac{1}{6}\lambda x^3\right), \quad y = \frac{1}{6}\lambda x^3, \\ I(\lambda) &\approx \frac{2}{\sqrt[3]{36\lambda}} \int_0^{+\infty} y^{-2/3} e^{-y} dy = \frac{2\Gamma(1/3)}{\sqrt[3]{36\lambda}}, \end{aligned}$$

ответ:

$$\boxed{I(\lambda) = \frac{2\Gamma(1/3)}{\sqrt[3]{36\lambda}}}$$