

Домашняя работа №2

Сирий Р. А.

12 февраля 2023 г.

Упражнение 1

Заменяя переменную, обезразмерим интеграл:

$$t = bx, \quad dx = \frac{1}{b} dt, \quad I(a, b) = \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin^2 bx}{x^2} dx = b \int_0^\infty e^{-\frac{a}{b}t} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt.$$

I. $a \gg b$

При $t \sim \sqrt{\frac{b}{a}} \ll 1$ степень при экспоненте $-\frac{a}{b}t \sim -\sqrt{\frac{a}{b}} \ll -1$, следовательно, интеграл набирается при малых t и $\sin^2 t$ можно разложить в ряд:

$$I(a, b) = b \int_0^\infty e^{-\frac{a}{b}t} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \approx b \int_0^\infty e^{-\frac{a}{b}t} \frac{t^2}{t^2} dt = \frac{b^2}{a} \int_0^\infty e^{-\frac{a}{b}t} d\left(\frac{a}{b}t\right) = \frac{b^2}{a},$$

ответ:

$$I(a, b) \approx \frac{b^2}{a}$$

II. $a \ll b$

При $t \sim 10$, знаменатель подынтегральной функции $\frac{1}{t^2} \sim 0.01 \ll 1$, а следовательно подынтегральная функция $f(t) \ll 1$ и интеграл набирается в некой окрестности $0 \leq t \leq t' \sim 10$. При этом степень при экспоненте остается мала: $-\frac{a}{b}t \ll 1$, следовательно

$$e^{-\frac{a}{b}t} \approx 1, \quad I(a, b) = b \int_0^\infty e^{-\frac{a}{b}t} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \approx b \int_0^\infty \frac{\sin^2 t}{t^2} dt.$$

Полученный интеграл вычисляется:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \frac{\sin^2 t}{t} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty t d\left(\frac{\sin^2 t}{t^2}\right) = - \int_0^\infty t d\left(\frac{\sin^2 t}{t^2}\right) \\ &= - \int_0^\infty t \left(\frac{2 \sin t \cos t}{t^2} - \frac{2 \sin^2 t}{t^3} \right) dt = - \int_0^\infty \frac{\sin 2t}{2t} d(2t) + 2I, \quad I = \int_0^\infty \frac{\sin 2t}{2t} d(2t) = \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

ответ:

$$I(a, b) \approx \frac{\pi b}{2}$$

Упражнение 2

I. $a \ll 1, \quad b \sim 1$

Так как $b \sim 1, \forall x \hookrightarrow (x-1)^2 + b^2 \sim C \geq 1$, и при $x \ll 1$ справедливо $\frac{1}{x^2+a^2} \gg 1$, интеграл набирается в некоторой окрестности нуля $0 \leq x \leq x' \ll 1$, и можно пренебречь величинами высших порядков малости:

$$\begin{aligned} I(a, b) &= \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} \frac{1}{(x-1)^2 + b^2} dx \approx \frac{1}{1+b^2} \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{1+b^2} \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \Big|_0^\infty = \\ &= \frac{\pi}{2a(1+b^2)}, \end{aligned}$$

ответ:

$$I(a, b) = \frac{\pi}{2a(1+b^2)}$$

II. $a = b \gg 1$

Предположим, что при больших a на данной области интегрирования можно пренебречь единицей в знаменателе:

$$I(a) = \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} \frac{1}{(x-1)^2 + a^2} dx \approx \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx.$$

Проверку предположения проведем оценкой сверху и снизу:

$$\begin{aligned} a \gg 1 \Rightarrow \forall x \leq \infty, x \geq 0 \hookrightarrow \frac{1}{((x-1)^2 + a^2)^2} &\geq \frac{1}{x^2 + a^2} \frac{1}{(x-1)^2 + a^2} \geq \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} > 0, \\ \Rightarrow \int_0^\infty \frac{1}{((x-1)^2 + a^2)^2} dx &\geq \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} \frac{1}{(x-1)^2 + a^2} dx \geq \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx, \end{aligned}$$

а следовательно, если выполняется

$$I_1 \equiv \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx \approx \int_0^\infty \frac{1}{((x-1)^2 + a^2)^2} dx = \int_{-1}^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx \equiv I_2,$$

что равносильно

$$I_2 - I_1 \ll I_1,$$

то наше предположение верно.

Вычислим полученный неопределенный интеграл. Заменим переменную:

$$x = a \tan u, \quad dx = \frac{a}{\cos^2 u} du, \quad u = \arctan \frac{x}{a},$$

$$\begin{aligned} \hat{I}(x) &= \int \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{1}{a^3} \int \frac{1}{(\tan^2 u + 1)^2 \cos^2 u} du = \frac{1}{a^3} \int \cos^2 u du = \frac{1}{a^3} \int \cos^2 u du = \\ &= \frac{1}{2a^3} \int ((2 \cos^2 u - 1) + 1) du = \frac{1}{4a^3} \int (\cos(2u) + 1) d(2u) = \frac{\sin(2u) + 2u}{4a^3} + C = \\ &= \frac{1}{4a^3} \left(\frac{2 \tan u}{1 + \tan^2 u} + 2u \right) + C = \frac{1}{2a^3} \left(\frac{ax}{a^2 + x^2} + \arctan \frac{x}{a} \right) + C, \end{aligned}$$

откуда:

$$I_1 = \int_0^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3}, \quad I_2 = \int_{-1}^\infty \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3} + \frac{1}{2a^3} \left(\frac{a}{a^2 + 1} + \arctan \frac{1}{a} \right).$$

Проверим предположение:

$$a \gg 1 \Rightarrow I_2 - I_1 = \frac{1}{2a^3} \left(\frac{a}{a^2 + 1} + \arctan \frac{1}{a} \right) \approx \frac{1}{2a^3} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a} \right) \ll \frac{1}{2a^3} \left(\frac{\pi}{2} \right) = I_1,$$

а следовательно наше предположение верно, и $I(a) \approx I_1$, ответ:

$$I(a) \approx \frac{\pi}{4a^3}$$

Упражнение 3

Заменяя переменную, обезразмерим интеграл:

$$t = bx, \quad dx = \frac{1}{b} dt,$$

$$I(a, b) = \int_0^\infty \frac{x}{x^2 + a^2} (1 - \tanh(bx)) dx = \int_0^\infty \frac{t}{t^2 + a^2 b^2} (1 - \tanh t) dt \equiv \int_0^\infty f(t) dt.$$

Так как $a \ll 1$ и $b \ll 1$, выполняется $1 \gg ab \gg a^2 b^2$. Представим интеграл в виде

$$\int_0^\infty f(t) dt = \int_0^{t'} f(t) dt + \int_{t'}^T f(t) dt + \int_T^\infty f(t) dt, \quad 0 < t' < 1, \quad T \sim 1. \quad (1)$$

Предположим, что t' достаточно мал и $\tanh t$ в первом слагаемом можно разложить:

$$\begin{aligned} \int_0^{t'} f(t) dt &\approx \int_0^{t'} \frac{t}{t^2 + a^2 b^2} (1 - t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{t'} \frac{1}{t^2 + a^2 b^2} d(t^2) + \int_0^{t'} \left(1 - \frac{a^2 b^2}{t^2 + a^2 b^2} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \ln(t^2 + a^2 b^2) - t + ab \arctan \frac{t}{ab} \Big|_0^{t'} = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{t'^2}{a^2 b^2} \right) - t' + ab \arctan \frac{t'}{ab}. \end{aligned}$$

При $t' = 1/2$, $\tanh t' \approx t'$ с точностью примерно 10%, и это значение подойдет для грубых оценок с логарифмической точностью. Для данного t' получаем:

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{t'^2}{a^2 b^2} \right) - t' \approx -\ln(ab) + \ln(t') - t' = -\ln(ab) + C_1, \quad C_1 \sim 1,$$

$$ab \arctan \frac{t'}{ab} < \frac{\pi ab}{2} \ll 1, \implies$$

$$\int_0^{t'} f(t) dt \approx -\ln(ab) + C_1, \quad C_1 \sim 1.$$

Для оценки третьего слагаемого из (1) возьмем $T = 2$:

$$a^2 b^2 \ll t' \Rightarrow \forall t \geq T > t' \hookrightarrow \frac{t}{t^2 + a^2 b^2} \approx \frac{1}{t}, \quad t \geq T = 2 \implies$$

$$C_3 \equiv \int_T^\infty f(t) dt \approx \int_T^\infty \frac{1}{t} (1 - \tanh t) dt = \int_T^\infty \frac{1}{t} \frac{2e^{-2t}}{1 + e^{-2t}} dt < \int_T^\infty e^{-2t} dt = e^{-4} \sim 10^{-2},$$

а, следовательно, при расчете с логарифмической точностью им можно пренебречь.

Так как для $t \geq t'$ выполняется

$$f(t) \approx \frac{1}{t} (1 - \tanh t) \geq f(t + \varepsilon), \quad \varepsilon > 0,$$

т.е. $f(t)$ не имеет экстремальных точек при $t \geq t'$, оценим грубо второе слагаемое из (1) как площадь трапеции:

$$C_2 \equiv \int_{t'}^T f(t) dt \sim \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t'} (1 - \tanh t') + \frac{1}{T} (1 - \tanh T) \right) \approx \frac{1}{2},$$

откуда получаем

$$\int_0^\infty f(t) dt = -\ln(ab) + (C_1 + C_2 + C_3) = -\ln(ab) + C, \quad C \sim 1,$$

ответ:

$$\boxed{I(a, b) = -\ln(ab) + C, \quad C \sim 1}$$

Упражнение 4

$$S(a, b) = \sum_{n=0}^{\infty} n^a e^{-bn}$$

I. $a \sim 1, \quad b \ll 1$

II. $b \gg \frac{a}{b} \gg 1$

Задача 1

Определим $f(x)$ как подынтегральную функцию, и $h(x)$ как ее знаменатель:

$$I(a) = \int_0^\infty \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \equiv \int_0^\infty f(x) dx \equiv \int_0^\infty \frac{1}{h(x)} dx, \quad h(x) = xa^2 + (1-x^2)^2.$$

I. $a \gg 1$

При очень малых x , т.е. $xa^2 \ll 1$, следует

$$x \ll \frac{1}{a^2} \ll 1 \Rightarrow (1-x^2)^2 \approx 1 \Rightarrow h(x) \sim 1 \Rightarrow f(x) \sim 1.$$

При $xa \sim 1$:

$$xa^2 \sim a \gg 1, \quad x \sim \frac{1}{a} \ll 1 \Rightarrow (1-x^2)^2 \approx 1 \Rightarrow h(x) \sim a \gg 1 \Rightarrow f(x) \ll 1,$$

следовательно, интеграл набирается в некой окрестности нуля $x \leq x' \sim \frac{1}{a} \ll 1$, а значит в $h(x)$ можно отбросить члены высших порядков малости и интегрировать от 0 до x' :

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \approx \int_0^{x'} \frac{1}{xa^2 + 1} dx = \frac{1}{a^2} \int_0^{x'} \frac{1}{xa^2 + 1} d(xa^2 + 1) = \\ &= \frac{1}{a^2} \frac{-1}{(xa^2 + 1)^2} \Big|_0^{x'} = \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{1}{(x'a^2 + 1)^2} \right), \quad x' \sim \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{(x'a^2 + 1)^2} \sim \frac{1}{a^2} \Rightarrow \end{aligned}$$

ответ:

$$I(a) \approx \frac{1}{a^2}$$

II. $a \ll 1$

При $x \ll 1$ выполняется

$$xa^2 \ll 1, (1-x^2)^2 \sim 1 \Rightarrow h(x) \sim 1 \Rightarrow f(x) \sim 1,$$

при $x \gg 1$:

$$(1-x^2)^2 \gg 1 \Rightarrow h(x) \gg 1 \Rightarrow f(x) \ll 1.$$

При $x = 1 + \varepsilon, \quad \varepsilon \ll 1$:

$$h(x) = (1 + \varepsilon)a^2 + (2\varepsilon + \varepsilon^2)^2 \ll 1 \Rightarrow f(x) \gg 1,$$

следовательно, интеграл набирается в некой окрестности $1 - \varepsilon' \leq x \leq 1 + \varepsilon'$, $\varepsilon' \ll 1$, а значит в $h(x)$ интегрировать по ε от $-\varepsilon'$ до ε' , отбросив члены высших порядков малости:

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_0^\infty \frac{1}{xa^2 + (1-x^2)^2} dx \approx \int_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} \frac{1}{(1+\varepsilon)a^2 + (2\varepsilon + \varepsilon^2)^2} d\varepsilon \approx \\ &\approx \frac{1}{2} \int_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} \frac{1}{a^2 + (2\varepsilon)^2} d(2\varepsilon) = \frac{1}{2a} \arctan \frac{2\varepsilon}{a} \Big|_{-\varepsilon'}^{\varepsilon'} = \frac{1}{a} \arctan \frac{2\varepsilon'}{a}. \end{aligned}$$

При $\hat{\varepsilon} \sim \sqrt{a} \hookrightarrow \hat{\varepsilon} \ll 1 \wedge \frac{2\hat{\varepsilon}}{a} \sim \frac{1}{\sqrt{a}} \gg 1$, следовательно, приближения выше будут справедливы при $\varepsilon' \geq \hat{\varepsilon}$ и

$$\frac{1}{a} \arctan \frac{2\varepsilon'}{a} \approx \frac{\pi}{2a},$$

ответ:

$$I(a) \approx \frac{\pi}{2a}$$

Задача 2

I. $b \gg a$

Так как $b \gg a$ и $0 \leq x \leq a$, $x \ll a \implies$

$$e^{\frac{x}{b}} \approx 1 + \frac{x}{b}, \quad \int_0^a \frac{x^n}{e^{\frac{x}{b}} - 1} dx \approx \int_0^a bx^{n-1} dx = \frac{bx^n}{n} \Big|_0^a = \frac{ba^n}{n},$$

ответ:

$$I(n, a, b) \approx \frac{ba^n}{n}$$

II. $n \gg 1$, $nb \ll a$

Приблизительно найдем точку \tilde{x} , в которой подынтегральная функция

$$f(x) = \frac{x^n}{e^{\frac{x}{b}} - 1}$$

достигает максимума:

$$\frac{d}{dx} f(x) \Big|_{x=\tilde{x}} = \frac{n\tilde{x}^{n-1}}{e^{\frac{\tilde{x}}{b}} - 1} - \frac{\tilde{x}^n e^{\frac{\tilde{x}}{b}}}{\left(e^{\frac{\tilde{x}}{b}} - 1\right)^2} = 0, \quad \tilde{x} = \frac{nbe^{\frac{\tilde{x}}{b}}}{e^{\frac{\tilde{x}}{b}} - 1}.$$

Применяя метод итераций при $\tilde{x}_0 = nb$, так как $n \gg 1$:

$$\tilde{x}_1 = \frac{nbe^{\frac{\tilde{x}_0}{b}}}{e^{\frac{\tilde{x}_0}{b}} - 1} = \frac{nbe^n}{e^n - 1} \approx nb = \tilde{x}_0,$$

следовательно

$$\tilde{x} \approx nb.$$

При $x' = \frac{1}{2}nb$:

$$\frac{f(x')}{f(\tilde{x})} = \left(\frac{1}{2}\right)^n \frac{e^n - 1}{e^{\frac{n}{2}} - 1} \approx \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{\frac{n}{2}} = \left(\frac{e}{4}\right)^{\frac{n}{2}} \ll 1,$$

при $x'' = 2nb$:

$$\frac{f(x'')}{f(\tilde{x})} = 2^n \frac{e^n - 1}{e^{2n} - 1} \approx 2^n e^{-n} = \left(\frac{2}{e}\right)^n \ll 1,$$

следовательно интеграл набирается в некоторой окрестности

$$U(\tilde{x}) : \forall x_u \in U(\tilde{x}) \hookrightarrow \frac{1}{2}nb < x_u < 2nb \ll a,$$

откуда

$$\forall x_u \in U(\tilde{x}) \hookrightarrow e^{\frac{n}{2}} - 1 < e^{\frac{x_u}{b}} - 1 \approx e^{\frac{x_u}{b}} \implies$$

$$\int_0^a \frac{x^n}{e^{\frac{x}{b}} - 1} dx \approx \int_0^a \frac{x^n}{e^{\frac{x}{b}}} dx \approx b^{n+1} \int_0^\infty \left(\frac{x}{b}\right)^n e^{-\frac{x}{b}} d\left(\frac{x}{b}\right) = b^{n+1} \Gamma(n+1).$$

В условии задачи не указано, является ли n целым числом (а, следовательно, так как $n \gg 1$ — натуральным), поэтому ответ:

$$\boxed{I(n, a, b) \approx b^{n+1} \Gamma(n+1), \text{ для } n \in \mathbb{N} \quad I(n, a, b) \approx b^{n+1} n!}$$