

Clinical record:

```
[
  {
    "_id": "64014f6372b2320c1e735953",
    "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
    "date": "2023-03-03T01:37:36.452Z",
    "time": "16:30",
    "hospitalName": "hospital",
    "doctorName": "Pilar",
    "approvalNum": "1",
    "kindOfAttention": "medicina general",
    "signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
    "__v": 0,
    "analysis": {
      "disability": {
        "disability": true,
        "numOfDays": "2"
      },
      "_id": "640155b0a3bd0a16871433e7",
      "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
      "clinicalRecordId": "64014f6372b2320c1e735953",
      "analysis": [
        {
          "analysisName": "paciente con cardiopatía",
          "analysisDescription": "se recomienda tomar pastillas cada 8 horas para controlar cardiopatía",
          "_id": "640155b0a3bd0a16871433e8"
        }
      ],
      "diagnosis": "cardiopatía leve pericentral",
      "signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
      "__v": 0
    },
    "anamesi": {
      "pain": {
        "painScale": 8,
        "painClassification": "dolor punzante"
      },
      "_id": "640155b0a3bd0a16871433eb",
      "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
      "clinicalRecordId": "64014f6372b2320c1e735953",
      "reasonForConsultation": "paciente presenta dolor punzante al lado izquierdo del pecho en ocasiones inmovilizante",
      "presentDisease": "N/A",
      "suspectedDisease": "No",
    }
  }
]
```

```
"signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
"otherDiagnoses": [],
"__v": 0
},
"background": {
  "personalHistory": {
    "patology": "N/A",
    "toxic": "N/A",
    "hypersensitivity": "N/A",
    "pharmacological": "N/A",
    "occupational": "arquitecto",
    "surgical": "N/A",
    "transfusional": "N/A",
    "traumatic": "N/A",
    "allergies": "N/A",
    "allergiesCauses": "N/A",
    "gynecology": "N/A",
    "vaccination": [
      "Covid-19 2 dosis moderna"
    ]
  },
  "_id": "640155b0a3bd0a16871433ee",
  "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
  "clinicalRecordId": "64014f6372b2320c1e735953",
  "familyBackground": [
    {
      "mother": "sin antecedentes"
    },
    {
      "father": "sin antecedentes"
    }
  ],
  "signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
  "__v": 0
},
"medicine": {
  "_id": "640155b0a3bd0a16871433f1",
  "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
  "clinicalRecordId": "64014f6372b2320c1e735953",
  "medicines": [
    {
      "medicineName": "ibuprofeno- naproxeno",
      "medicineDescription": "tomar cada 8 horas o en presencia del dolor",
      "_id": "640155b0a3bd0a16871433f2"
    }
  ]
},
```

```
"diagnosis": "cardiopatía leve pericentral",
"signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
"__v": 0
},
"referral": {
  "_id": "640155b0a3bd0a16871433f9",
  "patientId": "640154e9a3bd0a16871433de",
  "clinicalRecordId": "64014f6372b2320c1e735953",
  "specialist": [
    {
      "specialistName": "Cardiología primera vez",
      "specialistDescription": "Se remite a cardiología para evaluación más precisa",
      "_id": "640155b0a3bd0a16871433fa"
    }
  ],
  "diagnosis": "cardiopatía leve pericentral",
  "signature": "64008ba6b76472c14501f1b2",
  "__v": 0
},
"surgery": null,
"hospitalId": "63fffc6d9f5134d629413131"
}
]
```