

SEMINAR 10

1) Să se arate că vectorii $(1, 2, -1)$, $(3, 2, 4)$, $(-1, 2, -6)$ din \mathbb{R}^3 sunt liniar dependenți și să se găsească o relație de dependență între ei.

2) Dați o condiție necesară și suficientă pentru ca vectorii $v_1 = (a_1, b_1)$, $v_2 = (a_2, b_2)$ să formeze o bază a \mathbb{R} -spațiului vectorial \mathbb{R}^2 . Să se interpreteze geometric această condiție. Folosind condiția stabilită, găsiți o infinitate de baze ale lui $\mathbb{R}\mathbb{R}^2$. Există o bază a lui \mathbb{R}^2 în care coordonatele unui vector $v = (x, y)$ să coincidă cu x și y ? Să se arate că $v_1 = (1, 0)$ și $v_2 = (1, 1)$ formează o bază a lui \mathbb{R}^2 și să se găsească coordonatele lui $v = (x, y)$ în această bază.

Temă: Formulați și rezolvați o problemă similară celei de mai sus pentru \mathbb{R} -spațiul vectorial \mathbb{R}^3 .

3) Să se determine $a \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $v_1 = (a, 1, 1)$, $v_2 = (1, a, 1)$, $v_3 = (1, 1, a)$ să formeze o bază a lui \mathbb{R}^3 .

4) Care dintre următoarele submulțimi ale lui \mathbb{R}^3 :

- a) $\{(1, 0, -1), (2, 5, 1), (0, -4, 3)\}$;
- b) $\{(2, -4, 1), (0, 3, -1), (6, 0, 1)\}$;
- c) $\{(1, 2, -1), (1, 0, 3), (2, 1, 1)\}$;
- d) $\{(-1, 3, 1), (2, -4, -3), (-3, 8, 2)\}$;
- e) $\{(1, -3, -2), (-3, 1, 3), (-2, -10, -2)\}$

sunt baze ale \mathbb{R} -spațiului vectorial \mathbb{R}^3 ?

5) Fie V un \mathbb{R} -spațiu vectorial și $v_1, v_2, v_3 \in V$. Să se arate că vectorii v_1, v_2, v_3 sunt liniar independenți dacă și numai dacă vectorii $v_2 + v_3, v_3 + v_1, v_1 + v_2$ sunt liniar independenți.

Suplimentar: i) Să se arate că $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_2 + v_3, v_3 + v_1, v_1 + v_2 \rangle$.

ii) Este proprietatea din enunț adevărată într-un spațiu vectorial peste un corp oarecare K ?

6) Să se arate că în \mathbb{R} -spațiul vectorial $M_2(\mathbb{R})$ matricele

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

formează o bază și să se scrie matricea $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$ în această bază.

7) a) Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ și polinoamele

$$f_1 = (X - b)(X - c), f_2 = (X - c)(X - a), f_3 = (X - a)(X - b).$$

Să se arate că:

i) f_1, f_2, f_3 sunt liniar independenți în \mathbb{R} -spațiul vectorial $\mathbb{R}[X]$ dacă și numai dacă

$$(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0;$$

ii) dacă $(a - b)(b - c)(c - a) \neq 0$ atunci pentru orice $f \in \mathbb{R}[X]$ cu $\text{grad } f \leq 2$ există $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$, unic determinate, astfel încât $f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3$.

b) Să se determine $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ când $f = 1 + 2X - X^2$, $a = 1$, $b = 2$ și $c = 3$.

8) Fie $n \in \mathbb{N}$ și $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \sin^n x$. Să se arate că $L = \{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ este o submulțime liberă a \mathbb{R} -spațiului vectorial $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.