

8.5 Probleme care se rezolvă în reper cartezian general

Problema 8.5.1 (Teorema lui Menelaus) Fie ABC un triunghi oarecare și A', B', C' trei puncte coliniare distincte astfel ca $A' \in BC$, $B' \in CA$ și $C' \in AB$. Atunci are loc relația:

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

și reciproc, dacă punctele A', B', C' situate pe dreptele BC, CA, AB astfel încât două dintre ele sunt în interiorul laturilor triunghiului și celălalt pe prelungirea celei de-a treia laturi, sau toate trei pe prelungirile laturilor și are loc relația

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

atunci cele trei puncte sunt coliniare.

Demonstrație.




Figura 8.5

Considerăm reperul cartezian general $\mathcal{R} = \{B, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}\}$. Atunci $B(0, 0)$, $C(1, 0)$, $A(0, 1)$. Notăm

$$\frac{A'B}{A'C} = \alpha, \quad \frac{B'C}{B'A} = \beta, \quad \frac{C'A}{C'B} = \gamma \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
\frac{A'B}{BC} &= \frac{\alpha}{1-\alpha} \Rightarrow \overrightarrow{A'B} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \\
\overrightarrow{BA'} &= \frac{\alpha}{\alpha-1} \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow A' \left(\frac{\alpha}{\alpha-1}, 0 \right) \\
\frac{B'C}{B'A} &= \beta \Rightarrow B' \left(\frac{1+\beta \cdot 0}{1+\beta}, \frac{0+\beta \cdot 1}{1+\beta} \right) \Leftrightarrow B' \left(\frac{1}{1+\beta}, \frac{\beta}{1+\beta} \right) \\
\frac{C'A}{C'B} &= \gamma \Leftrightarrow \frac{BA}{C'B} = \gamma+1 \Leftrightarrow \frac{BC'}{BA} = \frac{1}{\gamma+1} \Rightarrow \\
\overrightarrow{BC'} &= \frac{1}{\gamma+1} \overrightarrow{BA} \Leftrightarrow C' \left(0, \frac{1}{\gamma+1} \right) \\
A', B', C' \text{ coliniare} &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} \frac{\alpha}{\alpha-1} & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{\gamma+1} & 1 \\ \frac{1}{1+\beta} & \frac{\beta}{1+\beta} & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\begin{vmatrix} \frac{\alpha}{\alpha-1} & 0 & 1 \\ \frac{\alpha}{1-\alpha} & \frac{1}{\gamma+1} & 0 \\ \frac{1}{1+\beta} - \frac{\alpha}{\alpha-1} & \frac{\beta}{1+\beta} & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\begin{vmatrix} \frac{\alpha}{1-\alpha} & \frac{1}{\gamma+1} \\ \frac{\alpha-1-\alpha-\alpha\beta}{(1+\beta)(\alpha-1)} & \frac{\beta}{\beta+1} \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{1+\beta} \begin{vmatrix} -\alpha & \frac{1}{\gamma+1} \\ -1-\alpha\beta & \beta \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{1+\beta} \left(-\alpha\beta + \frac{1+\alpha\beta}{\gamma+1} \right) = 0 \Leftrightarrow \\
&\frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{1+\beta} \cdot \frac{1}{1+\gamma} (-\alpha\beta\gamma - \alpha\beta + 1 + \alpha\beta) = 0 \Leftrightarrow \alpha\beta\gamma = 1
\end{aligned}$$

Observație. În această configurație α nu poate fi 1 iar $\beta, \gamma > 0$ deci nu pot fi -1 , așadar fracțiunile care intervin au sens.

Problema 8.5.2 (*Teorema lui Ceva*) Fie ABC un triunghi oarecare și AA', BB', CC' trei drepte concurente, unde $A' \in BC$, $B' \in CA$, $C' \in AB$. Atunci are loc relația:

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

și reciproc, dacă punctele $A' \in BC$, $B' \in CA$, $C' \in AB$ sunt situate toate trei în interiorul laturilor triunghiului ABC sau unul în interiorul unei laturi și celelalte două pe prelungirile celorlalte două laturi și are loc relația

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1,$$

atunci dreptele AA', BB', CC' sunt concurente (fig.8.6).




Figura 8.6

Demonstrație. Fie $\mathcal{R} = \{B, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}\}$ un reper cartezian general. Atunci $B(0, 0)$, $C(1, 0)$ și $A(0, 1)$.

Notăm

$$\frac{A'B}{A'C} = \alpha, \quad \frac{B'C}{B'A} = \beta, \quad \frac{C'A}{C'B} = \gamma.$$

Avem:

$$\frac{A'B}{A'C} = \alpha \Rightarrow \frac{BA'}{BC} = \frac{\alpha}{\alpha + 1} \Rightarrow \overrightarrow{BA'} = \frac{\alpha}{\alpha + 1} \cdot \overrightarrow{BC} \Rightarrow A' \left(\frac{\alpha}{\alpha + 1}, 0 \right)$$

$$\frac{C'A}{C'B} = \gamma \Rightarrow \frac{BA}{BC'} = \gamma + 1 \Rightarrow \overrightarrow{BC'} = \frac{1}{\gamma + 1} \cdot \overrightarrow{BA} \Rightarrow C' \left(0, \frac{1}{\gamma + 1} \right)$$

$$\frac{B'C}{B'A} = \beta \Rightarrow B' \left(\frac{1+0 \cdot \beta}{1+\beta}, \frac{0+\beta \cdot 1}{1+\beta} \right) \Leftrightarrow B' \left(\frac{1}{1+\beta}, \frac{\beta}{1+\beta} \right)$$

Ecuția dreptei AA' este:

$$AA' : \frac{x}{\frac{\alpha}{\alpha+1}} + \frac{y}{1} = 1 \text{ (ecuația dreptei prin tăieturi)} \Leftrightarrow$$

$$AA' : (\alpha+1)x + \alpha y - \alpha = 0.$$

Ecuția dreptei CC' este:

$$CC' : \frac{x}{1} + \frac{y}{\frac{1}{\gamma+1}} = 1 \Leftrightarrow$$

$$CC' : x + (\gamma+1)y - 1 = 0$$

Ecuția dreptei BB' este:

$$BB' : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{1+\beta} & \frac{\beta}{1+\beta} & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y \\ \frac{1}{1+\beta} & \frac{\beta}{1+\beta} \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{1}{1+\beta} \begin{vmatrix} x & y \\ 1 & \beta \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \beta x - y = 0$$

Condiția de concurență a celor trei drepte este

$$\begin{vmatrix} \alpha+1 & \alpha & -\alpha \\ 1 & \gamma+1 & -1 \\ \beta & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Înmulțim a doua linie cu $-\alpha$ și o adunăm la prima linie. Rezultă

$$\begin{vmatrix} 1 & -\alpha\gamma & 0 \\ 1 & \gamma+1 & -1 \\ \beta & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -1 + \alpha\beta\gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha\beta\gamma = 1 \Leftrightarrow$$

$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

Problema 8.5.3 (*Dreapta lui Newton-Gauss*) Fie $ABCDEF$ un patrulater complet. Să se demonstreze că mijloacele diagonalelor AC , BD și EF sunt coliniare.

Observații. 1) Dreapta determinată de cele trei puncte se numește dreapta lui Newton-Gauss.

2) Un patrulater complet este un patrulater oarecare $ABCD$ cu laturile opuse neparalele și ale căror prelungiri se intersectează în E și F (fig.8.7).

Demonstrație.




Figura 8.7

Fie reperul cartezian general $\mathcal{R} = \{A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\}$ și M mijlocul lui AC , N mijlocul lui BD , P mijlocul lui EF . Atunci $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $D(0, 1)$, $E(p, 0)$, $F(0, q)$.

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AD} \Rightarrow N\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AF} \Rightarrow P\left(\frac{p}{2}, \frac{q}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Vom calcula coordonatele lui C rezolvând sistemul format de ecuațiile dreptelor BF și DE . Ecuația dreptei BF este:

$$BF : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & q & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & q & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(am scăzut a treia coloană din prima) \Leftrightarrow

$$\begin{vmatrix} x-1 & y \\ -1 & q \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow qx + y - q = 0$$

Ecuația dreptei DE este:

$$DE : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ p & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y-1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ p & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

(am scăzut a treia coloană din a doua) \Leftrightarrow

$$\begin{vmatrix} x & y-1 \\ p & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x + py - p = 0$$

Rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} qx + y - q = 0 \\ x + py - p = 0 \end{cases}$$

obținem $C \left(\frac{p(1-q)}{1-pq}, \frac{q(1-p)}{1-pq} \right)$ și deci $M \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{p(1-q)}{1-pq}, \frac{1}{2} \cdot \frac{q(1-p)}{1-pq} \right)$.

Condiția de coliniaritate este:

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \cdot \frac{p(1-q)}{1-pq} & \frac{1}{2} \cdot \frac{q(1-p)}{1-pq} & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{p}{2} & \frac{q}{2} & 1 \end{vmatrix} = 0$$

care după un scurt calcul se dovedește a fi adevărată.

Problema 8.5.4 Fie $ABCD$ un paralelogram și fie punctele $P \in (AB)$, $Q \in (BC)$, $R \in (CD)$ și $S \in (DA)$ astfel încât $PR \parallel AD$ și $QS \parallel AB$. Să se demonstreze că dreptele PQ și SR se intersectează într-un punct situat pe diagonala AC sau sunt paralele cu AC (fig.8.8).

Observație. Problema se poate reformula astfel: Să se arate că dreptele PQ , SR și AC sunt concurente sau paralele.




Figura 8.8

Demonstrație. Considerăm reperul cartezian general $\mathcal{R} = \{A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\}$. Atunci $A(0,0)$, $B(1,0)$, $D(0,1)$, $P(\alpha,0)$, $S(0,\beta)$, $Q(1,\beta)$, $R(\alpha,1)$, $C(1,1)$.

Ecuatiile celor trei drepte sunt:

$$PQ: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ \alpha & 0 & 1 \\ 1 & \beta & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-\beta & 0 \\ \alpha-1 & -\beta & 0 \\ 1 & \beta & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-\beta \\ \alpha-1 & -\beta \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\beta x + \beta - \alpha y + \alpha\beta + y - \beta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\beta x + (\alpha - 1)y - \alpha\beta = 0$$

$$SR: \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & \beta & 1 \\ \alpha & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-\alpha & y-1 & 0 \\ -\alpha & \beta-1 & 0 \\ \alpha & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} x - \alpha & y - 1 \\ -\alpha & \beta - 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (\beta - 1)x - \alpha\beta + \alpha + \alpha y - \alpha = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\beta - 1)x + \alpha y - \alpha\beta = 0$$

$$AC : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x - y = 0$$

Condiția de concurență este:

$$\begin{vmatrix} \beta & \alpha - 1 & -\alpha\beta \\ \beta - 1 & \alpha & -\alpha\beta \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \beta & \alpha + \beta - 1 & -\alpha\beta \\ \beta - 1 & \alpha + \beta - 1 & -\alpha\beta \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{vmatrix} \alpha + \beta - 1 & -\alpha\beta \\ \alpha + \beta - 1 & -\alpha\beta \end{vmatrix} = 0$$

care este evident satisfăcută.

Dacă $PQ \parallel AC$ atunci $\frac{\beta}{1} = \frac{\alpha - 1}{-1} \Leftrightarrow \frac{\beta - 1}{1} = \frac{\alpha}{-1}$ adică și $SR \parallel AC$.

Problema 8.5.5 Fie a și b două drepte concurente în punctul O și punctele distincte $A_1, A_2, A_3 \in a$, $B_1, B_2, B_3 \in b$. Să se demonstreze că punctele $C_1 = A_2B_3 \cap A_3B_2$, $C_2 = A_1B_3 \cap A_3B_1$, $C_3 = A_1B_2 \cap A_2B_1$ sunt coliniare. (Teorema lui Pappus)

Demonstrație. Se presupune, bineînțeles, că dreptele A_iB_j și A_jB_i , $i \neq j$, nu sunt paralele, deci punctele C_1, C_2, C_3 există.

Alegem reperul cartezian general $\mathcal{R} = \{O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\}$ unde A și B sunt două puncte oarecare pe a respectiv b . Atunci $A_1(a_1, 0)$, $A_2(a_2, 0)$, $A_3(a_3, 0)$ și $B_1(0, b_1)$, $B_2(0, b_2)$, $B_3(0, b_3)$. Coordonatele punctului C_1 se obțin din sistemul:

$$\begin{cases} A_2B_3 : \frac{x}{a_2} + \frac{y}{b_3} = 1 \\ A_3B_2 : \frac{x}{a_3} + \frac{y}{b_2} = 1 \end{cases} \Rightarrow C_1 \left(\frac{\frac{1}{b_2} - \frac{1}{b_3}}{\frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3}}, \frac{\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3}}{\frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3}} \right).$$

Analog:

$$C_2 \left(\frac{\frac{1}{b_3} - \frac{1}{b_1}}{\frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1}}, \frac{\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_1}}{\frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1}} \right) \quad \text{și}$$

$$C_3 \left(\frac{\frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_2}}{\frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}}, \frac{\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}}{\frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}} \right).$$




Figura 8.9

Condiția de coliniaritate este:

$$\begin{vmatrix} x_{C_1} & y_{C_1} & 1 \\ x_{C_2} & y_{C_2} & 1 \\ x_{C_3} & y_{C_3} & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

În cazul nostru determinantul din membrul stâng este:

$$\begin{vmatrix}
 \frac{\frac{1}{b_2} - \frac{1}{b_3}}{\frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3}} & \frac{\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3}}{\frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3}} & 1 \\
 \frac{\frac{1}{b_3} - \frac{1}{b_1}}{\frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1}} & \frac{\frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_1}}{\frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1}} & 1 \\
 \frac{\frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_2}}{\frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}} & \frac{\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2}}{\frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}} & 1
 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}\right) \left(\frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3}\right) \left(\frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1}\right)} \cdot$$

$$\cdot \begin{vmatrix}
 \frac{1}{b_2} - \frac{1}{b_3} & \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} & \frac{1}{a_2b_2} - \frac{1}{a_3b_3} \\
 \frac{1}{b_3} - \frac{1}{b_1} & \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_3b_3} - \frac{1}{a_1b_1} \\
 \frac{1}{b_1} - \frac{1}{b_2} & \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} & \frac{1}{a_1b_1} - \frac{1}{a_2b_2}
 \end{vmatrix} = 0$$

pentru că dacă adunăm a doua și a treia linie la prima linie, aceasta devine nulă.

8.6 Probleme rezolvate în reper cartezian ortonormat

Problema 8.6.1 Într-un reper ortogonal xOy se consideră punctele $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, ($a > 0$) și dreptele $d_1 \perp Ox$ în A și $d_2 \perp Ox$ în