0. feladat

Wednesday, September 20, 2023 10:40 AM

Megoldja-e az *S* program az *F* feladatot?

$A = \{ 1, 2, 3 \}$

$S = \{ \; 1 \longrightarrow < 1, 2, 3, 1 >$
$\quad 2 \longrightarrow < 2, 3 > \qquad 2 \longrightarrow < 2, 2, 2, \ldots >$
$\quad 3 \longrightarrow < 3, 2, 1 > \qquad\qquad\qquad\qquad \}$

$F = \{ (1,1), (1,3), (3,1) \}$

MO: 1.) $D_F \subseteq D_{P(S)}$

2.) $\forall a \in D_F : P(S)(a) \subseteq F(a)$

1.) $\{1,3\} = D_F \subseteq D_{P(S)} = \{1,3\}$

2.) $\{1\} = P(S)(1) \subseteq F(1) = \{1,3\}$

$\{1\} = P(S)(3) \subseteq F(3) = \{1\}$

✓ MO-ja

1. feladat

2022. szeptember 18., vasárnap 21:49

Ha S program megoldja az F feladatot, akkor igazak-e a következő állítások:

a) Ha F nem determinisztikus, akkor S sem determinisztikus. N
b) Ha F determinisztikus, akkor S is az. N
c) Ha S nem determinisztikus, akkor p(S) sem az. N
d) Ha p(S) nem determinisztikus, akkor F sem az. N
e) Ha F determinisztikus, akkor p(S) determinisztikus. N
f) Ha F nem determinisztikus, akkor p(S) nem determinisztikus. N

Mo: 1.) $D_F \subseteq D_{P(S)}$
2.) $\forall a \in D_F : P(S)(a) \subseteq F(a)$

a) $A = \{1,2\}$
$F = \{(1,1),(1,2)\}$
$S = \{1 \to \langle 1 \rangle$
$2 \to \langle 2, fail \rangle\}$

b) $A = \{1,2\}$
$F = \{(1,1)\}$
$S = \{1 \to \langle 1 \rangle$
$2 \to \langle 2, fail \rangle$
$\langle 2 \rangle\}$
$P(S) = \{(1,1)\}$

c) lásd b)

d) $A = \{1,2\}$
$S = \{1 \to \langle 1 \rangle$
$2 \to \langle 2,1 \rangle$
$\langle 2 \rangle\}$
$P(S) = \{(1,1),(2,1),(2,2)\}$
$F = \{(1,1)\}$
$\{1\} = D_F \subseteq D_{P(S)} = \{1,2\}$
$\{1\} = P(S)(1) \subseteq F(1) = \{1\}$

e) lásd d)

f) $A = \{1,2\}$
$F = \{(1,1),(1,2)\}$
$S = \{1 \to \langle 1 \rangle$
$2 \to \langle 2, fail \rangle$
$\langle 2 \rangle\}$
$P(S) = \{(1,1)\}$
$\{1\} = D_F \subseteq D_{P(S)} = \{1\}$
$\{1\} = P(S)(1) \subseteq F(1) = \{1,2\}$

1. pluszpont

Monday, September 23, 2024 2:50 PM

1.kvíz:

Legyen $A = \{ 1, 2, 3 \}$, és $F = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 3) \}$

Adjunk meg egy *S* programot, ami megoldja az *F* feladatot.

2. feladat

2022. szeptember 26., hétfő 10:48

S_1

Legyenek S1 és S2 programok az A állapottér felett, úgy hogy S1 ⊆S2 teljesül.

a) Igaz-e hogy ekkor $\mathcal{D}_{p(S_1)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_2)}$? NEM

$A = \{1,2\}$

$S_1 = \{ 1 \to \langle 1 \rangle$
$\quad 2 \to \langle 2 \rangle \}$

$S_2 = \{ 1 \Rightarrow \langle 1 \rangle$
$\quad \langle 1, fail \rangle$
$\quad 2 \Rightarrow \langle 2 \rangle$
$\quad \langle 2, fail \rangle \}$

$\{1,2\} = D_{p(S_1)} \not\subseteq D_{p(S_2)} = \emptyset$

b) Igaz-e hogy ekkor $\mathcal{D}_{p(S_2)} \subseteq \mathcal{D}_{p(S_1)}$? IGEN

legyen $a \in D_{p(S_2)}$ cél: $a \in D_{p(S_1)}$

$a \in D_{p(S_2)} \iff S_2(a) \subseteq \overline{A^*}$ / mfv. def.

$S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow S_1(a) \subseteq S_2(a)$ $\forall a \in A$

$\Rightarrow S_1(a) \subseteq \overline{A^*} \iff a \in D_{p(S_1)}$

3. feladat

2022. szeptember 18., vasárnap 21:46

Legyen A egy tetszőleges állapottér, ezen az S és S' egy program, az F és F' egy feladat úgy, hogy S megoldja F-et. Igazak-e a következők:

a) Ha S ⊆ S', akkor S' is megoldja F-et. NEM

$A = \{1\}$ $F = \{(1,1)\}$

$S = \{1 \to \langle 1 \rangle\}$

$S' = \{1 \to \langle 1 \rangle$
$\searrow \langle 1,1,1,\ldots \rangle\}$

$\{1\} = D_F \not\subseteq D_{p(S')} = \emptyset$

b) Ha S' ⊆ S, akkor az S' is megoldja F-et. !

c) Ha $F \subseteq F'$, akkor S megoldja F' feladatot is.

2-3. pluszpont

Monday, September 23, 2024 3:32 PM

2.kvíz:

Ha *S* megoldja *F* feladatot és *F'*⊆ *F*, akkor *S* megoldja-e *F'* feladatot is.

3.kvíz:

Mely feladatokat oldja meg az *ABORT* program egy adott *A* állapottéren?
ABORT(a) ::= { *<a, fail>* }

Kövi +/-:

- Állapottér
- Program
- Programfüggvény
- Megoldás