Caderno do orador — versão enxuta


VIII SEMICA · 21/10/2026 · Theo Báccaro · Revisão sistemática e metanálise de prevalência: fumaça cirúrgica e saúde da equipe de centro cirúrgico

> **Como usar.** Cada slide traz a **fala** (o que dizer em voz alta, em amarelo) e o **apoio** (números e respostas prontas, só para consultar se perguntarem). Tempo-alvo: **7:45** (limite de 10 min). Se estiver mais de 15 s atrasado num marco do relógio, corte o detalhe do slide seguinte e diga só a frase-chave (o subtítulo). Os slides 17 a 25 são de apoio: no modo de apresentação, digite o número e Enter para ir direto; 16 e Enter para voltar ao encerramento.

Tempo por slide

Slide	Seção	Tempo	Palavras	Relógio
1	Capa	15 s	31	0:00 → 0:15
2	Introdução	40 s	77	0:15 → 0:55
3	Objetivos – geral e específicos	30 s	48	0:55 → 1:25
4	Pergunta PECO	20 s	35	1:25 → 1:45
5	Método em 7 passos	45 s	83	1:45 → 2:30
6	Busca e seleção	25 s	39	2:30 → 2:55
7	Como os estudos foram combinados	50 s	91	2:55 → 3:45
8	Resultado principal – ocular	55 s	91	3:45 → 4:40
9	Sintoma respiratório e robustez	35 s	56	4:40 → 5:15
10	Desfechos objetivos e biomarcadores	45 s	80	5:15 → 6:00
11	Discussão	40 s	59	6:00 → 6:40
12	Conclusão – resposta ao objetivo	35 s	63	6:40 → 7:15
13	Perspectivas futuras	15 s	30	7:15 → 7:30
14	Referências	5 s	9	7:30 → 7:35
15	Agradecimentos	10 s	17	7:35 → 7:45
16	Encerramento (fica na tela durante as perguntas)	—	—	—

Slide 1 [0:00–0:15] CAPA (~15 s · 31 palavras)



FALA

Bom dia. Sou Theo Báccaro, de Medicina da São Leopoldo Mandic, orientado pela Profa. Lisie. Apresento nossa revisão sistemática sobre a fumaça cirúrgica e a saúde da equipe do centro cirúrgico.

APOIO (não ler)

- Coautores: Luiz Henrique Ledesma Pereira e Dra. Mariana Matera Veras (LIM05, HC-FMUSP).
- Fale o título de forma natural, sem ler palavra por palavra. Respire e avance.

Slide 2 [0:15–0:55] INTRODUÇÃO (~40 s · 77 palavras)




FALA

Sempre que o eletrocautério, o laser ou o bisturi ultrassônico cortam tecido, formam fumaça, com benzeno e outros voláteis, partículas ultrafinas e até DNA viral, como o do HPV. A equipe do centro cirúrgico está exposta a ela no trabalho e relata irritação nos olhos e nas vias aéreas; os efeitos crônicos são plausíveis, mas sem relação causal estabelecida. As revisões anteriores eram majoritariamente descritivas: faltava combinar os estudos e graduar a certeza. Essa é a lacuna.

APOIO (não ler)

- Composição: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, compostos orgânicos voláteis (benzeno, tolueno, xileno), material particulado fino (PM2,5) e ultrafino (< 0,1 µm), material genético viral (Benaim; Jaspers, 2024).
- Controvérsia: Hurst; Stewart (2024) argumentam que o risco pode estar superestimado.
- Revisões anteriores sem síntese quantitativa: Mowbray et al., 2013; Dixon; Dasgupta; Vasdev, 2023.
- A imagem é ilustrativa, gerada por IA (a legenda diz isso).

Slide 3 [0:55–1:25] OBJETIVOS – GERAL E ESPECÍFICOS (~30 s · 48 palavras)



FALA

O objetivo geral foi avaliar os desfechos de saúde associados à exposição ocupacional à fumaça cirúrgica na equipe de centro cirúrgico. Os específicos: estimar a prevalência de sintomas oculares e, de forma exploratória, respiratórios; sintetizar os achados sobre função pulmonar e biomarcadores; e avaliar a certeza da evidência.

APOIO (não ler)

- Cada objetivo específico tem o seu método: metanálise (1), síntese narrativa (2) e GRADE (3).
- Ocular é o desfecho principal; respiratório é exploratório (definições mais variáveis).
- A conclusão responde a estes três itens, na mesma ordem (1, 2, 3).

Slide 4 [1:25–1:45] PERGUNTA PECO (~20 s · 35 palavras)



FALA

A pergunta seguiu o PECO: na equipe de centro cirúrgico, a exposição ocupacional à fumaça dos dispositivos de energia, comparada a quem não é exposto ou se protege, e os efeitos à saúde como desfecho.

APOIO (não ler)

- PECO, e não PICO, porque é exposição, não intervenção alocada.
- População: cirurgiões, residentes, enfermagem perioperatória, instrumentadores e anestesia. Comparador: não expostos, minimamente expostos ou com medidas de proteção.
- O PECO orientou a busca e os desfechos comparativos; para a prevalência, o esquema CoCoPop (Condição, Contexto, População; Munn et al., 2015), recomendado pelo JBI.

Slide 5 [1:45–2:30] MÉTODO EM 7 PASSOS (~45 s · 83 palavras)



FALA

Para responder, segui sete passos, conforme o PRISMA 2020. Registrei o protocolo no PROSPERO antes da extração. Busquei em sete bases, na literatura cinzenta e por citação, sem filtro de idioma. Li, um a um, 10.910 títulos e resumos. Extraí os dados numa planilha padronizada, avaliei o risco de viés pelo JBI, combinei as prevalências em metanálise e graduei a certeza pelo GRADE. O código e as planilhas estão abertos no OSF, e a IA foi apenas apoio operacional: as decisões foram humanas.

APOIO (não ler)

- PROSPERO CRD420251238727; dispensa do CEP (protocolo 2025/0743; Res. CNS 510/2016).
- 7 bases: PubMed/MEDLINE, Embase, Web of Science, Scopus, BVS (LILACS/IBECS), SciELO e Cochrane CENTRAL; cinzenta: Google Scholar (4 × 50 resultados) e Catálogo CAPES; citação: OpenAlex.
- Ferramentas: Zotero 6, Rayyan, OpenAlex, Python 3.13 (NumPy, SciPy, statsmodels).
- IA (declarada, Portaria CNPq nº 2.664/2026): priorização da ordem de leitura, leitura assistida de resumos e organização do fluxo; elegibilidade, extração, interpretação e redação foram decisões humanas.
- Detalhes de elegibilidade e busca: slide de apoio 18.
- As colunas aparecem sozinhas, uma a uma: comece a falar sem esperar.

Slide 6 [2:30–2:55] BUSCA E SELEÇÃO (~25 s · 39 palavras)



FALA

A busca trouxe 16.757 registros. Sem as duplicatas, li 10.910 títulos e resumos, avaliei 26 relatórios na íntegra e incluí 22, de nove países. As metanálises reuniram seis e sete amostras independentes, sem contar a mesma pessoa duas vezes.

APOIO (não ler)

- Fluxo: 16.757 identificados → 16.749 importados (8 não exportados) → 5.839 duplicatas → 10.910 triados → 10.882 excluídos → 28 + 4 por citação = 32 buscados → 6 não recuperados → 26 avaliados → 4 excluídos (1 resumo sem dados; 3 por população ou contexto) → 22 incluídos.
- Busca de alta sensibilidade: 7 bases, literatura cinzenta e busca por citação; sem filtro de idioma ou data; última busca em 09/07/2026.
- 19 transversais e 3 coortes prospectivas; países: Turquia, Malásia, Brasil, Paquistão, China, México, EUA, Sudão e Tailândia.
- Sobreposição amostral: 7 publicações do mesmo grupo (Paraná); 1 representante por análise (Bieniek et al., 2022), definido antes da síntese.
- Triagem por revisor único: limitação declarada; replicar em duplicata está nas perspectivas.
- Fluxograma PRISMA completo: slide de apoio 19.

Slide 7 [2:55–3:45] COMO OS ESTUDOS FORAM COMBINADOS (~50 s · 91 palavras)



FALA

Como combinar estudos tão diferentes? Em quatro passos. Primeiro, cada estudo vira uma proporção: no İlçe, 33 de 81 profissionais, 40,7%. Segundo, a escala logito, que mantém o resultado entre zero e cem por cento. Terceiro, um modelo de efeitos aleatórios, porque a prevalência verdadeira muda de um hospital para outro, com ajuste de Hartung-Knapp, mais honesto com poucos estudos. Quarto, o intervalo de predição: o que esperar num novo hospital. Antes, o risco de viés de cada estudo foi avaliado pelo JBI; depois, a certeza de cada desfecho, pelo GRADE.

APOIO (não ler)

- Logito = ln[p ÷ (1 − p)]; IC95% de cada estudo pelo método de Wilson; sem 0% ou 100%, não houve correção de continuidade.
- Efeitos aleatórios: τ^2 (variância entre estudos) por Paule-Mandel; peso = 1 ÷ (variância + τ^2). Hartung-Knapp: IC pela distribuição t com k − 1 graus de liberdade (IntHout; Ioannidis; Borm, 2014).
- Intervalo de predição com t (k − 2); instável com menos de 10 estudos.
- Sem teste de Egger nem funil: em proporções o erro-padrão depende da própria proporção, e os testes pedem ≥ 10 estudos.
- GRADE: ponto de partida baixa (observacional); um domínio grave já leva a muito baixa.
- Detalhes: slides de apoio 20 (extração e JBI), 21 (metanálise) e 22 (GRADE).

Slide 8 [3:45–4:40] RESULTADO PRINCIPAL – OCULAR (~55 s · 91 palavras) ← dê tempo a este slide




Figura 2. Quadrado = estudo (tamanho ∝ peso) · losango = estimativa combinada · linha vermelha = intervalo de predição.

FALA

Este é o resultado principal. Em seis estudos, com 756 profissionais, a prevalência combinada de sintoma ocular foi de 37,6%: cerca de quatro em cada dez relataram irritação ou lacrimejamento. Cada quadrado é um estudo; o losango, a estimativa combinada. Os estudos vão de 19%, na Malásia, a 56%, na Turquia, e o I² de 93% mostra que a variação entre estudos vai além do acaso. Por isso, a mensagem mais honesta é o intervalo de predição: num novo hospital, a prevalência pode ficar entre 7 e 83%, conforme o contexto.

APOIO (não ler)

- IC95% 21,9–56,5. O intervalo de confiança é sobre a média; o intervalo de predição é sobre um novo estudo.
- É a proporção de expostos que relatou o sintoma, não um efeito causal: não há grupo não exposto no agrupamento.
- O maior inquérito (Van Giersbergen et al., 2019; n = 672) ficou fora do ocular: sem numerador e denominador oculares extraíveis.
- "I² de 93% invalida?": em metanálise de prevalência, I² alto é esperado; por isso o intervalo de predição e a investigação das fontes (país, definição).
- Subgrupo por país (exploratório): Turquia 50,5%; Malásia 19,8%; p < 0,001 entre subgrupos.

Slide 9 [4:40–5:15] SINTOMA RESPIRATÓRIO E ROBUSTEZ (~35 s · 56 palavras) ← aponte a tabela, não leia linha por linha

RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório em 41,7%, estável entre modelos




Figura 3. Sete amostras independentes; definições variam (tosse, ardência de garganta, vias aéreas superiores).

41,7%

prevalência combinada

IC95% 30,4–53,9 · **IP** 15–74%

7 estudos · 1.428 profissionais

A definição importa: só com definições específicas, o I² respiratório cai de **91% para 61%**

Muda o modelo, não muda o resultado

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey	38,1%	41,7%
GLMM logístico	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%

Modelo principal em negrito.

FALA

O sintoma respiratório, exploratório, teve prevalência de 41,7%, em sete estudos e 1.428 profissionais. E os resultados são robustos: com três modelos estatísticos diferentes, quase não mudam, no ocular e no respiratório. Com as definições mais específicas, o I² respiratório cai de 91 para 61%: parte da variação vem de como cada estudo definiu o sintoma.

APOIO (não ler)

- IC95% 30,4–53,9; intervalo de predição 15–74%; I² = 91%.
- Leave-one-out: ocular 34,3–42,1%; respiratório 38,9–45,5%. Sem o resumo de congresso: 42,1% e 42,4%.
- Só definições específicas: ocular 36,5% (I² 94%); respiratório 35,8% (I² 61%).
- Tabela completa e subgrupo por país: slide de apoio 23.

Slide 10 [5:15–6:00] DESFECHOS OBJETIVOS E BIOMARCADORES (~45 s · 80 palavras)



FALA

Além dos sintomas, quatro estudos mediram alterações objetivas, e todos apontam na mesma direção. No Sudão, função pulmonar menor nos expostos. No Brasil, o metabólito urinário do benzeno foi mais de quatro vezes maior. No México, metaplasia ou hiperplasia nasal em 70% dos residentes expostos, contra 5%. Na China, DNA de HPV na mucosa nasal cerca de cinco vezes mais frequente. Mas é um estudo por desfecho, a certeza é muito baixa, e nenhum estudo elegível estimou câncer ou DPOC.

APOIO (não ler)

- Ibrahim 2025 (92 vs 92 pareados; medianas): VEF1 2,78 vs 3,14 L; CVF 3,02 vs 3,45 L; PFE 327,5 vs 483,5 L/min; p = 0,001; VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos (não é padrão obstrutivo); gradiente com o tempo de atuação.
- Canicoba 2025 (52 vs 49): ácido t,t-mucônico 202,9 vs 46,1 µg/L (benzeno); metil-hipúrico 468,2 vs 184,4 µg/L (xileno); malondialdeído 9,33 vs 3,22 nmol/mg; sem IC95%; t,t-mucônico é inespecífico (dieta, tabagismo).
- Navarro 2016: 16/23 vs 1/20; RR 13,9 (IC95% 2,0–95,8), IC amplo por 1 evento no grupo não exposto.
- Hu 2021: 42/469 vs 4/231; RR 5,2 (IC95% 1,9–14,2); DNA ≠ infecção ou doença; achado da N95 (0/196) sem ajuste.
- Coexposições (gases anestésicos, radiação) limitam a atribuição. Detalhes: slide de apoio 24.

Slide 11 [6:00–6:40] DISCUSSÃO (~40 s · 59 palavras)



FALA

O que o trabalho acrescenta: uma estimativa combinada, com intervalo de predição e certeza graduada, onde antes havia revisões descritivas, com protocolo registrado e análise reproduzível. Como ler: é prevalência em expostos, a carga de sintomas, não o excesso causado pela fumaça. E os limites, todos declarados: estudos transversais, sintomas autorrelatados, heterogeneidade alta e triagem por um único revisor.

APOIO (não ler)

- Viés de atribuição: o respondente sabe que o tema é fumaça. Trabalhador sadio: quem adoece sai do centro cirúrgico (subestima).
- Heterogeneidade: definição do sintoma e recordatório, composição profissional, tempo de exposição, exaustão e EPI.
- A favor da causalidade: gradiente com o tempo de exposição, temporalidade (coorte), plausibilidade. Contra: um estudo por desfecho, IC amplos, coexposições.
- Lista completa de pontos fortes e limitações: slide de apoio 25.
- ATITUDE: fale as limitações com segurança; a banca valoriza quem conhece as fraquezas do próprio trabalho.

Slide 12 [6:40–7:15] CONCLUSÃO – RESPOSTA AO OBJETIVO (~35 s · 63 palavras)



FALA

Respondendo ao objetivo: um, sintomas oculares e respiratórios foram frequentemente relatados, por cerca de quatro em cada dez profissionais, com grande variação entre contextos. Dois, estudos isolados sugerem alterações além do incômodo agudo, sem demonstrar doença crônica. Três, a certeza é muito baixa. Ainda assim, pela carga de sintomas e por precaução, proteger a equipe parece justificado: exaustão na fonte, respiradores e educação.

APOIO (não ler)

- Proteção (NIOSH, 1996): a evacuação local na fonte é a medida principal; N95/PFF2 não substituem a exaustão. A efetividade das medidas não foi avaliada nesta revisão.
- NR-32: marco geral de riscos em serviços de saúde, sem regra específica para a fumaça cirúrgica.

Slide 13 [7:15–7:30] PERSPECTIVAS FUTURAS (~15 s · 30 palavras)



FALA

Faltam coortes com medida objetiva da exposição, estudos sobre câncer e DPOC e sobre a efetividade da proteção. Para este trabalho: submeter o manuscrito e replicar a triagem em duplicata.

APOIO (não ler)

- Também: definições padronizadas de sintoma e recordatório, atualização da busca e vigilância dos 6 relatórios não recuperados.

Slide 14 [7:30–7:35] REFERÊNCIAS (~5 s · 9 palavras)



FALA

As referências e os suplementos estão no QR code.

APOIO (não ler)

- Não leia a lista; mencione e avance.
- O QR code leva ao projeto público do OSF (osf.io/jktmn): suplementos, código e planilhas.

Slide 15 [7:35–7:45] AGRADECIMENTOS (~10 s · 17 palavras)



FALA

Agradeço à Profa. Lisie, aos coautores e à São Leopoldo Mandic. Obrigado; estou à disposição para perguntas.

APOIO (não ler)

- Ao dizer "perguntas", AVANCE para o slide 16 (QR code grande) e deixe-o na tela durante a arguição.

Slide 16 ENCERRAMENTO



Deixe este slide na tela durante as perguntas. Ouça a pergunta inteira, repita-a em uma frase e responda em 30 a 40 segundos.

SLIDES DE APOIO (depois deste; no modo de apresentação, digite o número e Enter para ir direto, e 16 + Enter para voltar):

17 Trajetória e aprendizado (se perguntarem como foi a formação ou o que aprendeu)

18 Elegibilidade e busca por base

19 Fluxograma PRISMA completo e características dos estudos

20 Extração e risco de viés (JBI)

21 Metanálise passo a passo e verificações de robustez

22 GRADE: domínios e decisões

23 Sintoma respiratório: tabela de robustez e subgrupo por país

24 Desfechos objetivos em detalhe

25 Pontos fortes e limitações

Apoio 17 APOIO 17 – TRAJETÓRIA E APRENDIZADO (mostre só se perguntarem sobre a formação ou o aprendizado)



Se derem a oportunidade, em 20 a 30 segundos


Em julho de 2025 concluí o curso de revisão sistemática e metanálise da Unicamp, com distinção. Estudei o PRISMA 2020, o Cochrane Handbook, o manual do JBI e os livros de Borenstein e de Harrer; registrei o protocolo no PROSPERO e li, um a um, 10.910 títulos e resumos.

(Feche com o seu aprendizado, nas suas palavras; por exemplo: ler a heterogeneidade com honestidade, relatando o intervalo de predição em vez de um número único.)

PONTOS-CHAVE

- Cursos: Unicamp (40 h, com distinção, 20/07/2025); ZucoEscrita (3,6 h); Fiocruz ABNT (3 h) e referências (2 h). Total ≈ 49 h.
- Cochrane Handbook, Borenstein e Harrer foram material de estudo; o manuscrito cita os trabalhos específicos de cada método (Barker 2021, IntHout 2014, Riley 2011, Munn 2015).

Apoio 18 APOIO 18 – ELEGIBILIDADE E BUSCA



- Incluídos: observacionais com profissionais de centro cirúrgico expostos; qualquer efeito à saúde ou marcador de exposição; português, inglês ou espanhol; sem limite de data; resumos de congresso só com eventos e denominador (decisão posterior ao registro, declarada).
- Excluídos: in vitro ou animais; fora do centro cirúrgico; desfecho só no paciente; só medição do ar; revisões, editoriais e cartas; exposição não atribuível à fumaça.
- Busca em dois blocos (população AND exposição), sem bloco de desfecho, para máxima sensibilidade. Cochrane CENTRAL = 0 era esperado (indexa ensaios clínicos).

Apoio 19 APOIO 19 – FLUXOGRAMA PRISMA E CARACTERÍSTICAS



- Fluxograma da Figura 1 do manuscrito; não recuperados e excluídos no Anexo C.
- A busca por citação (443 referências) trouxe 4 relatórios, que entram em "Buscados na íntegra" (28 + 4 = 32).
- Entre os 7 estudos das metanálises, só Mohd Fikri Rosely e Titi Rahmawati (2019) usaram amostragem aleatória; nenhum estudo com preocupação baixa de viés.

Apoio 20 APOIO 20 – EXTRAÇÃO E RISCO DE VIÉS (JBI)




- Listas JBI por função do estudo: prevalência (9 itens), transversal analítico (8), coorte (11).
- Julgamento global qualitativo pelos domínios críticos (amostragem, tamanho, validade da mensuração, taxa de resposta); "não" pesa mais que "incerto". Todos os estudos foram mantidos e a classificação alimentou o GRADE.
- Por que JBI: tem lista específica para prevalência, alinhada ao CoCoPop; Newcastle-Ottawa não cobre prevalência e o ROBINS-E é para efeito comparativo de exposição.

Apoio 21 APOIO 21 – METANÁLISE PASSO A PASSO E ROBUSTEZ



- Proporção → logito → efeitos aleatórios (Paule-Mandel) → Hartung-Knapp → retrotransformação, I^2 e intervalo de predição.
- Robustez: Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird), GLMM logístico, leave-one-out, Baujat, subgrupo por país, sem o resumo de congresso e só definições específicas.
- Analogia: efeitos fixos = todos medem a mesma coisa com ruído; efeitos aleatórios = cada estudo tem a sua prevalência, e queremos a média e a dispersão delas.

Apoio 22 APOIO 22 – GRADE



- Ponto de partida baixa (observacional); um domínio grave já leva a muito baixa. Começar em alta não mudaria a certeza final.
- Evidência indireta não rebaixada nos sintomas (o sintoma é o próprio desfecho); rebaixada nos objetivos (coexposições, desfechos substitutos).
- Sem dupla contagem: intervalo de predição em inconsistência; IC95% em imprecisão.

Apoio 23 APOIO 23 – TABELA DE ROBUSTEZ E SUBGRUPO POR PAÍS

APOIO · RESULTADOS

Desfecho exploratório · Sintoma respiratório ou de vias aéreas, e robustez das estimativas

SEMICA
Seminário de Iniciação Científica de Araras




Figura 3. Sete amostras independentes (n = 1.428). Definições variam: tosse, ardência de garganta, irritação ou qualquer sintoma de vias aéreas superiores, escala por sistema.

41,7%

prevalência combinada de sintoma respiratório

IC95% 30,4–53,9 · **Intervalo de predição** 15–74%
I² = 91% · k = 7 · n = 1.428

Robustez: estável entre modelos e estudos

Análise	Ocular	Respiratório
Logito + Hartung-Knapp (principal)	**37,6%**	**41,7%**
Freeman-Tukey (DerSimonian-Laird)	38,1%	41,7%
GLMM logístico (intercepto aleatório)	37,5%	42,0%
Leave-one-out (faixa)	34,3–42,1%	38,9–45,5%
Sem o resumo de congresso	42,1%	42,4%
Só definições específicas	36,5% (I² 94%)	35,8% (I² 61%)

Subgrupo por país (sintoma ocular; exploratório)

Turquia 50,5% (k = 3; I² = 57%) · **Malásia 19,8%** (k = 2; I² = 0%) · **Brasil 43,2%** (k = 1)

Teste entre subgrupos p < 0,001, mas: poucos estudos por país e um resumo de congresso na Malásia → gera hipótese, não prova moderação causal.

O que a sensibilidade ensina

- Definições específicas: **I² respiratório 91% → 61%** (a definição explica parte da heterogeneidade).
- Ocular: I² segue alto sem o resumo (89%) ou sem Bieniek (94%): **não depende de um único estudo.**


- Subgrupo ocular: Turquia 50,5% (k = 3; I² 57%); Malásia 19,8% (k = 2; I² 0%); Brasil 43,2% (k = 1); p < 0,001, mas exploratório (poucos estudos e um resumo de congresso na Malásia).
- Baujat: no ocular, Mohd Fikri Rosely 2022 é o mais influente; o I² ocular segue alto sem ele (89%) ou sem Bieniek (94%).

Apoio 24 APOIO 24 – DESFECHOS OBJETIVOS EM DETALHE



- Cada desfecho vem de um único estudo; comparações não combinadas (desenhos e desfechos heterogêneos).
- Cautelas: VEF1/CVF ≈ 91% nos dois grupos e PFE depende do esforço; t,t-mucônico inespecífico; metaplasia é resposta inespecífica a irritantes; DNA de HPV ≠ infecção ou doença.

Apoio 25 APOIO 25 – PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES



- Fortes: busca ampla, protocolo registrado, PRISMA 2020, JBI, intervalo de predição, 3 modelos concordantes, GRADE por desfecho, OSF.
- Limitações: transversais e autorrelato; sem grupo não exposto nos agrupamentos; trabalhador sadio; heterogeneidade; revisor único; 6 não recuperados; elegibilidade em 3 idiomas.