Семейство Лютиковые — Ranunculaceae

Травы с очередными, часто расчлененными листьями без прилистников; цветки обычно обоеполые, околоцветник простой, лепестковидный или расчленен на чашечку и венчик, тычинки и пестики в неопределенном числе, плод — многолистовка или многоорешек.

	¬
1.	Листочки околоцветника белые или бледно-зеленые, не опадающие. Ли
	стья пальчаторассеченные, кожистые, зимующие. Плод — многоли
	стовка Морозник кавказский (Helleborus caucasicus A. Br.
_	Признаки иные
2.	Околоцветник простой, венчиковидный
_	Околоцветник двойной

3.	Листочков околоцветника 5, желтых
	Ветреница лютичная (Anemone ranunculoides L.)
_	Листочков околоцветника больше 5, голубых или синих
	Ветреница нежная (Anemone blanda Schott & Kotschy)
4	(2). Листья цельные, чашелистиков 3. Растение голое
	Чистяк калужницелистный (Ficaria calthifolia Reichenb.)
_	Листья рассеченные. Чашелистиков 5 (иногда опадают после того, как
	цветок раскрылся)
5.	Растение густо опушено мягкими, шелковистыми волосками. Цветоло-
	же голое
	Лютик крупноцветковый (Ranunculus grandiflorus C.A. Mey.)
_	Растение слабоопушенное. Цветоложе покрыто волосками
	Лютик каппадокийский (Ranunculus cappadocicus Willd.)

Предметный указатель

 ${f B}$ етреница 2 ${f M}$ орозник 1

 \mathbf{J} ютик 2 $\mathbf{\Psi}_{\mathsf{ИСТЯК}}$ 2