6. ak4GenJets: anti-k_T R = 0.4, jet p_T > 3 GeV

standalone: event_GenJet.lhe


42 jets; 368 of 749 status-1 particles clustered; marker size ~ log p_T; label = [jet] p_T [GeV] (p_T > 5 GeV); 43 beyond |η| = 6 on the border (x)

b quark (last copy): p_T = 78.29, η = -1.38, ϕ = -2.73 → jet [0]: p_T = 99.83 GeV, η = -1.44, ϕ = -2.71, n = 31, ΔR = 0.062, p_T(jet)/p_T(q) = 1.275

$\bar{b}$ quark (last copy): p_T = 72.50, η = -3.42, ϕ = 0.57 → jet [1]: p_T = 94.09 GeV, η = -3.45, ϕ = 0.59, n = 18, ΔR = 0.035, p_T(jet)/p_T(q) = 1.298

b jet + $\bar{b}$ jet: $|\vec{p}_T(b) + \vec{p}_T(\bar{b})|$ = 16.92 GeV (p_x = -12.78, p_y = 11.08), Σ$|p_T|$ = 193.92 GeV, Δϕ = 2.98, m = 301.4 GeV

hadronFlavour 5 or 4 (ghost-associated heavy hadrons): [0] $\bar{B}^0$, D^0, D_s^-; [1] $\bar{B}^0$, Ξ_c^0; [2] $\bar{B}^0$, $\bar{\Lambda}_b^0$, D^+, $\bar{D}^0$; [16] $\bar{D}^0$; [26] D^-



b jet: axis, circle R = 0.4
$\bar{b}$ jet
other jets (40), 6 in colour
jet constituents (jet colour)
status 1, in no jet (381)
b / $\bar{b}$ quark, last copy

marker size:

p_T = 1 GeV
p_T = 10 GeV
p_T = 100 GeV

leading jets: [i] p_T η ϕ n had/part

[0]	99.8	-1.44	-2.71	31	5/+5
[1]	94.1	-3.45	0.59	18	5/-5
[2]	60.5	-3.39	1.43	29	5/-5
[3]	48.1	0.28	-0.77	17	0/+2
[4]	46.4	-2.52	-2.53	25	0/-2
[5]	40.7	-2.07	-1.27	13	0/+2
[6]	19.9	0.62	1.38	14	0/+21
[7]	12.8	-0.69	0.77	7	0/+21

... 34 more

stages:

1 hard process
2 ISR + FSR
3 MPI / remnants
4 hadronisation
5 hadron decays
6 GenJets