6. ak8GenJets: anti-k_T R = 0.8, jet p_T > 3 GeV

standalone: event_GenJet.lhe


30 jets; 600 of 749 status-1 particles clustered; marker size ~ log p_T; label = [jet] p_T [GeV] (p_T > 5 GeV); 43 beyond |η| = 6 on the border (x)

b quark (last copy): p_T = 78.29, η = -1.38, ϕ = -2.73 → jet [1]: p_T = 105.79 GeV, η = -1.46, ϕ = -2.71, n = 47, ΔR = 0.078, p_T(jet)/p_T(q) = 1.351

$\bar{b}$ quark (last copy): p_T = 72.50, η = -3.42, ϕ = 0.57 → jet [0]: p_T = 147.69 GeV, η = -3.52, ϕ = 0.92, n = 57, ΔR = 0.360, p_T(jet)/p_T(q) = 2.037

b jet + $\bar{b}$ jet: $|\vec{p}_T(b) + \vec{p}_T(\bar{b})|$ = 73.35 GeV (p_x = -6.31, p_y = 73.08), Σ$|p_T|$ = 253.47 GeV, Δϕ = 2.66, m = 416.1 GeV

hadronFlavour 5 or 4 (ghost-associated heavy hadrons): [0] $\bar{\Lambda}_b^0$, $\bar{B}^0$, $\bar{B}^0$, $\bar{D}^0$, D^+, Ξ_c^0; [1] $\bar{B}^0$, D^0, D_s^-; [8] D^+, $\bar{D}^0$; [16] D_s^+; [23] D^-



b jet: axis, circle R = 0.8

$\bar{b}$ jet

other jets (28), 6 in colour

jet constituents (jet colour)

status 1, in no jet (149)

b / $\bar{b}$ quark, last copy

marker size:

p_T = 1 GeV

p_T = 10 GeV

p_T = 100 GeV

leading jets: [i] p_T η ϕ n had/part

[0]	147.7	-3.52	0.92	57	5/-5
[1]	105.8	-1.46	-2.71	47	5/+5
[2]	64.0	0.39	-0.67	47	0/+2
[3]	53.2	-2.14	-1.22	36	0/+2
[4]	52.7	-2.58	-2.52	38	0/-2
[5]	25.3	0.61	1.44	27	0/+21
[6]	22.0	-0.28	2.54	26	0/+2
[7]	19.7	-0.66	0.78	23	0/+21

... 22 more

stages:

1 hard process

2 ISR + FSR

3 MPI / remnants

4 hadronisation

5 hadron decays

6 GenJets