4. + hadronisation (primary hadrons)

standalone hadronisation: event_Had.lhe


365 particles drawn (marker size ~ log p_T; label = p_T [GeV] for p_T > 5 GeV), 30 with |η| > 6 drawn on the border (x)

b hadron $\bar{B}^{*0}$: p_T = 78.56 GeV, η = -1.38, ϕ = -2.73; from a quark of p_T = 78.29: $x_E = E_B/E_b$ = 1.004, x_{p_T} = 1.004

$\bar{b}$ hadron B^{*0}: p_T = 82.83 GeV, η = -3.43, ϕ = 0.58; from a quark of p_T = 72.50: $x_E = E_B/E_b$ = 1.154, x_{p_T} = 1.142

net $b+\bar{b}$: $|\vec{p}_T(b)+\vec{p}_T(\bar{b})|$ = 14.57 GeV (p_x = -2.85, p_y = 14.29), $\Sigma|p_T|$ = 161.39 GeV, $\Delta\phi(b,\bar{b})$ = 2.97

all 365 primary hadrons from 33 strings: $|\Sigma\vec{p}_T|$ = 0.00 GeV (hadronisation creates no momentum: the sum must still vanish)



particle origin (number drawn)

- b hadron (1)
- $\bar{b}$ hadron (1)
- b + $\bar{b}$ (vector sum)
- primary hadron (363)

33 colour-singlet strings

marker size:

- p_T = 1 GeV
- p_T = 10 GeV
- p_T = 100 GeV

stages:

1 hard process
2 ISR + FSR
3 MPI / remnants
4 hadronisation
5 hadron decays