

Centro de atención : Centro Médico Escuela Militar

Nombre : AGUIRRE AGUIRRE, DIANA PATRICIA
Rut-pasaporte:22275343-0
F.Nacimiento: 03-abr-1974
Fecha Atención: 17-jun-2026

N° Episodio: 1025598833
Procedencia:

RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA DORSOLUMBAR Y ARTICULACIONES SACROILIÁCAS (PROTOCOLO ESPONDILOARTROPATÍA)

Técnica: Estudio realizado con cortes sagitales T1-STIR de columna dorsolumbar, cortes coronales STIR de columna dorsal y cortes coronales oblicuos T1-STIR de articulaciones sacroiliacas, para detección de fenómenos inflamatorios de Pelviespondiloartropatía.

Hallazgos:

Cambios degenerativos del componente anteroinferior de ambas articulaciones sacroiliacas, sin evidencia de fenómenos erosivos ni inflamatorios.
Médula ósea de distribución normal para la edad.
Discopatía degenerativa L5-S1, con protrusión discal anular posterior y cambios tipo Modic II en plataformas vertebrales. En este contexto, se observa espondilolisis bilateral L5-S1, que determina anterolistesis grado I.
De igual manera, se observa discopatía degenerativa C5-C6 y C6-C7, con protrusión anular disco-osteofítica marginal posterior. Restantes discos intervertebrales de altura y señal normal.
No existen cambios inflamatorios-erosivos en inserción anular de discos intervertebrales. De igual manera, no se observan fenómenos inflamatorios de ligamentos interespinosos-supraespinoso.
Artrosis facetaria L4-L5 y L5-S1 bilateral. Restantes articulaciones facetarias y articulaciones costotransversas y costovertebrales sin fenómenos inflamatorios.
Neuroforámenes sacros indemnes. Musculatura paravertebral dorsolumbar sin alteraciones.
Incidentalmente se observa edema y/o cambios inflamatorios en plano celular subcutáneo de región glútea derecha.

Impresión:

1. Examen sin fenómenos inflamatorios sugerentes de pelviespondiloartropatía activa.
2. Discopatía degenerativa L5-S1, con protrusión discal anular posterior y cambios tipo Modic II en plataformas vertebrales. Espondilolisis bilateral L5-S1 que determina anterolistesis grado I.
3. Discopatía degenerativa C5-C6 y C6-C7, con protrusión anular disco-osteofítica marginal posterior.
4. Artrosis facetaria L4-L5 y L5-S1 bilateral.

Atentamente,

Dr. Pablo Andres Cikutovic Molina

Informe Validado por: **Dr. Pablo Andres Cikutovic Molina**
Paciente: AGUIRRE AGUIRRE, DIANA PATRICIA