

关于定义欧拉数的序列之收敛性

Markus Brede

虽然著名且熟知的序列 $\{\tilde{e}_\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}} := \{(1 + \frac{1}{\nu})^\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}}$ 是定义欧拉数 $e \approx 2.71828$ 的最重要的不平凡序列, 但是这个序列的泰勒展式在无穷远处的一般结构还没有弄清楚. 当然要是利用一些数学软件, 比如 Maple 或者 Mathematica, 能够求出这个展式的任何一项比如前 5 项的值: 限制 $x < 1$, 利用 $\log(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式, 立刻可以得到 $\nu \log(1 + \frac{1}{\nu})$ 在 $\nu = \infty$ 处的泰勒展式. 具体写出如下:

$$\tilde{e}_\nu := \left(1 + \frac{1}{\nu}\right)^\nu = e - \frac{e}{2\nu} + \frac{11e}{24\nu^2} - \frac{7e}{16\nu^3} + \frac{2447e}{5760\nu^4} \mp \cdots =: \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e_n}{\nu^n}.$$

但是, 我们能够确定隐藏在省略号 (\cdots) 后面的是什么呢? 也就是说, 省略号 (\cdots) 代表的是什么呢?

我将为上面展式中的系数 e_n 寻求一个封闭的、有限的表示. 同时得到, 上述展式将意味着如下的渐近表述的序列:

$$\tilde{e}_\nu = \sum_{n=0}^{n_0} \frac{e_n}{\nu^n} + O\left(\frac{1}{\nu^{n_0+1}}\right) \quad (\nu \rightarrow \infty, n_0 \in \mathbb{N}).$$

这是一些新的结果; 虽然 [Todorov], [Brothers, Knox], 和 [Knox, Brothers] 也探讨过相关的问题, 但他们都没有得到 e_n 是斯特林数某些倍数的有限和的这个一般结构. 我将证明这个非常简单的公式:

$$e_n = e \sum_{\nu=0}^n \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!} \sum_{m=0}^{n-\nu} \frac{(-1)^m}{m!},$$

其中 S_1 表示第一类斯特林数. 特别, 这个公式表示, 所有的 e_n 都是欧拉数 e 的有理倍.

为了证明上述结论, 我将引入几个引理. 它们都是根据如下的定义得出的.

定义 如果 $\operatorname{Re} x > -1$, $x \neq 0$, 且 $t \leq 1$, 令 $E_t(x) := \exp(\log(1+tx)/x)$ 和 $E_t(0) := e^t$, 对数函数的分支由 $\log(1) = 0$ 决定.

那么我们显然有

引理 1

(i) 对于所有的 $t \leq 1$, $E_t(x)$ 在 $\operatorname{Re} x > -1$ 中全纯. 对于所有的实数 $x \neq 0$ 和实数 $t \in [-1, 1]$, 有 $E_t(x) = (1+tx)^{1/x}$. $E_t(x)$ 在 $x < 1$ 时的泰勒展式是: $E_t(x) =: \sum_{n=0}^{\infty} e_n(t)x^n$.

(ii) 序列 $\{\tilde{e}_\nu\}_{\nu \in \mathbb{N}}$ 中的元素 $\tilde{e}_\nu := (1 + \frac{1}{\nu})^\nu$, 在 $\nu = \infty$ 处有一个渐近展式, 其系数 $e_n := e_n(1)$ 如 (i) 中所定义:

$$\tilde{e}_\nu = E_1\left(\frac{1}{\nu}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e_n(1)}{\nu^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e_n}{\nu^n}.$$

原题: On the Convergence of the Sequence Defining Euler's Number. 译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.27 (2005), No.3, p.6-7.

根据引理 1 (ii), 数 e_n 的限制条件化为计算 $E_1(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式的系数. 它们的值的计算用如下的引理 2 将非常简单.

引理 2

(i) 对于 $\operatorname{Re} x > -1$ 和 $t \leq 1$, 有

$$E_t(x) = e^t \sum_{n=0}^{\infty} t^n p_n(t) x^n,$$

其中 p_n 表示 t 的一个 n 次多项式.

(ii) 对于 $\operatorname{Re} x > -1$ 和 $t \leq 1$, 还有

$$E_t(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{\nu=n}^{\infty} \frac{S_1(\nu, \nu-n)}{\nu!} t^\nu \right) x^n,$$

括号内级数收敛. 其中 S_1 表示第一类斯特林数, 它由函数 $(x)_\nu = x(x-1)\cdots(x-(\nu-1)) =: \sum_{n=0}^{\nu} S_1(\nu, n) x^n$ 所生成; 可以参看 [Abramowitz, Stegun, §24.1.3, B, 公式 (1)].

证明 (i) 在给定的假设条件下, 因为绝对收敛, 有

$$\begin{aligned} E_t(x) &= \exp\left(\frac{\log(1+tx)}{x}\right) = \exp\left[\frac{1}{x}\left(tx - \frac{(tx)^2}{2} + \frac{(tx)^3}{3} \mp \cdots\right)\right] \\ &= e^t \left[1 + \left(-\frac{t^2}{2}x + \frac{t^3}{3}x^2 \mp \cdots\right) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{t^2}{2}x + \frac{t^3}{3}x^2 \mp \cdots\right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{3!}\left(-\frac{t^2}{2}x + \frac{t^3}{3}x^2 \mp \cdots\right)^3 + \frac{1}{4!}\left(-\frac{t^2}{2}x + \frac{t^3}{3}x^2 \mp \cdots\right)^4 + \cdots\right] \\ &= e^t \left[1 - \frac{t^2}{2}x + \left(\frac{t^3}{3} + \frac{t^4}{8}\right)x^2 - \left(\frac{t^4}{4} + \frac{t^5}{6} + \frac{t^6}{48}\right)x^3 + \cdots\right]. \end{aligned}$$

这就证明了 (i).

(ii) 另一方面, 利用二项式公式容易得到

$$\begin{aligned} E_t(t) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} \binom{1/x}{\nu} (tx)^\nu = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{(tx)^\nu}{\nu!} \sum_{n=0}^{\nu} \frac{S_1(\nu, n)}{x^n} \\ &= \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{t^\nu}{\nu!} \sum_{n=0}^{\nu} S_1(\nu, \nu-n) x^n. \end{aligned}$$

利用这个级数的绝对收敛性, 我们可以改变求和式的次序而得到 (ii).

下面我们来得出最主要的结果:

定理 对于所有的 n , 令 $\varepsilon_n := \sum_{m=0}^n (-1)^m / m!$. 那么有

$$e_n = e \sum_{\nu=0}^n \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!} \varepsilon_{n-\nu}.$$

证明 首先从引理 2 得到

$$e^t t^n p_n(t) = \sum_{\nu=n}^{\infty} \frac{S_1(\nu, \nu-n)}{\nu!} t^\nu,$$

即

$$p_n(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} t^m \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!} t^\nu,$$

或者

$$p_n(t) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \left(\sum_{\nu=0}^m (-1)^\nu \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!(m-\nu)!} \right) t^m.$$

由于 p_n 是 t 的 n 次多项式, 从而产生了两个互不相干但有趣的结果:

$$\sum_{\nu=0}^m (-1)^\nu \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!(m-\nu)!} = 0 \quad \text{对于所有的 } m > n,$$

以及 p_n 的精确表述:

$$p_n(t) = \sum_{m=0}^n (-1)^m \left(\sum_{\nu=0}^m (-1)^\nu \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!(m-\nu)!} \right) t^m.$$

从这些结果及引理 2 的 (i), 我们能够得到 $E_t(x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展式的一个精确表述: 特别地, 对于 $t=1$, 我们有 $E_1(x) = e \sum_{n=0}^{\infty} p_n(1)x^n$. 利用引理 1 的 (ii), 我们知道数 e_n 是如下展式的系数:

$$\begin{aligned} e_n &= e p_n(1) = e \sum_{m=0}^n (-1)^m \sum_{\nu=0}^m (-1)^\nu \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!(m-\nu)!} \\ &= e \sum_{\nu=0}^n (-1)^\nu \frac{S_1(n+\nu, \nu)}{(n+\nu)!} \sum_{m=\nu}^n \frac{(-1)^m}{(m-\nu)!}. \end{aligned}$$

这就证明了定理.

注 数 S_1 的定义蕴涵着 $S_1(\nu, n)$ 的符号是 $(-1)^{\nu-n}$. 联系定理的结论知 e_n 的符号是 $(-1)^n$.

参考文献 (略)

(游淑君 译 何育赞 校)