

शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची (NIS)				
वैक्सीन (टीका)	कब दी जाए	दी जाने वाली खुराक	दिए जाने की विधि	दिए जाने हेतु शरीर का भाग
गर्भवती महिलाओं के लिए				
टीटी-1	गर्भावस्था के प्रारंभिक समय में	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्क्युलर)	बाँह के ऊपरी भाग में
टीटी-2	टीटी -1* दिए जाने के 4 सप्ताह के अंदर	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्क्युलर)	बाँह के ऊपरी भाग में
टीटी-बूस्टर	यदि पिछले 3 वर्षों* के दौरान किसी भी गर्भावस्था में टीटी की 2 खुराक प्राप्त की गई हैं।	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्क्युलर)	बाँह के ऊपरी भाग में
शिशुओं के लिए				
बीसीजी	जन्म के समय या एक वर्ष की आयु तक, जितनी जल्दी हो सके।	0.1 मिलीलीटर (1 माह की आयु तक 0.05 मिलीलीटर)	अंतरत्वचीय (इंट्रा डर्मल)	बाईं बाँह के ऊपरी भाग में
हेपेटाइटिस बी- जन्म के समय दी जाने वाली खुराक	जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके।	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्क्युलर)	जाँघ के मध्य भाग के अग्रपार्श्विक (एंटरोलेटरल) पक्ष में
ओपीवी-0	जन्म के समय या पहले 15 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके	2 बूँदें	मौखिक	मौखिक

ओपीवी 1, 2 एवं 3	6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में (ओपीवी को 5 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है)।	2 बूँदें	मौखिक	मौखिक
पेंटावैलेंट 1, 2 एवं 3	6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में (ओपीवी को 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है)	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्क्युलर)	जांघ के मध्य भाग में अग्रपाश्विक (एंटरो लेटरल) पक्ष में
रोटावायरस #	6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में (ओपीवी को 1 वर्ष की आयु तक दिया जा सकता है)	5 बूँदें	मौखिक	मौखिक
आईपीवी	6 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु पर दो आंशिक खुराक	0.1 मिलीलीटर	अंतरत्वचीय दो आंशिक खुराक	अंतरत्वचीय (इंट्रा डर्मल): दाईं बाँह के ऊपरी भाग में
खसरा / एमआर 1 खुराक \$	9 माह पूरे होने से -12 माह तक (5 वर्ष की आयु तक दी जा सकती है)	0.5 मिलीलीटर	अधस्त्वचीय (सब-क्यूटेनियस)	दाईं बाँह के ऊपरी भाग में

जेई- 1**	9 माह पूरे होने से -12 माह तक	0.5 मिलीलीटर	अधस्तवचीय (सब-क्यूटेनियस)	बार्यी बाँह के ऊपरी भाग में
विटामिन ए (पहली खुराक)	9 माह पूरे होने पर खसरा-रूबेला की वैक्सीन के साथ	1 मिलीलीटर (1 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई )	मौखिक	मौखिक
<b>बच्चों के लिए</b>				
डीपीटी बूस्टर -1	16-24 माह	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्कुलर)	जांघ के मध्य भाग में अग्रपाश्विक पक्ष में
खसरा / एमआर दूसरी खुराक \$	16-24 माह	0.5 मिलीलीटर	अधस्तवचीय (सब-क्यूटेनियस)	बार्यी बाँह के ऊपरी भाग में
ओपीवी बूस्टर	16-24 माह	2 बूँदें	मौखिक	मौखिक
जेई - 2	16-24 माह	0.5 मिलीलीटर	अधस्तवचीय (सब-क्यूटेनियस)	बार्यी बाँह के ऊपरी भाग में
विटामिन ए *** (दूसरी से नौवीं खुराक)	16-18 माह। उसके बाद 5 वर्ष की आयु तक हर 6 महीने एक खुराक।	2 मिलीलीटर (2 लाख अंतर्राष्ट्रीय इकाई)	मौखिक	मौखिक
डीपीटी बूस्टर-2	5-6 वर्ष	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्कुलर)	बाँह के ऊपरी भाग में
टीटी	10 वर्ष एवं 16 वर्ष	0.5 मिलीलीटर	अंतरर्पेशीय (इंट्रा मस्कुलर)	बाँह के ऊपरी भाग में

\* गर्भावस्था के 36 सप्ताह से पहले टीटी-2 या बूस्टर खुराक दें। लेकिन, भले ही 36 से अधिक सप्ताह बीत चुके हैं तक भी इसे दें। यदि महिला को पहले से टीटी की खुराक नहीं मिली है तो प्रसव के दौरान उसे यह खुराक दें।

\*\*जेई वैक्सीन का आरम्भ, अभियान के बाद कुछ स्थानिक जिलों में किया गया है।

\*\*\* विटामिन ए की दूसरी और नौवीं खुराक द्विवार्षिक दौर के दौरान 1-5 वर्ष आयु के बच्चों को समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के सहयोग से दी जा सकती है।

# वर्तमान में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में और उड़ीसा में 2016 से चरणबद्ध आरम्भ और फरवरी 2017 में इसे मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और त्रिपुरा में विस्तारित किया गया और 2017 में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इस हेतु योजना निर्मित की गई।

\$ वर्तमान में पांच राज्यों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चरणबद्ध आरम्भ। (फरवरी 2017 तक के अनुसार)