

Biologia Quantitativa

Análises de Censos

Dept de Zoologia

13 out 2020

Métodos de Censos

- Os principais métodos de censo de indivíduos em ecologia incluem:
- Censos de organismos por parcelas fixas (quadrats)
- Censos de organismos por pontos fixos
- Censos de organismos por transectos
- Censos de organismos por capturas
- Censos de organismos por marcação e recaptura

Métodos de Censos por parcelas

- Quadrats
- Contagem e identificação de todos os organismos nas parcelas



Análises de Censos por parcelas


- Distribuição: aleatória, uniforme, agregada
- Hipótese nula: poisson. Média=variância
- Usada para testar existência de agregações ou territórios
- Combinada com transectos para realizar análise de gradientes e turnover de espécies
- Sensível a escalas

Censo por pontos fixos

- Usado para plantas (point center quarter)
- Usado para aves: censo auditivo e/ou visual em pontos com diâmetro fixo ou variável
- Normalmente usado para aumentar o tamanho amostral sem exigir esforço extraordinário
- Aplica-se também em situações de alta heterogeneidade espacial.
- Sofre dos problemas de detectabilidade nas situações de raio variável

Censo por transectos

- Linhas extensas são estabelecidas em habitats homogêneos ou ao longo de gradientes



Censos por transectos

- Usados para estimar densidades, abundâncias, e tamanhos populacionais
- Usados para caracterizar gradientes e nichos
- Suscetíveis a artefatos de detectabilidade

Censos por Capturas

- Usado armadilhas, redes, etc
- Podem ser destrutivas ou com soltura
- Sofrem dos dois problemas anteriores: sensíveis ao método usado e à área amostrada

Censos por marcação e recaptura

- Visam caracterizar tamanho e comportamento da população.
- Sensíveis aos problemas do censo por capturas e do comportamento do organismo pós-captura

Tópicos em Ecologia Aplicada

Análises de Populações

Captura/recaptura e monitoramento


PG Ecologia
09 nov 2011

Métodos de Captura-Recaptura

- Tem como objetivo estimar as características populacionais a partir da proporção de indivíduos marcados recapturados em eventos subsequentes. Dentre os parâmetros alvo, podem ser estimados:
- Movimentos e dispersão (1)
- Taxas de crescimento individual (1)
- Tamanho populacional e taxa de crescimento populacional
- Taxas de fecundidade e mortalidade por grupo etário (1)
- Taxas de natalidade/imigração
- Taxas de mortalidade/emigração

Complexidade da Amostragem

- O planejamento experimental é influenciado pelo parâmetro populacional investigado, pela biologia e hábitos do organismo, pelo método de captura, pelo método de marcação, e pelas características do habitat



Limitações

- Marcação-recaptura é demorado e dispendioso e os modelos teóricos contém premissas difíceis de validar
- Duas classes de métodos analíticos: os que dependem exclusivamente da amostra marcada (indivíduos não marcados são desconsiderados, categoria 1), e os que comparam marcados vs não marcados.
- Premissa fundamental no segundo método é de que a probabilidade de captura é a mesma para marcados e não marcados
- Análises estatísticas muito sensíveis à violação desta premissa

Fontes de erro capturabilidade heterogênea

- Variação individual ou em grupos/classes na probabilidade de captura inicial
- Aprendizado pós-captura afetando a recaptura
- Compatibilidade entre a distribuição espacial dos indivíduos e da grade de captura - afeta o tamanho pop
- Diversos testes estatísticos foram desenvolvidos para validar capturabilidade homogenea. Leslie distr binomial, Caughley Poisson truncada, Caughley correção para perda de anilhas.

Tamanho Populacional

- Necessário ter conhecimento do tamanho médio de áreas domiciliares para que a grade de captura não seja densa demais ou dispersa demais.
- Método de Petersen: $N = M * n / m$ tamanho populacional na ocasião da marcação. M=número de animais marcados na primeira amostragem, n=número total da segunda amostragem, m=número de animais marcados capturados na segunda amostragem
- 3 premissas: independencia de capturabilidade, capturabilidade equivalente marc/n-marc, manutencao proporcao marcados/n-marc no período amostral

Métodos Modificados

- Correção de Bailey e Chapman - se aplica no caso do número de indivíduos marcados a ser recapturado é predefinido e com ou sem reposição. Visa corrigir a tendência de super-estimativas pelo método Petersen.
- Todos estes métodos permitem obter erro padrão da estimativa.

Métodos de Schumacher e Bailey

- Schumacher - método que usa eventos de captura e marcação repetidos para estimar tamanho populacional à medida que a proporção de indivíduos marcados aumenta na população.
- Permite validar a premissa de capturabilidade igual entre marcados e não marcados (regressão de m/n sobre M)
- Método triplo de Bailey: três eventos, duas marcações duas recapturas
- Permite corrigir eventos de nascimento e imigração

Método de Jolly-Seber

- Método estocástico em comparação com método determinísticos de Schumacher e Bailey
- Baseia-se no fato de que valores observados seguem distribuição probabilística de eventos.
- Exige o acompanhamento do histórico individual de capturas e recapturas ao longo da série