

Análise das classificações brutas do audiomoth e listas de mackinnon para o CO

Listas de mackinnon de 2017 a 2026

Audiomoth de 2022 e 2025

Assemblage	Diversity	Observed	Estimator	s.e.	LCL
1 audiomoth Species richness	269.00000	374.11533	23.8802189	327.31096	
2 audiomoth Shannon diversity	30.42002	30.99225	0.5745396	29.86617	
3 audiomoth Simpson diversity	12.31159	12.32442	0.2374009	11.85912	
4 mackinnon Species richness	119.00000	143.27868	21.0977388	119.00000	
5 mackinnon Shannon diversity	64.90331	69.47423	2.0898301	65.37824	
6 mackinnon Simpson diversity	46.54394	48.48256	1.8990644	44.76047	
UCL					
1 420.91970					
2 32.11833					
3 12.78972					
4 184.62949					
5 73.57022					
6 52.20466					

Resultados:

Lista mackinnon 119 sp observadas, 143 estimadas

Audiomoth 269 sp observadas, 374 estimadas

Grafico em anexo mostrando que ambas tem crescimento bem proximo mas a assintota da lista de mackinnon sai rapidamente e a assintota do audiomoth continua crescendo. O motivo é o alto número de observações singulares no audiomoth, pois o inext calcula a assintota a partir da proporcao de registros unicos na amostra. Isso sugere que precisamos conferir o audiomoth para retirar classificacoes incorretas, inclusive porque o audiomoth sugere numerosas especies que nao ocorrem na regioao ou que nao ocorreriam nos habitats presentes no CO.

Conclusao principal; Curva de acumulo de especies bem proxima para os dois metodos, mas audiomoth precisa de edição para remover registros incorretos que distorcem a estimativa de numero de especies na area. Os melhores levantamentos por observadores indicam cerca de 200 espécies de aves na área do CO, ao passo que o audiomoth sugere quase 400, ou uma estimativa claramente desproporcional.