
A. Effect of trial design, censoring and biomarker effect on power
N−of−1
OL
OL+BDC
PG−RCT
CO
Censoring parameters
high dropout
more of biased
more of flat
balanced
No censoring
N subjects
35
70
0.06 0.18 0.46
0.12 0.14 0.44
0.06 0.14 0.28
0.16 0.1 0.3
0.08 0.16 0.48
0.02 0.24 0.76
0.06 0.2 0.52
0.04 0.18 0.62
0.1 0.16 0.36
0.04 0.44 0.78
0.04 0.2 0.72
0.06 0.24 0.52
0.06 0.22 0.54
0.1 0.12 0.44
0 0.5 0.8
0.02 0.24 0.76
0.12 0.2 0.5
0.08 0.24 0.54
0.08 0.06 0.44
0 0.48 0.82
0.02 0.36 0.86
0.12 0.24 0.56
0.06 0.24 0.66
0.08 0.1 0.46
0 0.66 0.9
0.02 0.26 0.7
0.08 0.32 0.58
0.04 0.2 0.6
0.12 0.18 0.46
0.08 0.38 0.8
0.04 0.44 0.94
0.12 0.22 0.8
0.08 0.46 0.9
0.12 0.26 0.7
0.02 0.62 1
0.02 0.4 0.94
0.04 0.18 0.82
0.06 0.44 0.94
0.12 0.18 0.64
0.06 0.52 1
0.02 0.54 0.96
0.08 0.18 0.76
0.08 0.46 0.9
0.1 0.3 0.6
0.04 0.56 1
0.02 0.58 0.96
0.08 0.28 0.8
0.08 0.62 0.96
0.1 0.36 0.72
0.02 0.78 1
0 0.3 0.6
Biomarker effect
Power
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
B. Effect of nonzero carryover term on power
0.46 0.36 0.3
0.44 0.5 0.22
0.28 0.34 0.28
0.3 0.4 0.32
0.48 0.64 0.66
0.76 0.66 0.56
0.52 0.46 0.4
0.62 0.6 0.5
0.36 0.36 0.36
0.78 0.92 0.86
0.72 0.66 0.48
0.52 0.54 0.38
0.54 0.56 0.56
0.44 0.38 0.26
0.8 0.88 0.8
0.76 0.68 0.48
0.5 0.48 0.38
0.54 0.56 0.46
0.44 0.3 0.38
0.82 0.8 0.92
0.86 0.78 0.66
0.56 0.5 0.4
0.66 0.74 0.64
0.46 0.38 0.44
0.9 0.98 0.92
0.7 0.7 0.68
0.58 0.72 0.6
0.6 0.52 0.5
0.46 0.36 0.42
0.8 0.84 0.92
0.94 0.94 0.84
0.8 0.76 0.64
0.9 0.8 0.7
0.7 0.66 0.56
1 0.98 0.96
0.94 0.98 0.82
0.82 0.88 0.74
0.94 0.86 0.74
0.64 0.68 0.66
1 0.98 0.98
0.96 0.96 0.84
0.76 0.7 0.78
0.9 0.84 0.7
0.6 0.58 0.62
1 0.98 0.98
0.96 1 0.88
0.8 0.82 0.76
0.96 0.94 0.92
0.72 0.72 0.68
1 1 1
0 0.5 1
Carryover (in weeks)
Power
1.0
0.8
0.6
0.4