

Lecture Notes: Newton's Method (Unconstrained Optimization)

1 Motivation

Newton's method is a second-order optimization technique that uses information from the gradient and the Hessian (matrix of second derivatives) of the objective function to construct a local quadratic model around the current iterate. This quadratic approximation is then minimized to obtain a new point.

The basic idea is: if the function $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ is smooth and we are at a point x_i close to a minimizer, then a quadratic Taylor approximation of f around x_i can be used to compute a search direction that points directly toward the optimum (for quadratic functions, in a single step).

2 Quadratic Approximation and Newton Step

Step 1: Taylor expansion around the current point

Consider a twice continuously differentiable function $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Around a point x_i , we can approximate f by a second-order Taylor expansion:

$$f(x) \approx f(x_i) + \nabla f_i^\top (x - x_i) + \frac{1}{2}(x - x_i)^\top H_i(x - x_i),$$

where

$$\nabla f_i := \nabla f(x_i) \quad \text{e} \quad H_i := \nabla^2 f(x_i)$$

é a matriz Hessiana avaliada em x_i .

Step 2: Local quadratic model

Definimos o modelo quadrático local $m_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$m_i(x) = f(x_i) + \nabla f_i^\top (x - x_i) + \frac{1}{2}(x - x_i)^\top H_i(x - x_i).$$

Queremos encontrar o ponto que minimiza esse modelo. Seja

$$p := x - x_i$$

o deslocamento a partir de x_i . Então

$$m_i(x_i + p) = f(x_i) + \nabla f_i^\top p + \frac{1}{2}p^\top H_i p.$$

O problema local de minimização torna-se:

$$\min_{p \in \mathbb{R}^n} q(p) := \nabla f_i^\top p + \frac{1}{2}p^\top H_i p.$$

Step 3: Condição de otimalidade do modelo quadrático

Para minimizar $q(p)$, derivamos em relação a p e igualamos a zero:

$$\nabla_p q(p) = \nabla f_i + H_i p = 0.$$

Assim, a condição de primeira ordem para o mínimo do modelo é

$$H_i p = -\nabla f_i.$$

Supondo que H_i seja não singular (invertível), obtemos

$$p^* = -H_i^{-1} \nabla f_i.$$

Step 4: Atualização de Newton

O próximo ponto x_{i+1} é obtido somando o deslocamento ótimo p^* ao ponto atual:

$$x_{i+1} = x_i + p^* = x_i - H_i^{-1} \nabla f_i.$$

Esta é a fórmula clássica do passo de Newton:

$$x_{i+1} = x_i - [\nabla^2 f(x_i)]^{-1} \nabla f(x_i).$$

Como a aproximação de Taylor truncou termos de ordem superior, essa atualização é aplicada de forma iterativa para aproximar um ponto x^* tal que $\nabla f(x^*) = 0$.

3 Geometric Interpretation

Em uma dimensão ($n = 1$), Newton para encontrar raízes de $f'(x) = 0$ interpreta-se como:

- A reta tangente ao gráfico de $f'(x)$ em x_i é usada para encontrar o próximo ponto onde a derivada se anula.
- Em múltiplas dimensões, o mesmo raciocínio é generalizado usando o gradiente ∇f e a Hessiana $\nabla^2 f$ para determinar o deslocamento p^* que anula o gradiente do modelo quadrático.

Quando x_i está suficientemente próximo de um mínimo estrito e H_i é definida positiva, o método apresenta convergência quadrática.

4 Newton's Method Algorithm (Basic Version)

We summarize the basic Newton method for unconstrained minimization.

1. Choose an initial guess x_1 .
2. For $i = 1, 2, \dots$:
 - (a) Compute the gradient and Hessian at x_i :

$$\nabla f_i = \nabla f(x_i), \quad H_i = \nabla^2 f(x_i).$$

- (b) Solve the linear system

$$H_i p_i = -\nabla f_i$$

for the Newton step p_i .

- (c) Update

$$x_{i+1} = x_i + p_i.$$

- (d) If $\|\nabla f_{i+1}\|$ is sufficiently small, stop.

5 Special Case: Quadratic Functions

Considere uma função quadrática geral

$$f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax + b^\top x + c,$$

onde A é uma matriz simétrica definida positiva. Então:

$$\nabla f(x) = Ax + b, \quad \nabla^2 f(x) = A.$$

O ponto de mínimo é dado por

$$\nabla f(x^*) = 0 \implies Ax^* + b = 0 \implies x^* = -A^{-1}b.$$

O passo de Newton, em qualquer iteração i , é

$$x_{i+1} = x_i - A^{-1}(Ax_i + b) = x_i - A^{-1}Ax_i - A^{-1}b = -A^{-1}b = x^*.$$

Ou seja, para funções quadráticas com Hessiana constante A , o método de Newton encontra o ponto ótimo em *uma única iteração* (independentemente de x_1), desde que A seja não singular.

6 Example: Minimization of a Quadratic Function

Considere a função

$$f(x_1, x_2) = x_1 - x_2 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2,$$

com ponto inicial

$$x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Step 1: Gradient and Hessian

O gradiente é

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + 4x_1 + 2x_2 \\ -1 + 2x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}.$$

O Hessiano (constante) é

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = H.$$

Step 2: Evaluate at the initial point

No ponto inicial $x_1 = (0, 0)^\top$,

$$\nabla f_1 = \nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Step 3: Compute the Newton step

Precisamos de H^{-1} . Como

$$H = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix},$$

uma inversa possível é

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}.$$

O passo de Newton é

$$p_1 = -H^{-1}\nabla f_1 = -\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1) + (-\frac{1}{2})(-1) \\ -\frac{1}{2}(1) + 1(-1) \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

Step 4: Update the point

$$x_2 = x_1 + p_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

Step 5: Check optimality

Calculamos o gradiente em x_2 :

$$\nabla f_2 = \nabla f(-1, \frac{3}{2}) = \begin{bmatrix} 1 + 4(-1) + 2(\frac{3}{2}) \\ -1 + 2(-1) + 2(\frac{3}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 4 + 3 \\ -1 - 2 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Logo, $\nabla f_2 = 0$ e x_2 é o ponto ótimo. Como esperado para uma função quadrática, o método de Newton convergiu em uma única iteração.

7 Newton's Method with Line Search

Na prática, para funções não quadráticas, o passo

$$x_{i+1} = x_i - H_i^{-1}\nabla f_i$$

pode não ser adequado:

- o método pode divergir;
- pode convergir para um ponto de sela ou máximo;
- o tamanho do passo pode ser muito grande ou muito pequeno.

Uma modificação comum é introduzir um *line search* na direção de Newton:

$$s_i = -H_i^{-1}\nabla f_i,$$

$$x_{i+1} = x_i + \lambda_i^* s_i,$$

onde λ_i^* é um passo que tenta minimizar $f(x_i + \lambda s_i)$ em relação a λ (por exemplo, satisfazendo condições de Wolfe). Isso leva ao *método de Newton com busca linear*, que em geral é mais robusto e evita convergência para pontos indesejáveis.

8 Weaknesses of Newton's Method

Apesar de suas boas propriedades teóricas (convergência quadrática próxima ao ótimo, convergência em um passo para funções quadráticas), o método de Newton tem limitações práticas importantes.

Cálculo e armazenamento da Hessiana

O método requer a matriz Hessiana $H_i = \nabla^2 f(x_i)$:

- Para problemas de dimensão n , H_i é uma matriz $n \times n$, com $O(n^2)$ elementos.
- Em muitos problemas práticos (como em aprendizado de máquina com milhares ou milhões de parâmetros), é inviável calcular e armazenar explicitamente a Hessiana.

Custo de inversão / solução de sistemas lineares

A cada iteração é necessário resolver

$$H_i p_i = -\nabla f_i.$$

Mesmo usando métodos numéricos eficientes, o custo típico é $O(n^3)$ em tempo para inversão direta ou fatorações, o que se torna proibitivo em alta dimensão.

Dificuldade em obter derivadas de segunda ordem

Para funções complicadas, a expressão analítica de $\nabla^2 f(x)$ pode ser:

- difícil de derivar manualmente;
- sujeita a erros de implementação;
- custosa de avaliar numericamente.

Técnicas como diferenciação automática ajudam, mas ainda há custo de memória e tempo consideráveis.

Sensibilidade e não convergência em funções não quadráticas

Em funções não quadráticas:

- a Hessiana pode não ser definida positiva em toda a região de interesse;
- o método pode divergir se o ponto inicial não estiver suficientemente próximo do mínimo;
- o método pode convergir para pontos de sela ou máximos se não houver controle adicional (por exemplo, via modificações da Hessiana ou line search adequado).

Resumo

O método de Newton é muito eficiente quando:

- f é bem aproximada localmente por uma função quadrática;
- a Hessiana é definida positiva e não muda radicalmente;
- o custo de computar e manipular a Hessiana é aceitável.

Em problemas de grande escala ou com funções muito não lineares, essas condições raramente são satisfeitas, motivando variantes como métodos quasi-Newton (BFGS, L-BFGS) e métodos baseados apenas em primeira ordem.

9 Conclusion

Newton's method uses second-order information to build a local quadratic model of the objective function and update the iterate by solving a linear system involving the Hessian. For quadratic functions, it reaches the minimum in a single iteration. For general nonlinear functions, it can exhibit fast (quadratic) convergence near a local minimizer, but its practical use is limited by:

- the cost of computing and storing the Hessian;
- the need to solve large linear systems;
- potential divergence or convergence to saddle points without safeguards.

These limitations motivate many modern variants that trade off exact second-order information for cheaper approximations, preserving some of Newton's advantages while remaining computationally feasible.