

# Cours de Statistiques Inférentielles

CQLS : [cqls@upmf-grenoble.fr](mailto:cqls@upmf-grenoble.fr)

14 mars 2014

# Plan

1 Approche Expérimentale des Probabilités

2 P-valeur

# Approche **E**xpérimentale des **P**robabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

Future  $\widehat{\mu^\bullet}(Y^\bullet)$

**L'Expérimentateur :**

- ➊ Réaliser  $m$  expériences

# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

**L'Expérimentateur :** 1<sup>ère</sup> réalisation

① Réaliser  $m$  expériences

$$\widehat{\mu^\bullet}(y_{[1]}^\bullet)$$

14.6%

Future  $\widehat{\mu^\bullet}(Y^\bullet)$

# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

**L'Expérimentateur :**

- ➊ Réaliser  $m$  expériences

$$\boxed{\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{y}_{[1]}^\bullet)} \\ 14.6\%$$

2<sup>ème</sup> réalisation

Future  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y}^\bullet)$


$$\boxed{\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{y}_{[2]}^\bullet)} \\ 16.3\%$$

# Approche Expérimentale des Probabilités :

## l'Expérimentateur versus le Matheux

**L'Expérimentateur :**



- 1 Réaliser  $m$  expériences



# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :



- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu}^\bullet(y_{[j]}^\bullet)$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )



# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :

- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu^\bullet}(y_{[j]}^\bullet)$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )







# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :



- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu^\bullet}(y_{[j]}^\bullet)$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )



# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :

- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu^\bullet}(y_{[i]}^\bullet)$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )





# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :

- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu}^{\bullet}(y_{[j]}^{\bullet})$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )

## Le Matheux :

- 3 Je le savais à l'avance pour  $m \rightarrow +\infty$





# Approche Expérimentale des Probabilités : l'Expérimentateur versus le Matheux

## L'Expérimentateur :

- 1 Réaliser  $m$  expériences
- 2 Répartition des  $\widehat{\mu}^\bullet(y_{[j]}^\bullet)$  représentées par  $m$  briques de surface  $1/m$  et de largeur  $1/n$  empilées l'une après l'autre en les centrant en abscisse en leur valeur. )


## Le Matheux :

- 3 Je le savais à l'avance pour  $m \rightarrow +\infty$
- 4  $\widehat{\mu}^\bullet(Y^\bullet) \overset{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(\mu^\bullet, \frac{\sigma^\bullet}{\sqrt{n}})$




# Réalisation d'une future estimation par l'**Expérimentateur**

j	$\widehat{\mu^\bullet}(y^\bullet_j)$
⋮	⋮
4150	14.4%
4151	17.2%
4152	15%
4153	14.9%
4154	13.7%
4155	15.8%
4156	14.6%
⋮	⋮




# Réalisation d'une future estimation par l'**Expérimentateur**

j	$\widehat{\mu^\bullet}(y^\bullet_j)$
⋮	⋮
2105	15.3%
2106	14.1%
2107	13.2%
2108	15.5%
2109	16.7%
2110	15.5%
2111	14.5%
⋮	⋮




# Réalisation d'une future estimation par l'**Expérimentateur**

j	$\widehat{\mu^\bullet}(y^\bullet_j)$
⋮	⋮
3728	14.9%
3729	14.4%
3730	14.8%
<b>3731</b>	<b>13.4%</b>
3732	14.9%
3733	14.4%
3734	16.4%
⋮	⋮



# Réalisation d'une future estimation par le **Matheux**


j	$\widehat{\mu^\bullet}(y_{[j]}^\bullet)$
⋮	⋮
4150	14.4%
4151	17.2%
4152	15%
4153	14.9%
4154	13.7%
4155	15.8%
4156	14.6%
⋮	⋮






# Réalisation d'une future estimation par le **Matheux**

j	$\widehat{\mu^\bullet}(y^\bullet_j)$
⋮	⋮
2105	15.3%
2106	14.1%
2107	13.2%
2108	15.5%
2109	16.7%
2110	15.5%
2111	14.5%
⋮	⋮



# Réalisation d'une future estimation par le **Matheux**

j	$\widehat{\mu^\bullet}(y_{[j]}^\bullet)$
⋮	⋮
3728	14.9%
3729	14.4%
3730	14.8%
<b>3731</b>	<b>13.4%</b>
3732	14.9%
3733	14.4%
3734	16.4%
⋮	⋮



# Comment l'industriel doit-il utiliser ces informations ?

## Réalisation d'une future estimation

- L'industriel s' imagine être le **jour J** dans la situation où  $\mu^\bullet = 0.15$  (juste pas le marché)

# Comment l'industriel doit-il utiliser ces informations ?

## Réalisation d'une future estimation

- L'industriel s'imagine être le **jour J** dans la situation où  $\mu^\bullet = 0.15$  (juste pas le marché)
- Il prend alors conscience que ce qui peut lui arriver **le jour J**, c'est équivalent (ou presque) à :

# Comment l'industriel doit-il utiliser ces informations ?

## Réalisation d'une future estimation

- L'industriel s'imagine être le **jour J** dans la situation où  $\mu^\bullet = 0.15$  (juste pas le marché)
- Il prend alors conscience que ce qui peut lui arriver **le jour J**, c'est équivalent (ou presque) à :
  - ❶ Choisir au hasard une brique (i.e un  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{y}_{[J]})$  parmi les  $m$ )

# Comment l'industriel doit-il utiliser ces informations ?

## Réalisation d'une future estimation

- L'industriel s'imagine être le **jour J** dans la situation où  $\mu^\bullet = 0.15$  (juste pas le marché)
- Il prend alors conscience que ce qui peut lui arriver **le jour J**, c'est équivalent (ou presque) à :
  - ① Choisir au hasard une brique (i.e un  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{y}_{[j]})$  parmi les  $m$ )
  - ② Choisir au hasard un point sous la "courbe  $\mathcal{N}(\mu^\bullet, \frac{\sigma_\bullet}{\sqrt{n}})$ " associé à son abscisse représentant une réalisation au hasard de  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y})$  choisie parmi une infinité.


# Comment l'industriel doit-il utiliser ces informations ?

## Réalisation d'une future estimation

- L'industriel s'imagine être le **jour J** dans la situation où  $\mu^\bullet = 0.15$  (juste pas le marché)
  - Il prend alors conscience que ce qui peut lui arriver **le jour J**, c'est équivalent (ou presque) à :
    - ① Choisir au hasard une brique (i.e un  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{y}_{[j]})$  parmi les  $m$ )
    - ② Choisir au hasard un point sous la "courbe  $\mathcal{N}(\mu^\bullet, \frac{\sigma^\bullet}{\sqrt{n}})$ " associé à son abscisse représentant une réalisation au hasard de  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y})$  choisie parmi une infinité.
- ⇒ Il voit clairement la "courbe  $\mathcal{N}(\mu^\bullet, \frac{\sigma^\bullet}{\sqrt{n}})$ " comme un empilement d'une infinité de briques ("devenues des points") associées à une infinité de réalisations possibles de  $\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y})$ .

## Produit A : Risque 1ère espèce


$$\begin{aligned} & \left( \widehat{p^A} \left( \mathbf{y}_{[.]}^A \right) > 16.9\% \right) = \text{Prop. des } \left( \widehat{p^A} \left( \mathbf{y}_{[.]}^A \right) \right)_{10000} \text{ supérieurs à } 16.9\% \\ & = \frac{1}{m} \times \left( \text{Nb des } \left( \widehat{p^A} \left( \mathbf{y}_{[.]}^A \right) \right)_m \text{ supérieurs à } 16.9\% \right) \\ & = \text{Surface des } \mathbf{briques} \text{ associées aux } \left( \widehat{p^A} \left( \mathbf{y}_{[.]}^A \right) \right)_m \text{ supérieurs à } 16.9\% \end{aligned}$$






## Produit A : Risque 1ère espèce

$$\begin{aligned} P(\widehat{p^A}(\mathbf{Y^A}) > 16.9\%) &= \overline{(\widehat{p^A}(\mathbf{y_{[.]^A}}) > 16.9\%)}_{\infty} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \times (\text{Nb des } (\widehat{p^A}(\mathbf{y_{[.]^A})) \text{ supérieurs à } 16.9\%}) \\ &\simeq \text{Surface des } \mathbf{points} \text{ associés aux } (\widehat{p^A}(\mathbf{y_{[.]^A})) \text{ supérieurs à } 16.9\%} \end{aligned}$$



## Produit A : Risque 1ère espèce

$$\begin{aligned} P(\widehat{p^A}(\mathbf{Y^A}) > 16.9\%) &\simeq \overline{\left(\widehat{p^A}(\mathbf{y}_{[.]}^A) > 16.9\%\right)_m} \\ &= \frac{1}{m} \times \left(\text{Nb des } \left(\widehat{p^A}(\mathbf{y}_{[.]}^A)\right)_m \text{ supérieurs à } 16.9\%\right) \\ &= \text{Surface des } \mathbf{briques} \text{ associées aux } \left(\widehat{p^A}(\mathbf{y}_{[.]}^A)\right)_m \text{ supérieurs à } 16.9\% \end{aligned}$$



# Plan


1 Approche Expérimentale des Probabilités

2 P-valeur

## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

Loi de  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(Y^D)$  sous  $H_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$




## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow \mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Décision** (au vu des  $n=50$  données) : Accepter  $\mathbf{H}_1$  si  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim,\alpha}^+$

**Question** : Conclure pour  $\alpha = 5\%$  ?

Loi de  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{Y}^D)$  sous  $\mathbf{H}_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$



$$\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{y}^D) \stackrel{R}{=} (\text{mean}(\mathbf{y}^D) - 4) / \text{seMean}(\mathbf{y}^D) = 2.045 > \delta_{lim,5\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qnorm}(.95) = 1.645$$


## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow \mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Décision** (au vu des  $n=50$  données) : Accepter  $\mathbf{H}_1$  si  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim,\alpha}^+$

**Question** : Conclure pour  $\alpha = 10\%$  ?

Loi de  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{Y}^D)$  sous  $\mathbf{H}_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$




## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow \mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Décision** (au vu des  $n=50$  données) : Accepter  $\mathbf{H}_1$  si  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim,\alpha}^+$

**Question** : Conclure pour  $\alpha = 1\%$  ?

Loi de  $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{Y}^D)$  sous  $\mathbf{H}_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$




$$\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{y}^D) \stackrel{R}{=} (\text{mean}(\mathbf{y}^D) - 4) / \text{seMean}(\mathbf{y}^D) = 2.045 > \delta_{lim,1\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qnorm}(.99) = 2.326$$

## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Question** : Quel est le plus petit  $\alpha$  (i.e. risque maximal de décider à tort  $H_1$ ) à encourir pour accepter  $H_1$  (i.e. l'assertion d'intérêt) au vu des  $n = 50$  données ?

Loi de  $\widehat{\delta_{\mu^D,4}}(Y^D)$  sous  $H_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$






## Exemple diététicien

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Réponse** : **p-valeur** = le plus petit **risque** maximal de décider à tort  $H_1$  à encourir **pour accepter  $H_1$**  (i.e. l'assertion d'intérêt).

Loi de  $\widehat{\delta_{\mu^D,4}}(Y^D)$  sous  $H_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$




$$\text{p-valeur(droite)} \stackrel{R}{=} 1 - \text{pnorm}((\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD)) = 2.04\%$$

## Exemple diététicien (fin)

**Assertion d'intérêt** : Le régime permet une perte de poids de 2 kilos par semaine  $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D > 4$  (en 2 semaines)

**Décision** (au vu des  $n=50$  données) : Accepter  $H_1$  si **p – valeur**  $< \alpha$   
i.e. si **le risque pour accepter  $H_1$**  est **raisonnablement petit**

Loi de  $\widehat{\delta_{\mu^D,4}}(Y^D)$  sous  $H_0 : \mu^D = 4 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D,4} = 0$



$$\text{p-valeur(droite)} \stackrel{R}{=} 1 - \text{pnorm}((\text{mean}(y^D) - 4) / \text{seMean}(y^D)) = 2.04\% < \alpha = 5\%$$