




만성콩팥병 환자 찾기 및 확진하기



*녹색: 낮은 위험(신장 질환의 다른 표지자가 없는 경우 CKD 없음), 노란색: 중등도 위험 증가, 주황색: 높은 위험, 빨간색: 매우 높은 위험
[출처: KDIGO. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. 2013.]

원인 질환의 진단

†위양성 결과 배제 및 만성 여부의 확인을 위한 *알부민뇨: 요 알부민/크레아티닌 비(ACR, albumin creatinine ratio)
※ 알부민뇨: 1일 알부민 배출량 30 mg 초과 또는 요 알부민/크레아티닌 비 30mg/g Cr 초과

만성콩팥병 단계에 따른 검사 종목별 추적 관찰 권고 간격*

만성콩팥병 단계	혈액검사 (사구체여과율, 혈색소, 이상지질혈증** 검사)	요 알부민/크레아티닌 비 (ACR)	iPTH	칼슘, 인
1, 2단계	매년	매년	-	-
3단계	3-6개월	3-6개월	12개월	6-12개월
4단계	1-3개월	1-3개월	6-12개월	3-6개월

* 환자의 동반질환 혹은 개별 상태에 따라 추적 관찰 기간이 단축될 수도 있음.

** 공복 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방



신장내과 전문의 진료 의뢰 기준

- 사구체여과율 30 mL/min/1.73m² 미만으로 저하되는 경우
- 다음의 경우에는 만성 콩팥병 단계와 관계없이 신장내과 전문의의 진료를 권고한다.
 - ① 지속적인 단백뇨(> 0.5 g/24시간 혹은 요 단백/크레아티닌 비(PCR) > 500 mg/g)
 - ② 현미경 혈뇨와 콩팥 기능 저하(eGFR < 60 mL/min/1.73m²) 혹은 단백뇨(> 0.5 g/24시간)가 동반된 경우
 - ③ 욕안적 혈뇨
 - ④ 전신 질환 혹은 유전 질환이 의심되는 경우
 - ⑤ 산염기 대사 및 전해질 이상
 - ⑥ 급성신손상이나 급격하게 사구체여과율이 감소할 때

콩팥 기능에 따른 약물 용량 조절

- 콩팥으로 배설되는 약제들은 콩팥 기능이 감소한 경우 약물이 축적되어 약물 부작용이 발생할 가능성이 있으므로 주의하여야 한다.
- 일차 의료기관에서 용량 조절에 주의하여야 할 약은 혈압약 가운데 레닌-안지오텐신 시스템(RAS) 억제제, 알도스테론 억제제와 당뇨약 가운데 sulfonylurea와 metformin이다.

만성콩팥병 환자에게 투여 시 주의를 요하는 대표적인 콩팥 독성 약제

구분	약제명
진통해열제	비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs), 고용량의 aspirin
항생제	aminoglycosides, amphotericin B, cephalosporins, penicillins, beta-lactamase inhibitors, quinolones, rifampin, sulfonamides, vancomycin
항바이러스제	acyclovir, adefovir, ganciclovir, atazanavir, indinavir, tenofovir
Bisphosphonates	pamidronate, zoledronic acid
Calcineurin억제제	cyclosporine, tacrolimus
항암제	alkylating agents, cisplatin, methotrexate, mitomycin, interferon-alpha, proteasome inhibitors, vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitors, checkpoint inhibitors
CT 및 혈관촬영 시 사용되는 요오드화 조영제	CT 조영제(iodine contrast agent)
이뇨제	loop diuretic, thiazides, triamterene
Proton pump inhibitors	dexlansoprazole, esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole
기타 약제들	allopurinol, gold sodium thiomalate, lithium, quinine, sodium phosphate
한약제	aristolochic acid, cats claw, licorice root