

# MAT02025 - Amostragem 1

Conceitos básicos de probabilidade e inferência estatística: uma  
revisão

Rodrigo Citton P. dos Reis  
citton.padilha@ufrgs.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Porto Alegre, 2023

# População e amostra, estatística, parâmetro, estimador, estimativa e distribuição amostral

# População

## População ou universo

Esse termo é usado em estatística com um sentido bem mais amplo do que na linguagem coloquial.

É entendido aqui como o **conjunto de todos os elementos** que apresentam uma ou mais características **em comum**.

- ▶ **Exemplo 1:** a população de colegiais de oito anos de Belo Horizonte.
  - ▶ Estes colegiais têm em comum a idade e o local onde vivem.
- ▶ **Exemplo 2:** a população de indústrias brasileiras.
  - ▶ Estas indústrias têm em comum o fato de que foram criadas no Brasil.

## Censo e amostra

- ▶ Quando o estudo é realizado com toda a população de interesse, chamemos este estudo de **censo**.
- ▶ Por motivos de tempo, custo, logística, entre outros, geralmente não é possível realizar um censo.
  - ▶ Nestes casos, estudamos apenas uma parcela da população, que chamamos de **amostra**.


### Amostra

É qualquer fração de uma população.


## Inferência estatística

- ▶ A **Inferência Estatística** é um conjunto de técnicas que objetiva estudar a população por meio de evidências fornecidas por uma amostra.
- ▶ É a amostra que contém os elementos que podem ser observados e, a partir daí, **quantidades de interesse** podem ser medidas.


# População e amostras



# População e amostras



# População e amostras





## Uma questão . . .

- ▶ Uma questão que surge agora é: apesar de diferentes, podemos ter respostas próximas ou iguais nas diversas amostras?
  - ▶ A resposta é afirmativa e estará subjacente às ideias que desenvolvermos a partir desta aula.
- ▶ Podemos dizer que devido à **natureza aleatória**, geralmente envolvida no procedimento amostral, não podemos garantir que repetições de amostras produzam sempre resultados idênticos.
  - ▶ Assim, **todas as quantidades associadas à amostra terão caráter aleatório** e, portanto, devem receber tratamento probabilístico.
- ▶ Nesta aula, formalizaremos alguns conceitos relacionados a um ramo da Inferência Estatística denominado **estimação**.
  - ▶ Estudaremos combinações dos valores de amostras aleatórias, objetivando a obtenção de informações a respeito de características de interesse na população.
- ▶ **Notação:** vamos representar uma amostra de tamanho  $n$ , a ser retirada da população, por  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

# Parâmetro

## Definição

As quantidades da população, em geral desconhecidas, sobre as quais temos interesse, são denominadas **parâmetros** e, usualmente, representadas por letras gregas  $\theta$ ,  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\lambda$ , entre outras.

## Parâmetro

### Exemplos

- ▶ a média de idade dos estudantes da UFRGS.
- ▶ a média de altura da população de Porto Alegre.
- ▶ a probabilidade de uma lâmpada ser produzida de maneira defeituosa em uma certa linha de fabricação.
- ▶ a média de peso de pacotes de queijo ralado.

## Estimador e estimativa

### Definição

A combinação dos elementos da amostra, construída com a finalidade de representar, ou estimar, um parâmetro de interesse na população, denominamos **estimador**. Em geral, denotamos os estimadores por símbolos com o acento circunflexo:  $\hat{\theta}$ ,  $\hat{\mu}$ ,  $\hat{\sigma}$ , etc. Aos valores numéricos assumidos pelos estimadores denominamos **estimativas pontuais** ou simplesmente **estimativas**.

## Estimador e estimativa

### Exemplos de estimadores

- ▶  $\hat{\mu}_1 = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ , a **média amostral**, é um **estimador** para a média populacional.
- ▶  $\hat{\mu}_2 = X_1$ , a **primeira observação da amostra**, é um **estimador** para a média populacional.
- ▶  $\hat{\mu}_3 = \frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ , a **média aritmética entre o valor mínimo ( $X_{(1)}$ ) e o valor máximo ( $X_{(n)}$ ) da amostra**, é um **estimador** para a média populacional.
- ▶  $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$  é um **estimador** para a variância populacional (este é chamado de **estimador “natural”** da variância populacional).
- ▶  $\hat{\sigma}_2^2 = S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$  é um **estimador** para a variância populacional (este estimador é chamado de **variância amostral**).

## Estimador e estimativa

### Exemplos de estimativas

Suponha que a seguinte amostra de altura de pessoas (em metros) foi observada (1,65; 1,57; 1,72; 1,66; 1,71). Considerando os estimadores do exemplo anterior, temos as seguintes **estimativas**:

$$\blacktriangleright \hat{\mu}_1 = \frac{1,65+1,57+1,72+1,66+1,71}{5} = 1,662.$$

$$\blacktriangleright \hat{\mu}_2 = 1,65.$$

$$\blacktriangleright \hat{\mu}_3 = \frac{1,57+1,72}{2} = 1,645.$$

$$\blacktriangleright \hat{\sigma}_1^2 = \frac{(1,65-1,662)^2+(1,57-1,662)^2+(1,72-1,662)^2+(1,66-1,662)^2+(1,71-1,662)^2}{5} \approx 0,0029.$$

$$\blacktriangleright \hat{\sigma}_2^2 = \frac{(1,65-1,662)^2+(1,57-1,662)^2+(1,72-1,662)^2+(1,66-1,662)^2+(1,71-1,662)^2}{4} \approx 0,0036.$$

## Estimador e estimativa

- ▶ Notamos que um estimador, digamos  $\hat{\theta}$ , é uma **função das variáveis aleatórias** constituintes da amostra. Logo, um estimador **também é uma variável aleatória**.
- ▶ A correspondente distribuição de probabilidade formará a base das argumentações probabilísticas utilizadas na extrapolação da informação da amostra para os parâmetros da população.
- ▶ Diferentes amostras (observações diferentes e/ou diferentes tamanhos) produzirão diferentes estimativas para o mesmo parâmetro.
  - ▶ **Amostra 1:** (1,65; 1,57; 1,72; 1,66; 1,71)
    - ▶  $\hat{\mu}_1^1 = \bar{X}_5 = 1,662$ .
  - ▶ **Amostra 2:** (1,78; 1,63; 1,82; 1,54; 1,78)
    - ▶  $\hat{\mu}_1^2 = \bar{X}_5 = 1,71$ .
  - ▶ **Amostra 3:** (1,78; 1,63; 1,82; 1,54; 1,78; 1,72; 1,66; 1,71)
    - ▶  $\hat{\mu}_1^3 = \bar{X}_8 = 1,705$ .

## Propriedades dos estimadores

- ▶ Vimos nos exemplos anteriores que **mais de uma** função da amostra pode ser proposta para estimar um parâmetro de interesse.
- ▶ Para facilitar a escolha entre tais estimadores, torna-se importante verificar se possuem algumas **propriedades** que serão definidas a seguir.

### Vício

Um estimador  $\hat{\theta}$  é **não viciado** ou **não viesado** para um parâmetro  $\theta$  se




$$E[\hat{\theta}] = \theta.$$

Em outras palavras, um estimador é não viciado se o seu valor esperado coincide com o parâmetro de interesse.



## Propriedades dos estimadores

- Implícita à definição de **vício**, está a ideia de podermos retirar diversas amostras da população de interesse.
- Na figura abaixo, os estimadores  $\hat{\theta}_1$  e  $\hat{\theta}_2$  são não viciados para  $\theta$ , enquanto que  $\hat{\theta}_3$  é um estimador viciado para  $\theta$ .



## Distribuições amostrais

- ▶ Vimos que estimadores são funções de variáveis aleatórias e, portanto, eles também são variáveis aleatórias.
- ▶ Neste momento, vamos estudar a distribuição de probabilidade de alguns dos estimadores mais utilizados.
  - ▶ As distribuições de probabilidade de estimadores são chamadas **distribuições amostrais**.
- ▶ A partir das distribuições amostrais descreveremos a incerteza com respeito às nossas estimativas.
- ▶ Devido às suas propriedades (ausência de viés, consistência e eficiência), foco será dado aos estimadores  $\bar{X}_n$  para a média populacional e  $S^2$  para a variância populacional.

## Distribuições amostrais

- ▶ Consideremos, inicialmente, o caso em que conseguimos calcular facilmente a função de probabilidade dos estimadores de interesse.

### Exemplo

- ▶ Um jogo consiste em lançar uma moeda honesta 3 vezes.
- ▶ Para cada lançamento, se sair cara você **ganha** um ponto, caso saia coroa, você **perde** um ponto.
  - ▶ Podemos modelar essa situação através de uma variável  $X$  que, em uma população, pode assumir os valores  $-1$  e  $1$ , com probabilidades iguais.

$x$	$-1$	$1$
$\Pr(X = x)$	$1/2$	$1/2$

## Distribuições amostrais

- ▶ Se observarmos a amostra  $(-1, 1, -1)$ , temos

$$\bar{x} = \frac{-1 + 1 - 1}{3} = -1/3;$$

$$s^2 = \frac{(-1 - (-1/3))^2 + (1 - (-1/3))^2 + (-1 - (-1/3))^2}{(3 - 1)} = 4/3$$

- ▶ Se considerarmos outra amostra  $(-1, 1, 1)$ , temos

$$\bar{x} = \frac{-1 + 1 + 1}{3} = 1/3;$$

$$s^2 = \frac{(-1 - 1/3)^2 + (1 - 1/3)^2 + (1 - 1/3)^2}{(3 - 1)} = 4/3$$

## Distribuições amostrais

- Assim, considerando todas as possíveis amostras, teríamos a seguinte tabela:

$(X_1, X_2, X_3)$	probabilidade	$\bar{X}$	$S^2$
$(-1, -1, -1)$	$1/8$	$-1$	$0$
$(-1, -1, +1)$	$1/8$	$-1/3$	$4/3$
$(-1, +1, -1)$	$1/8$	$-1/3$	$4/3$
$(-1, +1, +1)$	$1/8$	$1/3$	$4/3$
$(+1, -1, -1)$	$1/8$	$-1/3$	$4/3$
$(+1, -1, +1)$	$1/8$	$1/3$	$4/3$
$(+1, +1, -1)$	$1/8$	$1/3$	$4/3$
$(+1, +1, +1)$	$1/8$	$1$	$0$

## Distribuições amostrais

- Com base na tabela anterior, podemos construir as distribuições amostrais de  $\bar{X}$  e  $S^2$ :

$\bar{x}$	-1	-1/3	1/3	1
$\Pr(\bar{X} = \bar{x})$	1/8	3/8	3/8	1/8

e

$s^2$	0	4/3
$\Pr(S^2 = s^2)$	1/4	3/4

## Distribuições amostrais

► Ainda,

$$E[\bar{X}] = (-1) \times 1/8 + (-1/3) \times 3/8 + 1/3 \times 3/8 + 1 \times 1/8 = 0$$

e

$$E[S^2] = 0 \times 1/4 + 4/3 \times 3/4 = 1$$

como já esperado, pois  $\bar{X}$  e  $S^2$  são **não viciados** para a média e variância populacional, respectivamente.

## Para casa

- ▶ Revisar os tópicos discutidos nesta aula.
  - ▶ Ler os capítulos 5, 6, 10 e 11 do Livro “Estatística Básica”<sup>1</sup> (disponível no Sabi+).

---

<sup>1</sup>Morettin, P. A. e Bussab, W. O. **Estatística Básica**, Saraiva, 2010.



# Próxima aula

- ▶ Introdução ao delineamento de pesquisa.

# Por hoje é só!

Bons estudos!

