

MAT02035 - Modelos para dados correlacionados

Introdução aos dados longitudinais e agrupados

Rodrigo Citton P. dos Reis citton.padilha@ufrgs.br Porto Alegre, 2019

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Instituto de Matemática e Estatística Departamento de Estatística

A pesquisa estatística em métodos para o delineamento e análise de investigações humanas expandiu explosivamente na segunda metade do século 20.

- Nos EUA (métada do século 20): mudança de suporte de pesquisa da área militar para a área biomédica.
- Nos EUA (1944): aprovação da Lei do Serviço de Saúde Pública ⇒ crescimento do National Institutes of Health (NIH¹).
 - Orçamento do NIH: 1947 \$8 milhões $\Rightarrow 1966$ \$1 bilhão.

¹Um pouco da história do NIH: www.nih.gov/about-nih/who-we-are/history

- O NIH patrocinou vários dos estudos epidemiológicos importantes e ensaios clínicos daquele período, incluindo o *Framingham Heart Study*² (FHS).
- O foco destes primeiros estudos foi a morbidade e, especialmente, a mortalidade.
 - Pesquisadores procuravam identificar as causas da morte prematura e avaliar a efetividade dos tratamentos para atrasar a morte morbidade.
 - Regressão logística (1960s).
 - A análise de dados de tempo até o evento foi revolucionada pelo artigo de 1972 de D. R. Cox³, descrevendo modelo de riscos proporcionais⁴.

²Um pouco da história do NIH: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4159698/

³Reid, N. A Conversation with Sir David Cox. Statistical Science, 9:439-455, 1994.

⁴Leituras para o fim do dia: Cox, D. R. Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B*, 34:187-220, 1972.

- Embora o delineamento do FHS exigisse a medição periódica das características do paciente, consideradas determinantes de doenças crônicas, o interesse pelos níveis e padrões de mudança dessas características ao longo do tempo foi inicialmente limitado.
- Com avanços da pesquisa, investigadores começaram a fazer perguntas sobre o comportamento desses fatores de risco.
 - No FHS os pesquisadores começaram a perguntar se os níveis de pressão arterial na infância eram preditivos de hipertensão na vida adulta.
 - No Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study⁵, os investigadores procuraram identificar os determinantes da transição do estado normotenso⁶ ou normocolesterolêmico⁷ no início da vida adulta para hipertensão e hipercolesterolemia na meia-idade.

⁵Friedman, G. D *et al.* CARDIA: study design, recruitment, and some characteristics of the examined subjects. *Journal of Clinical Epidemiology*, 41:1105-1116, 1988.

⁶"pressão arterial normal"

^{7&}quot;colesterol normal"

- No tratamento de artrite, asma e outras doenças que normalmente não ameaçam a vida, os pesquisadores começaram a estudar os efeitos dos tratamentos na mudança ao longo do tempo em medidas de gravidade da doença.
 - Questões semelhantes estavam sendo colocadas em todos os contextos de doenças.
- Os pesquisadores começaram a acompanhar populações de todas as idades ao longo do tempo, tanto em estudos observacionais quanto em ensaios clínicos, para entender o desenvolvimento e a persistência da doença e para identificar fatores que alteram o curso do desenvolvimento da doença.

 Esse interesse nos padrões temporais de mudança nas características humanas ocorreu em um período em que os avanços no poder da computação tornaram novas e mais intensivas abordagens computacionais para a análise estatística disponíveis no desktop.



- Laird e Ware propuseram o uso do algoritmo EM para ajustar uma classe de modelos lineares de efeitos mistos apropriados para a análise de medidas repetidas⁸;
- Mais tarde na década, Liang e Zeger introduziram as equações de estimativas generalizadas na literatura bioestatística e propuseram uma família de modelos lineares generalizados para ajustar observações repetidas de dados binários e contados^{9,10}.

⁸Laird, N. M., Ware, J. H. Random-effects models for longitudinal data. *Biometrics*, 38:963-974, 1982.

 $^{^9}$ Liang, K. Y., Zeger, S. L. Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73:13-22, 1986.


¹⁰Zeger, S. L., Liang, K. Y. Longitudinal Data Analysis for Discrete and Continuous Outcomes. *Biometrics*, 42:121-130, 1986.

- Muitos outros pesquisadores que escrevem na literatura biomédica, educacional e psicométrica contribuíram para o rápido desenvolvimento de metodologia para a análise desses dados "longitudinais".
- Os últimos 40 anos assistiram a progressos consideráveis no desenvolvimento de métodos estatísticos para a análise de dados longitudinais.
- Este curso apresentará parte desta literatura de maneira rigorosa apontando para as possibilidades de aplicação destas técnicas.

Dados longitudinais e agrupados

Estudos longitudinais


A característica definidora de estudos longitudinais é que medidas dos mesmos indivíduos são tomadas **repetidamente** através do tempo, assim permitindo o estudo direto da **mudança com o tempo**.



Estudos longitudinais vs. estudos transversais

- Com medidas repetidas nos indivíduos, é possível capturar a mudança dentro de indivíduo.
- Em um estudo transversal, em que a resposta é medida em apenas uma ocasião, é possível apenas estimar diferenças nas respostas entre indivíduos.
 - Permite comparações entre subpopulações que diferem em idade, mas não fornece qualquer informação a respeito de como os indivíduos mudam durante o correspondente período.

Estudos longitudinais vs. estudos transversais



Exemplos

Modelos de regressão para re-

spostas correlacionadas

Por hoje é só! Sejam todos bem-vindos!

