

Gembris Probeklausur (2023)

$$\textcircled{1} a) x(t) = \sin(20\pi t) + \cos(40\pi t)$$
$$x[k] = \sin\left(\frac{\pi}{5}k\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{5}k\right)$$

Ansatz: Summandenweises Argumentvergleich.

→ Für eine Abtastung gilt:

$$A\{x(t)\} = x(t) \cdot T_A \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_A)$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_A \cdot x(kT_A) \delta(t - kT_A)$$

Multiplication d. Eingangssignals $x(t)$ mit Dirac-Kamm

→ Wir untersuchen die einzelnen Summanden:

$$x_1(t) = \sin(20\pi t)$$

$$\Rightarrow A\{x_1(t)\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T_A \cdot \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) = x_1[k], \quad k \in \mathbb{Z}$$

→ Argumentvergleich im Sinus, um Abtastperiode T_A zu finden, durch Herausgreifen eines k :

$$A\{x_1(t)\} = \sum_{k=-\infty}^0 T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A)}_{= A\{x_1(t)\}} + \sum_{k=2}^{\infty} T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A)$$

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = T_A \sin(kT_A) \delta(t - kT_A) \quad | \quad k=1 \text{ einsetzen}$$

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = T_A \sin(T_A) \delta(t - T_A)$$

$\neq 0, \text{ wenn } t = T_A$

→ Argumentvergleich:

$$A_{k=1}\{x_1(t)\} = x_1[1]$$

$$T_A \sin(T_A) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \Rightarrow \sin(20\pi T_A) = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$$

$\text{weil } A_{k=1}\{x_1(t)\} = x_1(t=T_A)$

$$20\pi T_A = \frac{\pi}{5} \Leftrightarrow T_A = \frac{1}{100} \text{ s}$$

→ Überprüfen per analogem Argumentvergleich für 2. Summanden:

$$\cos(40\pi T_A) = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

$$\Leftrightarrow 40\pi T_A = \frac{2\pi}{5} \Leftrightarrow T_A = \frac{1}{100} \text{ s} \quad \square$$

A: T_A beträgt $\frac{1}{100} \text{ s}$.

b)

$$x_{\text{alternativ}}(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_A)$$

② Nach Nyquist-Shannon muss die Abtastfrequenz f_A doppelt so groß wie die Grundfrequenz f_0 des Signals sein:

$$f_A \geq 2f_0, \text{ mit } f_A = \frac{1}{T_A} \quad \text{u.} \quad f_0 = \frac{1}{T_p}$$

→ Allgemein gilt für Sinussignale:

$$u(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

→ f_0 per Argumentvergleich finden:

$$u(t) = x_n(t)$$

$$\sin(2\pi f_0 t) = \sin(138\pi t)$$

$$2\pi f_0 t = 138\pi t \quad | : 2\pi t$$

$$f_0 = 33 \text{ Hz} \Rightarrow f_A \geq 138 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_A} \geq 138 \text{ Hz}$$

$$\Leftrightarrow T_{A1} \leq \frac{1}{138} \text{ s}$$

$$\frac{1}{400} \geq \frac{1}{138} \quad \nabla \text{ Abtasttheorem nicht eingehalten, es gibt Aliasing.}$$

→ Weiterhin:

$$u(t) = x_2(t)$$

$$\sin(2\pi f_0 t) = \sin(4000\pi t)$$

$$2\pi f_0 t = 4000\pi t$$

$$f_0 = 2000 \text{ Hz} \Rightarrow f_A = 4000 \text{ Hz}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_{A2}} \geq 4000$$

$$T_{A2} \geq \frac{1}{4000} \text{ s}$$

$$\frac{1}{1500} \text{ s} \geq \frac{1}{4000} \text{ s} \quad \text{w. A.} \Rightarrow \text{NSA eingehalten, kein Aliasing}$$