




ISRAEL, NETANYA

Tel. 09-8609310, Fax. 09-8609311

טיפול נמרץ כללי, קרית צאנז, נתניה 42150

09-8609310

Email: mshapiro@laniado.org.il

בס"ד

Septrin I.V. (Sulphamethoxazole + trimethoprim)

1. אינדיקציות: זיהום בקטריאלי בהתאם לרגישות.
2. מינון: 1 או 2 אמפולות פעמיים ביום דרך הוריד, גם ניתן לתת-טבליות דרך הפה או דרך הזונדה. יש להוריד מינון עם תפקוד כליות לא תקין.
3. הכנה ומתן: ניתן לדלל את Septrin בשל אחת מהתמיסות האלו:

D₅W or D₁₀W
NaCl 0.9 %
Ringer's Lactate
Standard

יש להוסיף אמפולה אחת (5 ml) של Septrin ל- 125 ml
שתי אמפולות (10 ml) של Septrin ל- 250 ml
שלוש אמפולות (15 ml) של Septrin ל- 500 ml
במידה ונדרש ריכוז גבוה יותר של Septrin, או במקרים של הגבלת נוזלים ניתן למהול אמפולה אחת (5ml) ב- 75ml של D₅W. זמן הזלפת העירוי צריך להיות בין שעה לשעה וחצי.

4. תופעות לוואי: בחילות, הקאות, פריחה, neutropenia, נזק כבדי (nephrotoxic), thrombocytopenia, שלשולים, נזק כליתי (nephrotoxic).

שירות מוריס
מחלקה פנימית
ד"ר. 26072 נתניה



ISRAEL, NETANYA

Tel. 09-8609310, Fax. 09-8609311

טיפול נמרץ כללי, קרית צאנו, נתניה 42150

09-8609310

Email: mshapiro@laniado.org.il

כס"ד

Septtrin I.V. (Sulphamethoxazole + trimethoprim)

1. אינדיקציות: זיהום בקטריאלי בהתאם לרגישיות.
2. מינון: 1 או 2 אמפולות פעמיים ביום דרך הוריד, גם ניתן לתת-טבליות דרך הפה או דרך הזונדה. יש להוריד מינון עם תפקוד כליות לא תקין.
3. הכנה ומתן: ניתן לדלל את Septtrin בשל אחת מהתמיסות האלו:

D₅W or D₁₀W
NaCl 0.9 %
Ringer's Lactate
Standard

יש להוסיף אמפולה אחת (5 ml) של Septtrin ל- 125 ml
שתי אמפולות (10 ml) של Septtrin ל- 250 ml
שלוש אמפולות (15 ml) של Septtrin ל- 500 ml
במידה וגדרש ריכוז גבוה יותר של Septtrin, או במקרים של הגבלת נוזלים
ניתן למהול אמפולה אחת (5 ml) ב- 75 ml של D₅W. זמן הזלפת העירוי
צריך להיות בין שעה לשעה וחצי.

4. תופעות לוואי: בחילות, הקאות, פריחה, neutropenia, נזק כבדי (nephrotoxic), thrombocytopenia, שלשולים, נזק כליתי (hepatotoxic).

שירותי מידע
מחלקת המידע
14.7.2007 26072