

טיפול גמרץ כללי

Zithromax 500mg
(Azithromycin)

• דילול ראשון Reconstitution

מוסיפים לפלקון 4.8ml Sterile water for Injection
ומקבלים 5ml של תמיסה.

Azithromycin 100mg/1ml

* התמיסה יציבה 24 שעות בטמפרטורה של 30°C

* אחרי דילול ראשון מכניסים את התמיסה 100mg/1ml Azithromycin בתוך אחת מן התמיסות הבאות:

Normal Saline (0.9% sodium chloride)

1/2 Normal Saline (0.45% sodium chloride)

5ml Dextrose in water

Lactated Ringers Solu

5% Dextrose in 1/2 Normal Saline

(0.45% sodium chloride) with 20 mEq KCl

5% Dextrose in Lactated Ringer's Solution

5% Dextrose in 1/3 Normal Saline (0.3 sodium chloride)

5% Dextrose in 1/2 Normal Saline (0.45% sodium chloride)

Normal - M in 5% Dextrose

Normal - R in 5% Dextrose

Final Infusion Solution
Concentration (mg/ml)
(הריכוז הסופי)

Amount of Diluent (ml)
(נפח המדלל)

1.0 mg/ml
2.0 mg/ml

500 ml
250 ml

* משך ההזלפה לא פחות מ- 60 דקות.
יש לשים לב לתופעות לוואי

- כאבי בטן, שלשולים ובחילה.
- תגובות אלרגיות bronchospasm (בסבירות נמוכה מאוד).

