

TÜRKİYE HUDUT ve SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TİFO AŞISI (TYPHİM VI) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

TİFO AŞISI (Typhim Vi) nedir ve ne için kullanılır?

Tifo Aşısı (Typhim Vi) yetişkinleri ve 2 yaşından büyük çocukları tifoya karşı korumada etkili olan kapsüller polisakkarid bir aşıdır. Aşının koruyuculuğu %50-80'dir.

Tifo, insan dışkıyla kirlenmiş sular ve yiyeceklerle bulaşan, ateş ve karın ağrısı ile kendini gösteren bulaşıcı ve tehlikeli bir barsak hastalığıdır. Hastalık etkeni olan *Salmonella typhi* adlı bakteri vücuda girdikten yaklaşık 7-15 gün sonra belirtiler ortaya çıkar. Tedavi edilmediği takdirde barsak delinmesi ve kanamalarına neden olabilir.

TİFO AŞISI'nın içeriğindeki maddeler nelerdir?

Tifo Aşısı sodyum (sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat) ve fenol içermektedir. Bu iki maddeye bağlı herhangi bir etki beklenmez.

TİFO AŞISI kimlere yapılmalıdır?

Tifo Aşısı özellikle salgın bölgelerine yolculuk edenler, göçmenler, sağlık çalışanları ve askeri personel için önerilir.

TİFO AŞISI nasıl uygulanır?

2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlerde 0,5 ml'lik tek bir doz kas içi veya derin cilt altı enjeksiyon olarak uygulanır.

Hastalığa maruz kalma riskinin sürmesi halinde yeniden aşılanma her 3 yılda bir gerçekleştirilmelidir.

TİFO AŞISI olmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TİFO AŞISI aşağıdaki durumlarda YAPILMAMALIDIR:

Eğer sizde veya çocuğunuzda; aşının içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerji varsa veya ateş, akut bir hastalık ya da ilerleyen kronik bir hastalık varsa aşılanma iyileşinceye kadar ertelenmeli, doktora danışılmadan aşı uygulanmamalıdır.

TİFO AŞISI aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ YAPILMALIDIR:

Bu aşının 2 yaşından küçük çocuklara yapılması uygun değildir. Aşı ile elde edilen etkinlik bu yaş grubu için yeterli olmayabilir.

Bağışıklık yanıtı zayıflamış kişilerde (hastalık veya tedavi nedeniyle) beklenen bağışıklık yanıtı elde edilemeyebilir. Mümkünse, bağışıklık baskılayıcı herhangi bir tedavinin tamamlanmasına veya hastalığın iyileşmesine kadar aşılanmanın ertelenmesi düşünülmelidir. Aşı, *Salmonella typhi* enfeksiyonu riskine karşı korur, ancak *Salmonella paratyphi* A veya B enfeksiyonları riskine karşı koruma sağlamaz.

Yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kas içine ya da cilt altına enjeksiyon yoluyla uygulandığından yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik ve Emzirme

Tifo Aşısı gerekli olmadıkça hamilelik döneminde yapılmamalıdır. Hastalığın ciddiyeti ve tifoya maruz kalma riskinin yüksek olduğu durumlarda hamilelik tifo aşısının uygulanmaması için bir sebep oluşturmaz. Aşı hamilelik sırasında yalnızca doktor tavsiyesiyle uygulanabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Tifo Aşısı emzirme döneminde yapılabilir.

Diğer aşılar ve başka ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tifo Aşısı diğer aşılarla (Hepatit A, sarıhumma, difteri, tetanoz, çocuk felci, kuduz, menenjit A + C ve hepatit B) birlikte aynı zamanda uygulanabilir. Ancak aşılar ayrı enjektörler kullanılarak ve farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmalıdır.

Bağışıklık sisteminin baskılayıcı tedavi, beklenen bağışıklık yanıtın elde edilememesine neden olabilir. Mümkünse bağışıklık sisteminin baskılayıcı tedavinin tamamlanmasına dek aşılanmanın ertelenmesi düşünülmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız veya son zamanlarda herhangi bir aşılanma yaptıysa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

TİFO AŞISININ olası yan etkiler nelerdir?

Tifo aşısının içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir. Tifo Aşısı ile aşılanma sonrasında bildirilen istenmeyen reaksiyonlar genelde hafif ve kısa sürelidir.

Yaygın: Ağrı, ödem, kızarıklık,

Seyrek: Ateş, halsizlik, kırıklık, genel olarak iyi hissetmeme (malazi), Uzun süreli baş ağrısı (sefalji) Kas ağrıları, eklem ağrıları, bulantı, karın bölgesinde ağrı

Çok seyrek: Alerjik reaksiyonlar (Kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker)

Nadir vakalarda: Serum hastalığı ve ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar)

Tifo aşısı uygulamasından önce, tifo hastalığı ve aşısı, uygulanma şekli, aşı sonrası oluşabilecek reaksiyonlar ve yan etkiler ile ilgili bilgileri gösteren metni okudum. Anlamakta güçlük çektiğim konularla ilgili olarak sorumlu hekime sorular sordum ve sorularıma yeterli ve anlayabileceğim kadar açık ve net cevaplar aldım. Tifo aşısı ile ilgili olarak gerek tıbbi uygulanma yollarının nasıl olacağı ve gerekse aşı olunduktan sonra oluşabilecek yan etkiler konusunda aydınlatılarak bilgilendirildim. Aşırı yaptırmadığım takdirde karşılaşılabileceğim tıbbi durumlar ve olası sonuçlar tarafıma anlatıldı. Tifo aşısı uygulanması ve olası yan etkileri konusunda aydınlatılarak bilgilendirildim, kendi rızamla aşılanmayı kabul ediyorum.

(Lütfen altı çizili bölüme kendi el yazınızla "Okudum ve anladım, tifo aşılanma ve yan etkiler konusunda aydınlatıldım, aşı yaptırmayı kabul ediyorum" ve adınızı-soyadınızı yazarak imzalayınız)

Adı - Soyadı :

T.C. Kimlik No :

İmza :

Tarih :/...../.....

Saat ::.....

Bilgilendiren Doktorun:

Adı - Soyadı :

İmza :

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SARIHUMMA AŞISI (STAMARIL) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

SARIHUMMA AŞISI nedir ve ne için kullanılır?

Sarihumma aşısı zayıflatılmış canlı bir virüs aşısıdır. **Sarihumma** akut viral bir hastalıktır. Sarihumma hastalığına Flaviviridae ailesinden pozitif iplikçikli tek dizili RNA virüsü olan arbovirüs neden olur. Afrika ve Güney Amerika'nın belirli bölgelerinde görülen, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan, ateş ve grip benzeri belirtilere, sarılığa, vücudun birçok bölümünde kanamalara, karaciğer, böbrek, solunum ve diğer organ yetmezliğine yol açabilen, ciddi vakalarda %20 - %50 oranında ölüme neden olabilen Sarihumma hastalığının önlenmesinde kullanılır. Hastalığın sarı olarak adlandırılmasının nedeni bazı hastalarda sarılık görülmesidir. Hastalığın belirtileri, sivrisinek ısırığından üç-altı gün sonra ortaya çıkar.

SARIHUMMA AŞISI'nın içeriğindeki maddeler nelerdir?

Sarihumma aşısı tavuk yumurtasında üretilir. **Yumurtaya, tavuk proteinlerine veya jelatin dahil** aşının herhangi bir bileşenine karşı ciddi alerjisi olan kişilere uygulanamaz. İçinde bulunan sodyum ve potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez. Aşı az miktarda sorbitol içerir. **Fruktoza karşı aşırı duyarlılığı (intoleransı) olan kişilere uygulanmamalıdır.**

SARIHUMMA AŞISI kimlere yapılmalıdır?

- ✓ Sarihummanın görüldüğü bölgelere seyahat edenler, bu bölgelerden geçenler veya bu bölgelerde yaşayanlar.
- ✓ Giriş için Uluslararası Aşı veya Profilaksi Sertifikası şart koşan herhangi bir ülkeye seyahat edenler.
- ✓ Laboratuvar personeli gibi bulaşıcı materyallerle çalışanlar.
- ✓ Seyahat Sağlığı Merkezlerinde aşı yapılarak Uluslararası Aşı veya Profilaksi Sertifikası düzenlenir. **Bu sertifika, aşının ilk dozunu izleyen 10. günden itibaren ömür boyu geçerlidir.**

SARIHUMMA AŞISI nasıl uygulanır?

Sarihumma aşısı, **tek doz olarak deri altına ya da kas içine** uygulanır ve ömür boyu koruyucudur. **Damar içine uygulanmaz.** Aşı, koruyuculuğunun başlaması için seyahatten **en az 10 gün önce** yapılmalıdır.

SARIHUMMA AŞISI olmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Sarihumma aşısının size veya çocuğunuza uygun olup olmadığına karar verebilmesi için aşağıda belirtilen hususlar hakkında doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir. Anlayamadığınız herhangi bir şey varsa, doktorunuza mutlaka sorunuz.

Aşağıdaki durumlarda uygulanmaz

- ✓ **Yumurtaya, tavuk proteinlerine veya aşı bileşenlerinden birisine karşı alerjiniz varsa veya daha önce canlı bir aşı uygulaması sonrasında ciddi bir reaksiyon gelişmişse,**
- ✓ **Bağışıklık sisteminizi zayıflatabilecek bir hastalık varsa veya tıbbi tedavi (örneğin steroid veya kemoterapi) gibi herhangi bir nedenden ötürü bağışıklık sisteminizi zayıflamışsa,**
- ✓ **Timus bezi ile ilgili probleminiz varsa veya herhangi bir nedenle timus beziniz alınmışsa veya Miyastenia Gravis, Di George Sendromu veya Timoma gibi bir timus rahatsızlığınız varsa,**
- ✓ **HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü-AIDS) ile enfekte olmuşsanız veya aktif bulgulara sahipseniz veya laboratuvar sonuçlarınız bağışıklık sisteminizin çok iyi çalışmadığını gösteriyorsa,**
- ✓ **Ateşli bir hastalığınız varsa,**
- ✓ **6 aydan daha küçük çocuksa,**
Sarihumma aşısı uygulanmamalıdır.

Dikkatli uygulanması gereken durumlar

- ✓ **Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, beyin ve sinirleri etkileyen veya Sarihumma hastalığının kendisine benzeyen ve vücut sistemlerinin çoğunu etkileyen yaygın belirtili bir hastalık da dâhil olmak üzere, Sarihumma aşısına ilişkin seyrek reaksiyonların oluşma riski daha yüksektir. Dolayısıyla Sarihumma aşısı, genelde 60 yaş üzerindeki kişilere, ancak ciddi anlamda hastalığa yakalanma riski varsa uygulanmalıdır.**
- ✓ **6 - 9 ay yaş aralığındaki çocuklarla seyahatten kaçınılmalı veya seyahatleri ertelenmelidir. Seyahat kaçınılmaz ise, yalnızca özel durumlarda ve geçerli resmi tavsiye çerçevesinde yapılabilir. Seyahat kaçınılmaz ise, bu yaş aralığı için aşı yalnızca özel durumlarda ve güncel resmi önermeler doğrultusunda yapılabilir.**
- ✓ **Eğer HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü-AIDS) ile enfekte olmuş ancak enfeksiyon nedeniyle aktif semptomlara sahip değilseniz, laboratuvar testlerinizin sonuçlarına göre doktorunuz yapıp yapılmamasına karar verecektir.**
- ✓ **Eğer herhangi bir kan hastalığınız [hemofili veya düşük trombosit (kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) seviyesi gibi] varsa veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç alıyorsanız, aşının kas içine değil de derialtı yoluyla enjekte edilmesi kaydıyla, Sarihumma aşısı verilebilir.**

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi

Aşının yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

Aşılanmanın gerekli olduğu durumlar dışında, **genelde hamile olan veya hamile olduğunu düşünen kadınlarda Sarihumma aşısı kullanılmamalıdır.** Bu nedenle gebe kadını aşılamaktan kaçınılmalı ve mümkünse aşılanmamış gebe kadınların seyahati doğum sonrasına ertelenmelidir. Gebe kadın hastalık riskinin çok yüksek olduğu bölgelere seyahat etmek zorundaysa, mutlaka aşılanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

Aşılanmanın gerekli olduğu durumlar dışında, genelde çocuk emziren kadınlara Sarıhumma aşısı kullanılmamalı, seyahatten kaçınılmalı veya seyahatlerini ertelenmelidirler.

Araç ve makine kullanımı

Aşının araç sürme ve makine kullanımı becerisi üzerinde bir etkisi beklenmemektedir.

Diğer aşılar ve başka ilaçlar ile birlikte kullanımı

Son zamanlarda bağışıklık sisteminizi zayıflatan herhangi bir tedavi gördüyseniz [Ör. Radyoterapi (kanserde ışın tedavisi), steroid, sitotoksik ilaçlar ile tedavi gibi] laboratuvar testleri bağışıklık sisteminizin düzeldiğini gösterene kadar Sarıhummaya karşı aşılanma ertelenmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılanma yapıldıysa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aşı olduktan sonraki 14 gün boyunca kan bağışı yapmayınız çünkü o süre içerisinde kan ürünleri aracılığıyla aşı virüsünü bulaştırma riski bulunmaktadır.

SARIHUMMA AŞISININ olası yan etkiler nelerdir?

Sarıhumma aşısı, her ilaç gibi, ciddi bir reaksiyona sebep olabilir. Ancak bir aşının ciddi bir zarar veya ölüme sebep olma riski son derece düşüktür.

Hafif Problemler:

- ✓ **Çok yaygın olanlar:** Sarıhumma aşısı, ateş ile aşının uygulandığı bölgede ağrı, sızı, kızarıklık, şişme, sertlik dahil aşı yeri reaksiyonları. Bu problemler 4 kişiden 1'inde meydana gelmektedir. Genellikle aşının uygulanmasından hemen sonra başlayıp bir hafta kadar devam edebilmektedir.
- ✓ **Yaygın:** Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı, bulantı, ishal, kusma, kas ağrıları.
- ✓ **Yaygın olmayan:** Karın ağrısı, eklem ağrıları, lenf bezlerinde ortaya çıkan şişkinlik, döküntü, kurdeşen.

Ciddi Problemler:

- ✓ **Aşının bileşenlerinden birine karşı alerjik ödem (Anjiyoödem)** dahil ciddi alerjik reaksiyon (yaklaşık 55.000'de 1 kişi).
- ✓ **Ciddi sinir sistemi reaksiyonu** (yaklaşık 125.000'de 1 kişi). Sarıhumma aşılama sonrasında ölümcül sonuçları da olabilen aşıya bağlı sinir sistemi hastalığı (YEL-AND olarak bilinen) bildirilmiştir. **YEL-AND;** yüksek ateş ve baş ağrısı ile kendini gösteren ve şaşkınlık, uyuklama, beyinsel bozukluklar (ensefalit, ensefalopati) ve beyin zarı iltihabı durumlarından birinin veya daha fazlasının eşlik ettiği bir şekilde ilerleyebilen bir klinik durumdur.
- ✓ **Ateşli veya ateşsiz baygınlık hali** (Konvülsiyon), belirli odaklarda sinirsel yetmezlik ve kas zafiyeti (Guillain-Barre sendromu) dâhil olmak üzere diğer sinir sistemi belirtileri ve semptomları bildirilmiştir.
- ✓ **Hayati tehlike oluşturabilecek ciddi bir organ yetmezliği hastalığı** (yaklaşık 250.000'de 1 kişi). Sarıhumma aşılama sonrasında bazıları ölümcül olan iç organları tutan hastalık vakaları (YEL-AVD olarak bilinen ve daha önceleri "Ateşli Çoklu Organ Sistemi Yetmezliği" olarak tanımlanan) bildirilmiştir. **YEL-AVD;** ateş, yorgunluk, eklem ağrısı, baş ağrısı, düşük tansiyon ile kendini göstererek metabolik asidoz (kandaki asit baz dengesinin asit yönüne kayması), kaslarda ve karaciğerde hücre erimesi, kanda savunma sistemi hücresi sayısında azalma (lenfositopeni), kanda belli bir miktarda bulunan kan pulcuklarının sayısında azalma (trombositopeni), böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği olgularından birini veya daha fazlasını da içerecek şekilde ilerleyebilir. Bu yan etkiye maruz kalan kişilerin yarısından fazlası hayatını kaybetmektedir.

Diğer Koruyucu Tedbirler

Sarıhummadan korunmanın bir diğer yolu; İyi şekilde perdelenmiş veya havalandırılmalı alanlarda kalarak, Vücudun büyük bölümünü kapatan kıyafetler giyerek, DEET (Diethyltoluamide) içerenler gibi etkili bir böceksavar kullanarak, Sivrisinek ısırıklarından korunmaktır.

Sarıhumma aşısı uygulamasından önce, sarıhumma hastalığı ve aşısı, uygulanma şekli, aşı sonrası oluşabilecek reaksiyonlar ve yan etkiler ile ilgili bilgileri gösteren metni okudum. Anlamakta güçlük çektiğim konularla ilgili olarak sorumlu hekime sorular sordum ve sorularıma yeterli ve anlayabileceğim kadar açık ve net cevaplar aldım. Sarıhumma aşısı ile ilgili olarak gerek tıbbi uygulanma yollarının nasıl olacağı ve gerekse aşı olunduktan sonra oluşabilecek yan etkiler konusunda aydınlatılarak bilgilendirildim. Aşığı yaptırmadığım takdirde karşılaşabileceğim tıbbi durumlar ve olası sonuçlar tarafıma anlatıldı. Sarıhumma aşısı uygulanması ve olası yan etkileri konusunda aydınlatılarak bilgilendirildim, kendi rızamla aşılanmayı kabul ediyorum.

(Lütfen altı çizili bölüme kendi el yazınızla "Okudum ve anladım, Sarıhumma aşılama ve yan etkiler konusunda aydınlatıldım, aşı yaptırmayı kabul ediyorum" ve adınızı-soyadınızı yazarak imzalayınız)

.....
.....
.....
.....
Ad-Soyad:.....

T.C. No:..... İmza:.....

Tarih:...../...../.....

Saat:...../.....

Bilgilendiren Doktorun:

Adı-Soyadı:.....

İmzası:.....

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEYAHAT SAĞLIĞI BİLGİ FORMU

T.C. No/ Pasaport No		Meslek	
Adı		Yolculuk Tarihi	
Soyadı		Kalış Süresi	
Uyruğu		Telefon	
Gideceğiniz Ülke ve Bölge/ Şehir		Seyahat Amacınız (İş, gezi, eğitim)	

Aşağıdaki sorulara evet veya hayır diye cevaplayınız:

	Evet	Hayır
Daha önce yurt dışına çıkarken, seyahat için aşı oldunuz mu? Hangi aşılari oldunuz?.....		
Özellikle yumurta olmak üzere, herhangi bir aşı veya ilaç alerjiniz var mı?		
Herhangi bir kronik hastalığınız var mı?.....		
Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı?		
Bağıışıklık sisteminizi bozan bir durumunuz var mı? (yaygın malign hastalık, lenfoma, lösemi, doğumsal immün yetmezlik, timus hastalığı, HIV enfeksiyonu vb.).....		
Bağıışıklık sisteminizi baskılayan bir durum var mı? (kortizon, alkile edici ilaçlar, antimetabolitler, TNF- α inhibitörleri, IL-1 bloke edici madde ya da bağıışıklık hücrelerini hedefleyen diğeri monoklonal antikor kullanımı, kemoterapi veya radyoterapi vb.).....		
Son 3 ay içinde kullanmayı bıraktığınız ilacınız-tedaviniz var mı? (kemoterapi, radyoterapi, kortizon vb.).....		
Organ nakli oldunuz mu? Olduysanız ne zaman?		
Ev halkınızda immün yetmezlik durumu veya hamile olan var mı?		
Hepatit-Sarılık geçirdiniz mi?		
Kalp-damar hastalığınız var mı? (Ritim bozukluğu vb.)		
Nörolojik bir hastalığınız var mı? (Epilepsi, MS vb.)		
Anksiyete-Depresyon tanısıyla ilaç kullanıyor musunuz? Daha önce kullandınız mı?.....		
Böbreklerinle ilgili herhangi bir hastalığınız var mı?		
Sadece Kadınlar İçin:		
Hamile misiniz veya gebelik şüpheniz var mı?		
1 ay içerisinde gebelik planınız var mı?		
Bebek emziriyor musunuz?		
Yukardaki bilgilerin doğruluğunu ve ülke sağığı gelişimi için kullanılablmesini kabul ediyorum.		

Okudum, Anladım, Doğruluğunu Kabul Ediyorum.

Tarih:

İmza: