01 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Trapezius – øvre fibre

Hvor: Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.

Refereret smerte: tindingen, siden af hovedet, siden af halsen, bag øret, underkæbens vinkel

Udstrækning: Hovedet lateralflekteres til modsat side med let fleksion; siddende holder patienten fast under stolen med hånden på samme side.

02 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Levator scapulae

Hvor: Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant.

Refereret smerte: overgangen mellem nakke og skulder, skulderbladets inderkant, bagsiden af skulderen

Udstrækning: Hovedet i fleksion og roteret mod modsat side (næsen mod armhulen), hånden på den behandlede side i nakken.

03 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Sternocleidomastoideus (SCM)

Hvor: Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.

Refereret smerte: panden, omkring øjet, kinden, dybt i øret, issen, baghovedet

Udstrækning: Hovedet lateralflekteres til modsat side, og derefter roteres hagen langsomt mod den behandlede side; let ekstension kun hvis det ikke giver svimmelhed.

04 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Suboccipitale muskler

Hvor: Lige under nakkebenet, til højre og venstre for midtlinjen, i dybden.

Refereret smerte: siden af hovedet, bag øjet, panden, baghovedet

Udstrækning: Hageretraktion (hovedet glider lige bagud) og derefter et let «nik» fremad.

05 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Masseter

Hvor: I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.

Refereret smerte: kindtænderne i over- og underkæben, underkæben, øjenbrynet, dybt i øret

Udstrækning: Langsom åbning af munden med tungespidsen mod ganen; terapeutens to fingre fører forsigtigt kæben nedad.

06 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Temporalis

Hvor: Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger.

Refereret smerte: tindingen, øjenbrynet, bag øjet, tænderne i overkæben, siden af hovedet

Udstrækning: Langsom åbning af munden, mens terapeutens fingre glider opad over tindingen.

07 · HOVED, ANSIGT OG NAKKE

Scaleni

Hvor: På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

Refereret smerte: forsiden af brystkassen, overarmen, skulderbladets inderkant, hånden (tommel- og pegefinger)

Udstrækning: Hovedet lateralflekteres til modsat side med let ekstension; terapeuten stabiliserer kravebenet på den behandlede side nedad.

08 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Infraspinatus

Hvor: På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.

Refereret smerte: forsiden af skulderen (dybt), overarmens forreste yderside, underarmen, håndens tommelfingerside

Udstrækning: Armen på den behandlede side føres foran brystet, og den anden hånd trækker albuen ind mod brystet; eller hånden om på ryggen.

09 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Supraspinatus

Hvor: Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion.

Refereret smerte: siden af skulderen (deltoidregionen), overarmens yderside, albuens yderside

Udstrækning: Armen på den behandlede side om på ryggen, den anden hånd trækker blidt håndleddet mod modsat side.

10 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Pectoralis minor

Hvor: Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major.

Refereret smerte: forsiden af skulderen, brystkassen, overarmens inderside, håndens lillefingerside

Udstrækning: Skuldrene tilbage og ned; i dørkarmen er albuen over skulderhøjde.

11 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Rhomboidei

Hvor: Mellem skulderbladets mediale kant og columna, under trapezius.

Refereret smerte: skulderbladets inderkant, mellem skulderbladene

Udstrækning: Armene krydses foran kroppen (kram dig selv), ryggen krummes let.

12 · SKULDER, OVERARM, UNDERARM OG HÅND

Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Hvor: På underarmens bageste laterale side, 3–6 cm under albuen.

Refereret smerte: albuens yderside, underarmens bagside, håndryggen, fingrene

Udstrækning: Albuen strakt, håndled og fingre flekteret, den anden hånd trækker blidt nedad.

13 · RYG, RYGSØJLE OG TRUNCUS

Quadratus lumborum

Hvor: Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden.

Refereret smerte: hoftekammen (crista iliaca), glutealregionen, siden af hoften, lænden

Udstrækning: Sidebøjning stående eller i sideleje, med den øverste arm over hovedet.

14 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

Iliopsoas

Hvor: På forsiden af låret under ligamentum inguinale (lateralt for arteria femoralis) og i maven, på indersiden af hoftebenet.

Refereret smerte: lænden ved siden af rygsøjlen, korsbenet, forsiden af låret

Udstrækning: Udfaldsstilling (lunge): det bageste knæ i gulvet, bækkenet skubbes frem.

15 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

Gluteus medius

Hvor: 2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen.

Refereret smerte: nederste del af lænden, korsbenet, siden af hoften, glutealregionen

Udstrækning: I sideleje hænger det øverste ben ud over kanten af briksen bag kroppen; eller stående med krydsede ben, sidebøjning.

16 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

Gluteus minimus

Hvor: Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major.

Refereret smerte: lårets yderside, underbenets yderside, bagsiden af låret, anklen

Udstrækning: Rygleje, benet krydser over mod den modsatte side.

17 · BÆKKEN, HOFTE OG BALDER

Piriformis

Hvor: I den midterste og laterale tredjedel af linjen mellem os sacrums laterale rand og spidsen af trochanter major.

Refereret smerte: glutealregionen, korsbenet, bagsiden af låret, bag hofteleddet

Udstrækning: Rygleje, anklen fra det behandlede ben på det andet knæ, det andet lår trukket mod brystet («4-tals»-udstrækning).

18 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

Vastus lateralis

Hvor: På ydersiden af låret, flere steder mellem hofte og knæ.

Refereret smerte: lårets yderside, knæets yderside, bag knæskallen

Udstrækning: Knæet maksimalt bøjet, benet i let indadrotation.

19 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

Gastrocnemius

Hvor: I den øverste del af læggen, på det mediale og laterale hoved, under knæhasen.

Refereret smerte: fodens svang, læggen, knæhasen

Udstrækning: Stående foran en væg, det bageste ben strakt, hælen i gulvet.

20 · LÅR, UNDERBEN OG FOD

Soleus

Hvor: I den nederste del af læggen, dybt under gastrocnemius, over achillessenen.

Refereret smerte: hælen, læggen, korsbenet (sjældent)

Udstrækning: Stående foran en væg, det bageste knæ let bøjet, hælen i gulvet.