DU FINDER DET OG VED, HVAD DU SKAL GØRE™

# Protokoller for de 10 Hyppigste Gener

De gener, som de fleste patienter kommer med, og den rækkefølge af muskler, det er værd at starte med. Den detaljerede teknik står i de 60 protokoller.

# Indhold

1 · Sådan bruges det

2 · De 10 gener

Næste skridt

AFSNIT 1

# Sådan bruges det

Gene → muskler i rækkefølge → protokol.

1. Spørg, hvad der er sket, og bed patienten vise, hvor det gør ondt (brug Skemaer til Hurtig Muskelvurdering).
2. Udelukk det, der står i afsnittet »Udelukkes først«.
3. Vurdér musklerne i den angivne rækkefølge, og behandl den muskel, der genskaber genen.
4. Giv en udstrækning med hjem, og tjek ændringen ved næste behandling.

AFSNIT 2

# De 10 gener

For hver enkelt: muskler i rækkefølge og hvad du skal udelukke først.

## 1. Spændingshovedpine

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Trapezius – øvre fibre | Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant. |
| 2 | Suboccipitale muskler | Lige under nakkebenet, til højre og venstre for midtlinjen, i dybden. |
| 3 | Sternocleidomastoideus (SCM) | Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel. |
| 4 | Temporalis | Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger. |
| 5 | Semispinalis capitis | I nakken, 2–3 cm fra midtlinjen, under nakkeknuden og midt på nakken. |

**Udelukkes først**

Pludselig opstået, den værste hovedpine i patientens liv, feber og nakkestivhed, syns- eller taleforstyrrelser, svaghed: straks til lægen.

## 2. Nakkesmerter og nakkestivhed

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Levator scapulae | Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant. |
| 2 | Trapezius – øvre fibre | Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant. |
| 3 | Splenius cervicis | Nederst i nakken, over skulderbladets øvre vinkel, ved siden af levator scapulae. |

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 4 | Scaleni | På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet. |
| 5 | Semispinalis capitis | I nakken, 2–3 cm fra midtlinjen, under nakkeknuden og midt på nakken. |

> **Udelukkes først**
>
> Nakkesmerter efter en skade, følelsesløshed eller svaghed, der stråler ud i armen: lægeundersøgelse.

## 3. Kæbe- og ansigtssmerter

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Masseter | I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet. |
| 2 | Temporalis | Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger. |
| 3 | Pterygoideus lateralis | Dybt under arcus zygomaticus; intraoralt bag de øvre kindtænder, opad og bagud. |
| 4 | Pterygoideus medialis | På indersiden af underkæbevinklen, palperet nedefra; intraoralt bag den bageste kindtand. |
| 5 | Sternocleidomastoideus (SCM) | Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel. |

> **Udelukkes først**
>
> Tandrelateret årsag, betændelse, kæbe der »låser«: tandlæge eller kæbekirurg.

## 4. Skuldersmerter, når armen løftes

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Infraspinatus | På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata. |
| 2 | Supraspinatus | Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion. |

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 3 | Subscapularis | På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant. |
| 4 | Deltoideus | I de forreste, midterste og bageste fibre, 2–5 cm under acromion. |
| 5 | Pectoralis minor | Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major. |

> **Udelukkes først**
>
> Svag arm efter en skade, natlige smerter, der ikke går over: lægeundersøgelse (rotatorcuff).

## 5. Gener, der ligner »tennisalbue«

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum) | På underarmens bageste laterale side, 3–6 cm under albuen. |
| 2 | Triceps brachii | På bagsiden af overarmen, i det lange hoved under armhulen og 4–6 cm over albuen. |
| 3 | Supraspinatus | Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion. |
| 4 | Scaleni | På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet. |

> **Udelukkes først**
>
> Hævelse, lokal varme, natlig følelsesløshed i fingrene: lægeundersøgelse.

## 6. Smerter mellem skulderbladene

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Rhomboidei | Mellem skulderbladets mediale kant og columna, under trapezius. |
| 2 | Trapezius – midterste fibre | Mellem scapulas mediale rand og rygsøjlen, i højde med spina scapulae, overfladisk. |

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 3 | Serratus posterior superior | Under den øvre del af scapula, ved siden af rygsøjlen; du når den, når scapula trækkes ud til siden. |
| 4 | Scaleni | På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet. |
| 5 | Levator scapulae | Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant. |

> **Udelukkes først**
> Brystsmerter ved anstrengelse, åndenød, sveden: straks til lægen (hjertet).

## 7. Lændesmerter

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Quadratus lumborum | Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden. |
| 2 | Iliocostalis lumborum | I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben. |
| 3 | Multifidus | Lige ved siden af processus spinosi, i dybden, i alle dele af rygsøjlen (oftest i lænden). |
| 4 | Iliopsoas | På forsiden af låret under ligamentum inguinale (lateralt for arteria femoralis) og i maven, på indersiden af hoftebenet. |
| 5 | Gluteus medius | 2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen. |

> **Udelukkes først**
> Følelsesløshed eller svaghed, der stråler ud i benet, problemer med vandladning eller afføring, feber, vægttab: straks til lægen.

## 8. Smerter fra ballen, der stråler ned i låret

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Gluteus minimus | Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major. |

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 2 | Piriformis | I den midterste og laterale tredjedel af linjen mellem os sacrums laterale rand og spidsen af trochanter major. |
| 3 | Gluteus medius | 2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen. |
| 4 | Quadratus lumborum | Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden. |

> **Udelukkes først**
>
> Følelsesløshed, svaghed, ændrede reflekser (fra en nerverod): lægeundersøgelse.

## 9. Knæsmerter

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Rectus femoris | På forsiden af låret, lige under hoften, tæt ved spina iliaca anterior inferior. |
| 2 | Vastus medialis | På den anteromediale side af låret, 5–10 cm over knæet. |
| 3 | Vastus lateralis | På ydersiden af låret, flere steder mellem hofte og knæ. |
| 4 | Biceps femoris | På den posterolaterale side af låret, i den midterste og nederste tredjedel. |
| 5 | Adductor longus og brevis | På indersiden af låret, i den øverste tredjedel. |

> **Udelukkes først**
>
> Hævelse, lokal varme, »aflåsning«, instabilitet, skade: lægeundersøgelse.

## 10. Smerter i hæl og fodsål

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 1 | Soleus | I den nederste del af læggen, dybt under gastrocnemius, over achillessenen. |
| 2 | Gastrocnemius | I den øverste del af læggen, på det mediale og laterale hoved, under knæhasen. |

| RÆKKEFØLGE | MUSKEL | HVOR DU LEDER |
|---|---|---|
| 3 | Quadratus plantae | I den bageste del af fodsålen, i dybden, lige foran hælen. |
| 4 | Flexor digitorum brevis | Midt under fodsålen, foran hælen. |
| 5 | Abductor hallucis | Ved fodsålens mediale rand, mellem hælen og storetåens basis. |
| 6 | Tibialis posterior | Dybt i læggen, bag skinnebenets posteromediale rand. |

**Udelukkes først**

Ensidig hævelse af læggen (trombose), natlige smerter, følelsesløshed: lægeundersøgelse.

# Næste skridt

**I denne uge:** find ud af, hvilken gene dine næste tre patienter hører under, og følg rækkefølgen.