TRYG MED HVER PATIENT™

30 Kliniske Cases Trin for Trin

Gene → fund → vurdering → behandling. Fiktive, men typiske cases, så du har en færdig tankegang klar, også når patienten er vanskelig.

Indhold

1 · Sådan bruger du det

2 · 30 cases

Næste skridt

AFSNIT 1

Sådan bruger du det

Læs det som en casegennemgang.

Vigtigt

Casene er fiktive undervisningseksempler, ikke rigtige patienter. Nummeret ved musklen svarer til dens nummer i «60 Behandlingsprotokoller pr. Muskel», hvis du har dem. Se i hver case først linjen «Først udelukker du».

1. Læs genen, og gæt, før du læser videre, hvilke muskler der kan være årsagen.
2. Sammenlign med vurderingen.
3. Gå de tilstande igennem, der skal udelukkes.
4. Find musklerne i atlasset.

AFSNIT 2

30 cases

Fra hoved til fod.

1. Hovedpine foran skærmen

Kvinde, 34 år, kontoransat · undervisningseksempel

GENE	Hovedpine ved tindingerne og i baghovedet, der tiltager hen på eftermiddagen, 3–4 gange om ugen.
FUND	Fremskudt hovedholdning; stramme bånd i trapezius – øvre fibre og i den suboccipitale region; tryk reproducerer smerten ved tindingen.
VURDERING	Smertens placering (tinding, baghoved) og holdningen peger på trapezius – øvre fibre og de suboccipitale muskler.
MUSKLER AT BEHANDLE	Trapezius – øvre fibre (protokol nr. 1); Suboccipitale muskler (protokol nr. 9); Temporalis (protokol nr. 4)
DERHJEMME	Hagetilbagetrækning hver time, skærmen i øjenhøjde, udstrækning med sidebøjning.

Først udelukker du: Pludselig opstået, livets værste hovedpine, synsforstyrrelser, feber: det er ikke tilfældet her.

2. Nakke, der «låser» om morgenen

Mand, 41 år, lastbilchauffør · undervisningseksempel

GENE	Når han vågner, kan han ikke dreje hovedet til venstre; det gør ondt i nakken og ved skulderbladets mediale kant.
FUND	Nedsat rotation til venstre; ømt punkt over højre skulderblads øvre vinkel.
VURDERING	Den nedsatte rotation og smerten over skulderbladets vinkel er det klassiske billede ved levator scapulae.
MUSKLER AT BEHANDLE	Levator scapulae (protokol nr. 11); Trapezius – øvre fibre (protokol nr. 1); Splenius cervicis (protokol nr. 8)
DERHJEMME	Udstrækning af levator scapulae to gange dagligt; lavere hovedpude.

Først udelukker du: Der er ingen traume, ingen følelsesløshed, der udstråler til armen, og ingen feber.

3. Det gør ondt i tanden, men tandlægen fandt intet

Kvinde, 29 år, studerende i eksamensperioden · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt i de øvre kindtænder, og om morgenen er kæben spændt.
FUND	Gabeåbning på 2 fingre; ømme punkter i masseter; tryk reproducerer tandpinen.
VURDERING	Dental årsag er udelukket, og billedet er typisk for masseter; stress og sammenbidning af tænderne vedligeholder det.
MUSKLER AT BEHANDLE	Masseter (protokol nr. 3); Temporalis (protokol nr. 4); Pterygoideus medialis (protokol nr. 6)
DERHJEMME	Selvmassage, tungen mod ganen, opmærksomhed på sammenbidning af tænderne.

Først udelukker du: Der er foretaget en tandlægeundersøgelse.

4. Svimmelhed og hovedpine ved nakkebevægelse

Kvinde, 52 år · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt i panden og omkring øjnene, og hun har periodevis en let fornemmelse af ustabilitet.
FUND	Den sternale del af SCM er øm; pincetgreb reproducerer smerten i panden.
VURDERING	SCM kan give smerter i panden og omkring øjnene samt forstyrrelser i balancesansen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Sternocleidomastoideus (SCM) (protokol nr. 2); Trapezius – øvre fibre (protokol nr. 1)
DERHJEMME	Langsomme hovedbevægelser, ikke se tv liggende.

Først udelukker du: Ægte drejende fornemmelse (vertigo), høretab, syns- eller taleforstyrrelser: først læge. Her har egen læge allerede udelukket det.

5. Smerte, der udstråler til armen

Mand, 38 år, træner · undervisningseksempel

GENE	Smerte foran på brystkassen, ved skulderbladets mediale kant og ned mod tommelfingeren.
FUND	Let tryk i scaleniområdet reproducerer smerten; der er ingen kraftnedsættelse.
VURDERING	Scaleni refererer smerte til brystkassen, skulderbladet og armen; øvre brystvejrtrækning vedligeholder dem.
MUSKLER AT BEHANDLE	Scaleni (protokol nr. 12); Pectoralis minor (protokol nr. 19); Levator scapulae (protokol nr. 11)
DERHJEMME	5 minutters maveåndedræt dagligt, ingen tung taske.

Først udelukker du: Kraftnedsættelse, ændrede reflekser, vedvarende følelsesløshed: læge for at udelukke en nerverodsårsag.

6. Skuldersmerter om natten

Kvinde, 47 år · undervisningseksempel

GENE	Dyb smerte foran i højre skulder; hun kan ikke ligge på højre side.
FUND	Ømme punkter i infraspinatus; trykket udstråler til forsiden af skulderen.
VURDERING	Selvom infraspinatus ligger bagtil, refererer den smerten til forsiden af skulderen: en hyppig misforståelse.
MUSKLER AT BEHANDLE	Infraspinatus (protokol nr. 13); Teres minor (protokol nr. 15); Deltoideus (protokol nr. 17)
DERHJEMME	I sideleje en pude under armen; udstrækning med armen foran brystet.

Først udelukker du: Svaghed ved armløft efter et traume, natlige smerter, der ikke går over med noget: læge.

7. Smertefuldt armløft

Mand, 55 år, maler · undervisningseksempel

GENE	Når han løfter armen over hovedet, gør det ondt på siden af skulderen.
FUND	Ømt punkt over spina scapulae; trykket udstråler til siden af skulderen og ydersiden af albuen.
VURDERING	Billede af supraspinatus.
MUSKLER AT BEHANDLE	Supraspinatus (protokol nr. 14); Infraspinatus (protokol nr. 13); Deltoideus (protokol nr. 17)
DERHJEMME	Pendulbevægelser to gange dagligt, pauser i arbejdet.

Først udelukker du: Traume, hurtigt indsættende kraftnedsættelse, natlige smerter: læge for at udelukke en rotator cuff-ruptur.

8. Bevægelsesindskrænkning, der ligner «frossen skulder»

Kvinde, 58 år · undervisningseksempel

GENE	Hun kan ikke rotere armen udad; det gør ondt bag på skulderen og ved håndleddet.
FUND	Udadrotationen er tydeligt nedsat; subscapularis, som du når fra armhulen, er øm.
VURDERING	Subscapularis refererer smerte til bagsiden af skulderen og til håndleddet og begrænser udadrotationen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Subscapularis (protokol nr. 16); Pectoralis major (protokol nr. 18); Teres minor (protokol nr. 15)
DERHJEMME	Udstrækning med udadrotation i døråbningen.

Først udelukker du: Hvis bevægeligheden er nedsat i alle retninger, og det gør meget ondt om natten (adhæsiv kapsulitis): lægeundersøgelse og fælles plan.

9. Brystsmerter efter træning

Mand, 30 år · undervisningseksempel

GENE	Efter bænkpres gør det ondt foran i venstre side af brystkassen.
FUND	Stramt bånd i den laterale kant af pectoralis major; tryk reproducerer smerten.
VURDERING	Mekanisk smerte, der ændrer sig med bevægelse og tryk; overbelastning efter træning.
MUSKLER AT BEHANDLE	Pectoralis major (protokol nr. 18); Pectoralis minor (protokol nr. 19); Serratus anterior (protokol nr. 21)
DERHJEMME	Udstrækning i døråbningen, gradvis tilbagevenden.

Først udelukker du: Brystsmerter ved anstrengelse, åndenød, sved: STRAKS læge. Det er ikke tilfældet her.

10. Tennisalbue

Mand, 44 år, elektriker · undervisningseksempel

GENE	Når han skruer og griber om ting, gør det ondt på ydersiden af albuen.
FUND	Ømme punkter i underarmens ekstensorer under albuen; det gør ondt at gribe.
VURDERING	Underarmens ekstensorer refererer smerte til ydersiden af albuen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum) (protokol nr. 25); Triceps brachii (protokol nr. 24); Supraspinatus (protokol nr. 14)
DERHJEMME	Udstrækning af underarmen, værktøj med tykkere greb.

Først udelukker du: Hævelse, lokal varme, natlig følelsesløshed: læge.

11. Håndflade, der gør ondt og sover

Kvinde, 39 år, frisør · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt i håndfladen og på fingrenes palmare side, især efter arbejdet.
FUND	Underarmens fleksorer er spændte; ingen natlig følelsesløshed.
VURDERING	Overbelastede fleksorer i underarmen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Underarmens fleksorer (protokol nr. 26); Pectoralis minor (protokol nr. 19); Scaleni (protokol nr. 12)
DERHJEMME	Udstrækning af underarmen hver time på arbejdet.

Først udelukker du: Natlig følelsesløshed, kluntede fingre (karpaltunnelsyndrom): læge.

12. Smerte mellem skulderbladene

Kvinde, 33 år, bogholder · undervisningseksempel

GENE	Brændende smerte mellem skulderbladene, der tiltager hen på aftenen.
FUND	Krum holdning; ømme punkter i rhomboideus og trapezius – midterste fibre.
VURDERING	Ofte en kombination af forlængede, svage rygmuskler og en forkortet brystmuskel.
MUSKLER AT BEHANDLE	Rhomboidei (protokol nr. 20); Trapezius – midterste fibre (protokol nr. 27); Pectoralis minor (protokol nr. 19)
DERHJEMME	Udstrækning af brystmusklen, 10 tilbagetrækninger af skulderbladene hver time.

Først udelukker du: Brystsmerter ved anstrengelse, åndenød: læge.

13. Jagende smerte i siden af brystkassen

Mand, 27 år, løber · undervisningseksempel

GENE	Når han løber, mærker han et stik i siden ved ribbenene.
FUND	Serratus anterior er øm i højde med 5.–6. ribben.
VURDERING	Kraftig vejrtrækning og løb overbelaster serratus anterior.
MUSKLER AT BEHANDLE	Serratus anterior (protokol nr. 21); Obliquus externus abdominis (protokol nr. 36)
DERHJEMME	Dybe indåndinger med armen løftet, gradvis øgning af tempoet.

Først udelukker du: Feber, hoste, skarp smerte relateret til vejrtrækningen: læge.

14. Lændesmerter efter foroverbøjning

Mand, 46 år, lagerarbejder · undervisningseksempel

GENE	Efter at have løftet en kasse fik han pludselige lændesmerter; sidebøjning gør ondt.
FUND	Quadratus lumborum er øm; smerten udstråler ikke til benet, og der er ingen følelsesløshed.
VURDERING	Smerte, der udstråler til crista iliaca ved sidebøjning: quadratus lumborum.
MUSKLER AT BEHANDLE	Quadratus lumborum (protokol nr. 34); Iliocostalis lumborum (protokol nr. 31); Gluteus medius (protokol nr. 38)
DERHJEMME	Udstrækning med sidebøjning, løft med bøjede knæ.

Først udelukker du: Følelsesløshed eller svaghed, der udstråler til benet, vandladnings- eller afføringsforstyrrelser: straks læge.

15. Lændesmerter efter langvarigt siddende arbejde

Kvinde, 36 år, programmør · undervisningseksempel

GENE	Når hun rejser sig, kan hun ikke rette sig op; det gør ondt i lænden.
FUND	Iliopsoas er spændt; i udfaldsstilling mærkes et stræk i lænden.
VURDERING	En hofte, der længe holdes bøjet, forkorter iliopsoas, som refererer smerten til lænden.
MUSKLER AT BEHANDLE	Iliopsoas (protokol nr. 41); Rectus femoris (protokol nr. 47); Multifidus (protokol nr. 33)
DERHJEMME	Udstrækning i udfaldsstilling hver time, arbejde også stående.

Først udelukker du: Mavegener, feber: læge.

16. Smerter i nedre del af maven og i ryggen

Kvinde, 31 år, efter intens mavetræning · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt midt på ryggen som et vandret bælte.
FUND	Rectus abdominis er øm ved siden af navlen.
VURDERING	Rectus abdominis kan referere smerte til ryggen som et vandret bælte.
MUSKLER AT BEHANDLE	Rectus abdominis (protokol nr. 35); Obliquus externus abdominis (protokol nr. 36); Iliocostalis thoracis (protokol nr. 30)
DERHJEMME	Bugleje med støtte på albuerne, færre mavebøjninger.

Først udelukker du: Mavesmerter med feber eller opkast, smerter i nedre del af maven, der ikke hænger sammen med menstruationen: læge.

17. Smerte i ballen ved siddende stilling

Mand, 50 år, taxichauffør · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt midt i ballen og trækker ned bag på låret.
FUND	Piriformis er øm; «4-tals»-udstrækningen reproducerer smerten.
VURDERING	Siddende arbejde og pungen i baglommen vedligeholder generne.
MUSKLER AT BEHANDLE	Piriformis (protokol nr. 40); Gluteus minimus (protokol nr. 39); Gluteus maximus (protokol nr. 37)
DERHJEMME	«4-tals»-udstrækning; han tager pungen ud af baglommen.

Først udelukker du: Følelsesløshed, svaghed, ændrede reflekser: en nerverodsårsag udelukkes.

18. Smerte, der ligner iskias

Kvinde, 45 år · undervisningseksempel

GENE	Smerte langs ydersiden af låret og underbenet.
FUND	Gluteus minimus er øm over trochanter major; ingen følelsesløshed, normal kraft og normale reflekser.
VURDERING	Gluteus minimus giver et iskiaslignende billede.
MUSKLER AT BEHANDLE	Gluteus minimus (protokol nr. 39); Piriformis (protokol nr. 40); Quadratus lumborum (protokol nr. 34)
DERHJEMME	Udstrækning af hoften, pauser på lange bilture.

Først udelukker du: Hvis der var følelsesløshed, svaghed eller ændrede reflekser: læge.

19. Hoftesmerter i sideleje

Kvinde, 60 år · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt på siden af hoften; hun kan ikke ligge på den side.
FUND	Gluteus medius og tensor fasciae latae er ømme.
VURDERING	Gluteus medius og tensor fasciae latae refererer smerte til siden af hoften og ydersiden af låret.
MUSKLER AT BEHANDLE	Gluteus medius (protokol nr. 38); Tensor fasciae latae (protokol nr. 42); Gluteus minimus (protokol nr. 39)
DERHJEMME	Pude mellem knæene om natten, styrkelse af hoftens abduktorer.

Først udelukker du: Mistanke om hoftegigt (lyskesmerter, nedsat rotation): læge.

20. Lyskesmerter hos en fodboldspiller

Mand, 22 år · undervisningseksempel

GENE	Ved sidelæns skridt gør det ondt i lysken og på indersiden af låret.
FUND	Adductor longus er øm i den øverste tredjedel.
VURDERING	Bratte sidelæns bevægelser belaster adduktorerne.
MUSKLER AT BEHANDLE	Adductor longus og brevis (protokol nr. 43); Pectineus (protokol nr. 45); Adductor magnus (protokol nr. 44)
DERHJEMME	«Sommerfugle»-udstrækning, gradvis tilbagevenden.

Først udelukker du: Mistanke om brok (bule i lysken ved hoste): læge.

21. Knæsmerter på trapper

Kvinde, 42 år · undervisningseksempel

GENE	Når hun går ned ad trapper, gør det ondt foran på knæet.
FUND	Rectus femoris og vastus medialis er ømme; der er ingen hævelse i knæet.
VURDERING	Lårets ekstensorer refererer smerte til forsiden af knæet.
MUSKLER AT BEHANDLE	Rectus femoris (protokol nr. 47); Vastus medialis (protokol nr. 48); Vastus lateralis (protokol nr. 49)
DERHJEMME	Udstrækning af låret, strækning af knæet fra siddende stilling som styrketræning.

Først udelukker du: Hævelse, «låsning», instabilitet, traume: læge.

22. Smerter på ydersiden af knæet hos løbere

Mand, 35 år, løber · undervisningseksempel

GENE	Efter en lang løbetur gør det ondt på ydersiden af knæet.
FUND	Vastus lateralis og tensor fasciae latae er ømme.
VURDERING	Vastus lateralis og tensor fasciae latae refererer smerte til ydersiden af knæet.
MUSKLER AT BEHANDLE	Vastus lateralis (protokol nr. 49); Tensor fasciae latae (protokol nr. 42); Gluteus medius (protokol nr. 38)
DERHJEMME	Udstrækning af låret, gradvis øgning af løbedistancen.

Først udelukker du: Hævelse, traume: læge.

23. Smerte bag knæet

Kvinde, 26 år, danser · undervisningseksempel

GENE	Når benet er strakt, gør det ondt bag knæet.
FUND	Biceps femoris og den øvre del af gastrocnemius er ømme.
VURDERING	Hasemusklerne og den øvre del af læggen refererer smerte til området bag knæet.
MUSKLER AT BEHANDLE	Biceps femoris (protokol nr. 50); Semitendinosus og semimembranosus (protokol nr. 51); Gastrocnemius (protokol nr. 52)
DERHJEMME	Udstrækning af hasemusklerne med et håndklæde.

Først udelukker du: Hævelse bag knæet, hævelse af læggen (Bakers cyste, trombose): læge.

24. Natlige kramper i læggen

Kvinde, 65 år · undervisningseksempel

GENE	Om natten får hun krampe i læggen, og om dagen strammer læggen.
FUND	Gastrocnemius er øm i begge hoveder; der er ingen hævelse.
VURDERING	En forkortet, overbelastet lægmuskel er tilbøjelig til kramper.
MUSKLER AT BEHANDLE	Gastrocnemius (protokol nr. 52); Soleus (protokol nr. 53)
DERHJEMME	Udstrækning af læggen om aftenen, tilstrækkeligt væskeindtag.

Først udelukker du: Ensidig hævelse, lokal varme, rødme: mistanke om trombose, straks læge.

25. Hælsmerter

Mand, 48 år, vandrer · undervisningseksempel

GENE	Ved gang, især sidst på dagen, gør det ondt i hælen.
FUND	Soleus og quadratus plantae er ømme.
VURDERING	Soleus refererer smerte til hælen; det samme gør fodens dybe muskler.
MUSKLER AT BEHANDLE	Soleus (protokol nr. 53); Quadratus plantae (protokol nr. 60); Flexor digitorum brevis (protokol nr. 58)
DERHJEMME	Udstrækning af læggen med bøjet knæ, massage af fodsålen med en lille bold.

Først udelukker du: Skarp smerte ved de første skridt om morgenen (plantarfascie), hævelse, følelsesløshed: speciallæge.

26. Skinnebenssmerter hos en ung løber

Kvinde, 24 år · undervisningseksempel

GENE	Efter løb gør det ondt foran på skinnebenet.
FUND	Tibialis anterior er øm; knoglen er ikke øm ved tryk.
VURDERING	For hurtig øgning af belastningen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Tibialis anterior (protokol nr. 54); Extensor digitorum longus (protokol nr. 57)
DERHJEMME	Udstrækning af fodryggen, kortere løbedistance.

Først udelukker du: Hvis knoglen gør ondt på ét punkt, og det tiltager med belastning (stressfraktur): læge.

27. Ankelsmerter efter forstuvning (6 uger)

Mand, 29 år · undervisningseksempel

GENE	Vedvarende smerte omkring den laterale malleol, følelse af instabilitet.
FUND	Peroneus longus er øm; ved undersøgelsen er anklen stabil.
VURDERING	Peroneerne refererer smerte til den laterale malleol og er blevet overbelastet efter skaden.
MUSKLER AT BEHANDLE	Peroneus (fibularis) longus (protokol nr. 55); Tibialis anterior (protokol nr. 54)
DERHJEMME	Stå på ét ben, stabilisering af anklen.

Først udelukker du: Nylig skade, kan ikke støtte på foden, stor hævelse: røntgen, læge.

28. Smerter i fodsålen efter at have stået op hele dagen

Kvinde, 51 år, ekspedient · undervisningseksempel

GENE	Det gør ondt midt i fodsålen og ved tæernes basis.
FUND	Flexor digitorum brevis og abductor hallucis er ømme.
VURDERING	Langvarig stående stilling og uegnede sko.
MUSKLER AT BEHANDLE	Flexor digitorum brevis (protokol nr. 58); Abductor hallucis (protokol nr. 59); Tibialis posterior (protokol nr. 56)
DERHJEMME	Massage af fodsålen med en lille bold, behagelige sko.

Først udelukker du: Følelsesløshed, brænden (neurogen), hævelse: læge.

29. Tindingesmerter og tænderskæren

Mand, 37 år · undervisningseksempel

GENE	Om morgenen gør det ondt ved tindingerne, og hans partner hører ham skære tænder om natten.
FUND	Temporalis og masseter er ømme.
VURDERING	Natlig bruksisme udtrætter tyggemusklerne.
MUSKLER AT BEHANDLE	Temporalis (protokol nr. 4); Masseter (protokol nr. 3); Pterygoideus lateralis (protokol nr. 5)
DERHJEMME	Selvmassage om aftenen, tandlæge for en bideskinne til natten.

Først udelukker du: Tandlægeundersøgelse (bideskinne til natten).

30. Smerte i issen

Kvinde, 44 år, syerske · undervisningseksempel

GENE	Når hun kigger nedad i lang tid, gør det ondt i issen.
FUND	Splenius capitis er øm.
VURDERING	Splenius capitis refererer smerte til issen.
MUSKLER AT BEHANDLE	Splenius capitis (protokol nr. 7); Semispinalis capitis (protokol nr. 10); Suboccipitale muskler (protokol nr. 9)
DERHJEMME	Arbejdsemnet højere oppe på arbejdet, hagetilbagetrækning hver time.

Først udelukker du: Pludselig opstået, usædvanlig hovedpine, neurologiske symptomer: læge.

Næste skridt

I denne uge: læs 3 cases om dagen, og følg vurderingen hos den næste lignende patient.