TRYG MED HVER PATIENT™

Eksamensforberedelse: 150 Spørgsmål og Svar

Til praktisk eksamen, afsluttende eksamen og klinisk praktik.
Dæk svaret til, og test dig selv.

Indhold

1 · Grundbegreber og sikkerhed

2 · Hoved, ansigt og nakke

3 · Skulder, overarm, underarm og hånd

4 · Ryg, rygsøjle og truncus

5 · Bækken, hofte og balder

6 · Lår, underben og fod

Næste skridt

AFSNIT 1

Grundbegreber og sikkerhed

30 generelle spørgsmål.

1. Hvad er et triggerpunkt?

Et ømt, palpabelt punkt i et stramt bånd i musklen, som ved tryk kan give lokal og refereret smerte.

2. Hvad er forskellen på et aktivt og et latent triggerpunkt?

Det aktive punkt giver også smerte spontant, det latente er kun ømt ved tryk.

3. Hvad er refereret smerte?

Den smerte, patienten mærker i et område langt fra triggerpunktet.

4. Hvad er iskæmisk kompression?

Vedvarende, gradvist stigende tryk på triggerpunktet, indtil spændingen giver efter.

5. Hvor kraftigt skal trykket være?

Typisk et ubehag på ca. 5–7 på skalaen 0–10, afhængigt af patientens signal.

6. Hvor længe holder du kompressionen?

Typisk 30–90 sekunder, 3–5 gentagelser.

7. Hvorfor laver vi udstrækning efter kompressionen?

For at genoprette det stramme bånds længde og fastholde resultatet.

8. Hvad er et stramt bånd?

En palpabel, rebagtig, hårdere gruppe af fibre i musklen.

9. Hvad er den lokale twitch-respons?

Den korte kontraktion af det stramme bånd, når du «knipser» på tværs hen over triggerpunktet.

10. Hvad betyder VAS?

Visuel analog skala, der vurderer smerteintensiteten fra 0 til 10.

11. Hvilke faktorer vedligeholder triggerpunkter?

Dårlig holdning, gentagen belastning, stress, søvnløshed, forkortede muskler, inaktivitet.

12. Hvornår skal patienten ikke behandles?

Ved feber, nyligt traume, mistanke om trombose, natlige smerter uden kendt årsag, neurologiske symptomer.

13. Hvad gør du, hvis der opstår svimmelhed under behandlingen?

Du stopper straks; hvis det ikke går over, henviser du patienten til lægen.

14. Hvorfor er hjemmeprogrammet vigtigt?
Fordi de vedligeholdende faktorer virker derhjemme og på arbejdet; uden et hjemmeprogram vender generne tilbage.

15. Hvad er pincetgrebet, og hvornår bruger du det?
At gribe muskelbugen mellem to fingre; ved overfladiske muskler, der kan gribes (f.eks. trapezius, SCM).

16. Hvad skal du være opmærksom på hos en patient i blodfortyndende behandling?
Du bruger kun let tryk og holder øje med, om der opstår blå mærker.

17. Hvad er forskellen på et triggerpunkt og et ømt punkt (tender point)?
Triggerpunktet i et stramt bånd kan give refereret smerte, det ømme punkt er lokal ømhed.

18. Hvordan dokumenterer du behandlingen?
Gene, VAS, behandlede muskler, teknik, reaktion, hjemmeøvelser, næste skridt.

19. Hvorfor vurderer du muskler langt fra smerteområdet?
Fordi kilden på grund af den refererede smerte ofte sidder et andet sted end der, hvor det gør ondt.

20. Hvad gør du, hvis trykket giver følelsesløshed i armen?
Du mindsker trykket eller stopper; ved vedvarende følelsesløshed: læge.

21. Hvilken muskel kan give «tandpine» uden dental årsag?
Oftest masseter og temporalis.

22. Hvilken muskel kan give smerter i panden og omkring øjet?
SCM og de suboccipitale muskler.

23. Hvilken muskel sidder bagtil, men gør ondt fortil?
Infraspinatus: den sidder på skulderbladet og refererer smerten til forsiden af skulderen.

24. Hvilken muskel kan efterligne iskias?
Gluteus minimus og piriformis.

25. Hvilken muskel kan give hælsmerter?
Soleus og quadratus plantae.

26. Hvad skal du være opmærksom på ved behandling af SCM?
Kun pincetgreb; aldrig tryk bagud på forsiden af halsen (arteria carotis).

27. Hvad skal du være opmærksom på ved behandling af læggen?
Ved ensidig hævelse, lokal varme eller rødme: ingen massage (mistanke om trombose).

28. Hvad skal du være opmærksom på ved behandling af iliopsoas?
Aldrig tryk tæt på arterien; ved mavegener og under graviditet ikke på den abdominale del.

29. Hvilken stilling er velegnet til behandling af quadratus lumborum?
Sideleje med det øverste ben hængende bagud; så øges afstanden mellem bækken og ribben.

30. Hvorfor hjælper maveåndedræt ved gener fra scaleni?
Fordi det erstatter den øvre brystvejrtrækning og mindsker overbelastningen af scaleni.

AFSNIT 2

Hoved, ansigt og nakke

24 spørgsmål.

31. Trapezius – øvre fibre: hvor leder du efter triggerpunktet?
Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.

32. Trapezius – øvre fibre: hvor kan smerten refereres hen?
Tindingen, siden af hovedet, siden af halsen, bag øret, underkæbens vinkel.

33. Sternocleidomastoideus (SCM): hvor leder du efter triggerpunktet?
Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.

34. Sternocleidomastoideus (SCM): hvor kan smerten refereres hen?
Panden, omkring øjet, kinden, dybt i øret, issen, baghovedet.

35. Masseter: hvor leder du efter triggerpunktet?
I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.

36. Masseter: hvor kan smerten refereres hen?
Kindtænderne i over- og underkæben, underkæben, øjenbrynet, dybt i øret.

37. Temporalis: hvor leder du efter triggerpunktet?
Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger.

38. Temporalis: hvor kan smerten refereres hen?
Tindingen, øjenbrynet, bag øjet, tænderne i overkæben, siden af hovedet.

39. Pterygoideus lateralis: hvor leder du efter triggerpunktet?
Dybt under arcus zygomaticus; intraoralt bag de øvre kindtænder, opad og bagud.

40. Pterygoideus lateralis: hvor kan smerten refereres hen?
Kæbeleddet, kinden (over bihulerne).

41. Pterygoideus medialis: hvor leder du efter triggerpunktet?
På indersiden af underkæbevinklen, palperet nedefra; intraoralt bag den bageste kindtand.

42. Pterygoideus medialis: hvor kan smerten refereres hen?
Tungeroden, svælget, under øret, kæbeleddet.

43. Splenius capitis: hvor leder du efter triggerpunktet?
På den bageste sidedel af nakken, mellem SCM og trapezius, ca. 2–3 fingerbredder under protuberantia occipitalis externa.

44. Splenius capitis: hvor kan smerten refereres hen?

Issen.

45. Splenius cervicis: hvor leder du efter triggerpunktet?

Nederst i nakken, over skulderbladets øvre vinkel, ved siden af levator scapulae.

46. Splenius cervicis: hvor kan smerten refereres hen?

Bag øjet, baghovedet, overgangen mellem nakke og skulder.

47. Suboccipitale muskler: hvor leder du efter triggerpunktet?

Lige under nakkebenet, til højre og venstre for midtlinjen, i dybden.

48. Suboccipitale muskler: hvor kan smerten refereres hen?

Siden af hovedet, bag øjet, panden, baghovedet.

49. Semispinalis capitis: hvor leder du efter triggerpunktet?

I nakken, 2–3 cm fra midtlinjen, under nakkeknuden og midt på nakken.

50. Semispinalis capitis: hvor kan smerten refereres hen?

Siden af hovedet, tindingen, panden, baghovedet.

51. Levator scapulae: hvor leder du efter triggerpunktet?

Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant.

52. Levator scapulae: hvor kan smerten refereres hen?

Overgangen mellem nakke og skulder, skulderbladets inderkant, bagsiden af skulderen.

53. Scaleni: hvor leder du efter triggerpunktet?

På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.

54. Scaleni: hvor kan smerten refereres hen?

Forsiden af brystkassen, overarmen, skulderbladets inderkant, hånden (tommel- og pegefinger).

AFSNIT 3

Skulder, overarm, underarm og hånd

28 spørgsmål.

55. Infraspinatus: hvor leder du efter triggerpunktet?

På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.

56. Infraspinatus: hvor kan smerten refereres hen?

Forsiden af skulderen (dybt), overarmens forreste yderside, underarmen, håndens tommelfingerside.

57. Supraspinatus: hvor leder du efter triggerpunktet?

Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion.

58. Supraspinatus: hvor kan smerten refereres hen?

Siden af skulderen (deltoidregionen), overarmens yderside, albuens yderside.

59. Teres minor: hvor leder du efter triggerpunktet?

Ved skulderbladets laterale kant, under infraspinatus, over den bageste aksillefold.

60. Teres minor: hvor kan smerten refereres hen?

Bagsiden af skulderen (punktformet), overarmens bagside.

61. Subscapularis: hvor leder du efter triggerpunktet?

På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant.

62. Subscapularis: hvor kan smerten refereres hen?

Bagsiden af skulderen, skulderbladet, overarmens bagside, håndleddet.

63. Deltoideus: hvor leder du efter triggerpunktet?

I de forreste, midterste og bageste fibre, 2–5 cm under acromion.

64. Deltoideus: hvor kan smerten refereres hen?

Skulderen (omkring punktet), overarmen.

65. Pectoralis major: hvor leder du efter triggerpunktet?

Ved brystmusklens laterale kant (forreste aksillefold), under kravebenet og ved siden af brystbenet.

66. Pectoralis major: hvor kan smerten refereres hen?

Forsiden af brystkassen, forsiden af skulderen, overarmens inderside, brystregionen.

67. Pectoralis minor: hvor leder du efter triggerpunktet?

Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major.

68. Pectoralis minor: hvor kan smerten refereres hen?

Forsiden af skulderen, brystkassen, overarmens inderside, håndens lillefingerside.

69. Rhomboidei: hvor leder du efter triggerpunktet?
Mellem skulderbladets mediale kant og columna, under trapezius.

70. Rhomboidei: hvor kan smerten refereres hen?
Skulderbladets inderkant, mellem skulderbladene.

71. Serratus anterior: hvor leder du efter triggerpunktet?
På siden af brystkassen, under armhulen, i højde med 5.–6. ribben.

72. Serratus anterior: hvor kan smerten refereres hen?
Siden af brystkassen, skulderbladets nederste vinkel, overarmens inderside.

73. Latissimus dorsi: hvor leder du efter triggerpunktet?
I den bageste aksillefold, i højde med skulderbladets nedre vinkel.

74. Latissimus dorsi: hvor kan smerten refereres hen?
Skulderbladets nederste vinkel, overarmens bageste inderside, ring- og lillefinger.

75. Biceps brachii: hvor leder du efter triggerpunktet?
I den midterste tredjedel af overarmens forside, i begge hoveder.

76. Biceps brachii: hvor kan smerten refereres hen?
Forsiden af skulderen, albuebøjningen.

77. Triceps brachii: hvor leder du efter triggerpunktet?
På bagsiden af overarmen, i det lange hoved under armhulen og 4–6 cm over albuen.

78. Triceps brachii: hvor kan smerten refereres hen?
Bagsiden af skulderen, albuens yderside, underarmens bagside.

79. Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum): hvor leder du efter triggerpunktet?
På underarmens bageste laterale side, 3–6 cm under albuen.

80. Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum): hvor kan smerten refereres hen?
Albuens yderside, underarmens bagside, håndryggen, fingrene.

81. Underarmens fleksorer: hvor leder du efter triggerpunktet?
På underarmens forreste mediale side, 3–6 cm under albuen.

82. Underarmens fleksorer: hvor kan smerten refereres hen?
Håndleddets håndfladeside, håndfladen, fingrenes håndfladeside.

AFSNIT 4

Ryg, rygsøjle og truncus

20 spørgsmål.

83. Trapezius – midterste fibre: hvor leder du efter triggerpunktet?

Mellem scapulas mediale rand og rygsøjlen, i højde med spina scapulae, overfladisk.

84. Trapezius – midterste fibre: hvor kan smerten refereres hen?

Mellem skulderbladene, brænden ved siden af rygsøjlen.

85. Trapezius – nedre fibre: hvor leder du efter triggerpunktet?

Mellem scapulas angulus inferior og rygsøjlen, midt på ryggen.

86. Trapezius – nedre fibre: hvor kan smerten refereres hen?

Nakken, acromion, mellem skulderbladene.

87. Serratus posterior superior: hvor leder du efter triggerpunktet?

Under den øvre del af scapula, ved siden af rygsøjlen; du når den, når scapula trækkes ud til siden.

88. Serratus posterior superior: hvor kan smerten refereres hen?

Dybt under skulderbladet, bagsiden af skulderen, overarmens bagside, lillefingeren.

89. Iliocostalis thoracis: hvor leder du efter triggerpunktet?

Ca. 5–8 cm fra rygsøjlen, i den midterste og nederste thorakalcolumna.

90. Iliocostalis thoracis: hvor kan smerten refereres hen?

Midt på ryggen, maven (nogle gange), under skulderbladet.

91. Iliocostalis lumborum: hvor leder du efter triggerpunktet?

I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben.

92. Iliocostalis lumborum: hvor kan smerten refereres hen?

Lænden, glutealregionen, nederste del af maven.

93. Longissimus thoracis: hvor leder du efter triggerpunktet?

2–4 cm fra rygsøjlen, i den nederste thorakal- og øverste lændecolumna.

94. Longissimus thoracis: hvor kan smerten refereres hen?

Glutealregionen, lænden, hoftekammen (crista iliaca).

95. Multifidus: hvor leder du efter triggerpunktet?

Lige ved siden af processus spinosi, i dybden, i alle dele af rygsøjlen (oftest i lænden).

96. Multifidus: hvor kan smerten refereres hen?

Punktformet ved siden af rygsøjlen, korsbenet, maven (sjældent).

97. Quadratus lumborum: hvor leder du efter triggerpunktet?

Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden.

98. Quadratus lumborum: hvor kan smerten refereres hen?

Hoftekammen (crista iliaca), glutealregionen, siden af hoften, lænden.

99. Rectus abdominis: hvor leder du efter triggerpunktet?

Over og under navlen, 2–4 cm fra midtlinjen.

100. Rectus abdominis: hvor kan smerten refereres hen?

Vandret bånd midt på ryggen, maven, lænden.

101. Obliquus externus abdominis: hvor leder du efter triggerpunktet?

På siden af maven, under kurvaturen og over crista iliaca.

102. Obliquus externus abdominis: hvor kan smerten refereres hen?

Siden af maven, lænden, nederste del af brystkassen.

AFSNIT 5

Bækken, hofte og balder

20 spørgsmål.

103. Gluteus maximus: hvor leder du efter triggerpunktet?

I den nederste mediale del af glutealregionen, ved siden af os sacrum og over tuber ischiadicum.

104. Gluteus maximus: hvor kan smerten refereres hen?

Glutealregionen, korsbenet, omkring halebenet.

105. Gluteus medius: hvor leder du efter triggerpunktet?

2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen.

106. Gluteus medius: hvor kan smerten refereres hen?

Nederste del af lænden, korsbenet, siden af hoften, glutealregionen.

107. Gluteus minimus: hvor leder du efter triggerpunktet?

Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major.

108. Gluteus minimus: hvor kan smerten refereres hen?

Lårets yderside, underbenets yderside, bagsiden af låret, anklen.

109. Piriformis: hvor leder du efter triggerpunktet?

I den midterste og laterale tredjedel af linjen mellem os sacrums laterale rand og spidsen af trochanter major.

110. Piriformis: hvor kan smerten refereres hen?

Glutealregionen, korsbenet, bagsiden af låret, bag hofteleddet.

111. Iliopsoas: hvor leder du efter triggerpunktet?

På forsiden af låret under ligamentum inguinale (lateralt for arteria femoralis) og i maven, på indersiden af hoftebenet.

112. Iliopsoas: hvor kan smerten refereres hen?

Lænden ved siden af rygsøjlen, korsbenet, forsiden af låret.

113. Tensor fasciae latae: hvor leder du efter triggerpunktet?

På den anterolaterale side af hoften, under spina iliaca anterior superior.

114. Tensor fasciae latae: hvor kan smerten refereres hen?

Lårets yderside, knæets yderside.

115. Adductor longus og brevis: hvor leder du efter triggerpunktet?

På indersiden af låret, i den øverste tredjedel.

116. Adductor longus og brevis: hvor kan smerten refereres hen?

Lysken, lårets inderside, knæets inderside.

117. Adductor magnus: hvor leder du efter triggerpunktet?

På den posteromediale side af låret, i den midterste tredjedel og tæt ved tuber ischiadicum.

118. Adductor magnus: hvor kan smerten refereres hen?

Lysken, lårets inderside, dybt i bækkenet.

119. Pectineus: hvor leder du efter triggerpunktet?

På den anteromediale side af låret, under lyskefolden, medialt for arteria femoralis.

120. Pectineus: hvor kan smerten refereres hen?

Dybt i lysken, lårets forreste inderside.

121. Sartorius: hvor leder du efter triggerpunktet?

Skråt over forsiden af låret, fra hoftebenets forreste fremspring til indersiden af knæet, overfladisk.

122. Sartorius: hvor kan smerten refereres hen?

Forsiden af låret (brændende, stikkende fornemmelse), knæets inderside.

AFSNIT 6

Lår, underben og fod

28 spørgsmål.

123. Rectus femoris: hvor leder du efter triggerpunktet?
På forsiden af låret, lige under hoften, tæt ved spina iliaca anterior inferior.

124. Rectus femoris: hvor kan smerten refereres hen?
Forsiden af knæet, omkring knæskallen.

125. Vastus medialis: hvor leder du efter triggerpunktet?
På den anteromediale side af låret, 5–10 cm over knæet.

126. Vastus medialis: hvor kan smerten refereres hen?
Knæets inderside, forsiden af knæet.

127. Vastus lateralis: hvor leder du efter triggerpunktet?
På ydersiden af låret, flere steder mellem hofte og knæ.

128. Vastus lateralis: hvor kan smerten refereres hen?
Lårets yderside, knæets yderside, bag knæskallen.

129. Biceps femoris: hvor leder du efter triggerpunktet?
På den posterolaterale side af låret, i den midterste og nederste tredjedel.

130. Biceps femoris: hvor kan smerten refereres hen?
Knæhasen, bagsiden af låret.

131. Semitendinosus og semimembranosus: hvor leder du efter triggerpunktet?
På den posteromediale side af låret, i den midterste og nederste tredjedel.

132. Semitendinosus og semimembranosus: hvor kan smerten refereres hen?
Nederste del af glutealregionen, bagsiden af låret, indersiden af knæhasen.

133. Gastrocnemius: hvor leder du efter triggerpunktet?
I den øverste del af læggen, på det mediale og laterale hoved, under knæhasen.

134. Gastrocnemius: hvor kan smerten refereres hen?
Fodens svang, læggen, knæhasen.

135. Soleus: hvor leder du efter triggerpunktet?
I den nederste del af læggen, dybt under gastrocnemius, over achillessenen.

136. Soleus: hvor kan smerten refereres hen?
Hælen, læggen, korsbenet (sjældent).

137. Tibialis anterior: hvor leder du efter triggerpunktet?
Lige lateralt for skinnebenet, i den øverste tredjedel af underbenet.

138. Tibialis anterior: hvor kan smerten refereres hen?
Forsiden af anklen, storetåen.

139. Peroneus (fibularis) longus: hvor leder du efter triggerpunktet?
På ydersiden af underbenet, i den øverste tredjedel, 2–4 cm under caput fibulae.

140. Peroneus (fibularis) longus: hvor kan smerten refereres hen?
Den udvendige ankelknogle (lateral malleol), fodens yderside.

141. Tibialis posterior: hvor leder du efter triggerpunktet?
Dybt i læggen, bag skinnebenets posteromediale rand.

142. Tibialis posterior: hvor kan smerten refereres hen?
Akillessenen, hælen, fodsålen.

143. Extensor digitorum longus: hvor leder du efter triggerpunktet?
På den anterolaterale side af underbenet, lateralt for tibialis anterior, i den øverste tredjedel.

144. Extensor digitorum longus: hvor kan smerten refereres hen?
Fodryggen, de midterste tæer.

145. Flexor digitorum brevis: hvor leder du efter triggerpunktet?
Midt under fodsålen, foran hælen.

146. Flexor digitorum brevis: hvor kan smerten refereres hen?
Midt på fodsålen, roden af tæerne.

147. Abductor hallucis: hvor leder du efter triggerpunktet?
Ved fodsålens mediale rand, mellem hælen og storetåens basis.

148. Abductor hallucis: hvor kan smerten refereres hen?
Hælens inderside, svangens inderkant.

149. Quadratus plantae: hvor leder du efter triggerpunktet?
I den bageste del af fodsålen, i dybden, lige foran hælen.

150. Quadratus plantae: hvor kan smerten refereres hen?
Hælens underside.

Næste skridt

I dag: besvar de første 30 spørgsmål uden at kigge på svarene, og notér dem, du ikke kunne.